

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第5351901号
(P5351901)

(45) 発行日 平成25年11月27日(2013.11.27)

(24) 登録日 平成25年8月30日(2013.8.30)

(51) Int.Cl.

F I

H O 1 L 51/50 (2006.01)

H O 5 B 33/14 B

C O 9 K 11/06 (2006.01)

H O 5 B 33/22 B

C O 7 C 15/30 (2006.01)

C O 9 K 11/06 6 6 O

C O 7 C 13/66 (2006.01)

C O 9 K 11/06 6 9 O

C O 7 C 15/38 (2006.01)

C O 7 C 15/30

請求項の数 36 (全 104 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2010-544867 (P2010-544867)
 (86) (22) 出願日 平成21年12月25日(2009.12.25)
 (86) 国際出願番号 PCT/JP2009/071675
 (87) 国際公開番号 W02010/076878
 (87) 国際公開日 平成22年7月8日(2010.7.8)
 審査請求日 平成24年2月21日(2012.2.21)
 (31) 優先権主張番号 特願2009-332 (P2009-332)
 (32) 優先日 平成21年1月5日(2009.1.5)
 (33) 優先権主張国 日本国(JP)

(73) 特許権者 000183646
 出光興産株式会社
 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号
 (74) 代理人 100078732
 弁理士 大谷 保
 (74) 代理人 100081765
 弁理士 東平 正道
 (72) 発明者 岩隈 俊裕
 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
 (72) 発明者 高嶋 頼由
 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
 (72) 発明者 荻原 俊成
 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地

審査官 磯貝 香苗

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子用材料及びそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

下記式(1)で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【化1】



(式中、

R^2 は、水素原子、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、ジベンゾフラン環、または - Ar^3 - R^3 で表わされる基を表し；

$Ar^1 \sim Ar^3$ は、それぞれ独立に、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

R^1 及び R^3 は、それぞれ独立に、水素原子、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

$R^1 \sim R^3$ 及び $Ar^1 \sim Ar^3$ で表わされる上記縮合芳香族炭化水素環は、それぞれ独立に、ナフタレン環、クリセン環、フルオランテン環、トリフェニレン環、フェナントレン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ[*b*]フルオランテン環及びピセン環から選択される縮合芳香族炭

化水素環であり；

$R^1 \sim R^3$ 、 $Ar^1 \sim Ar^3$ 及び2,7-ジ置換ナフタレン環は、それぞれ独立に、1つ以上の置換基を有しても良い。


また、 Ar^1 及び Ar^2 が共に4環以上で構成される縮合芳香族炭化水素環である場合、 Ar^1 及び Ar^2 は互いに異なる環であり；

Ar^1 及び Ar^2 が共にベンゼン環である場合、 R^1 及び R^2 は同時に水素原子又はナフタレン環ではなく；


R^1 及び R^2 が共に水素原子である場合、 Ar^1 及び Ar^2 は同時にナフタレン環ではなく、ナフタレン環及びベンゼン環の組合せでもない。

但し、下記式 (x - 1) ~ (x - 16) のいずれかで表わされる構造のものを除く。)


【化 2】




(x-1)




(x-2)



(x-3)




(x-4)




(x-5)


10



(x-6)




(x-7)




(x-8)


20




(x-9)




(x-10)




(x-11)



(x-12)




(x-13)




(x-14)

30



(x-15)



(x-16)

40

【請求項 2】

前記 $R^1 \sim R^3$ 、 $Ar^1 \sim Ar^3$ 及び 2, 7 - ジ置換ナフタレン環が有してもよい置換基が、炭素数 6 ~ 14 のアントラセン環を除くアリール基、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、炭素数 1 ~ 20 のハロアルキル基、炭素数 5 ~ 18 のシクロアルキル基又は炭素数 3 ~ 20 のシリル基である請求項 1 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項 3】

前記 Ar^1 及び Ar^2 が、それぞれ独立に、ベンゼン環又は前記縮合芳香族炭化水素環を表す請求項 1 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

50

【請求項 4】

前記 Ar^1 及び Ar^2 が、互いに異なる縮合芳香族炭化水素環を表す請求項 3 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項 5】

前記 Ar^1 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される請求項 3 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項 6】

前記 Ar^1 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環を表し、前記 Ar^2 がベンゼン環又はナフタレン環を表す請求項 5 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

10


【請求項 7】

前記 Ar^1 及び Ar^2 が、それぞれ独立に、フェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環を表し、 Ar^1 と Ar^2 が互いに異なる環を表す請求項 5 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項 8】

下記式 (2) で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【化 3】



20

(式中、

$Ar^4 \sim Ar^6$ は、それぞれ独立に、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

R^4 及び R^5 は、それぞれ独立に、水素原子、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

R^4 、 R^5 及び $Ar^4 \sim Ar^6$ で表わされる上記縮合芳香族炭化水素環は、それぞれ独立に、ナフタレン環、クリセン環、フルオランテン環、トリフェニレン環、フェナントレン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ[*b*]フルオランテン環及びピセン環から選択される縮合芳香族炭化水素環であり；


30

R^4 、 R^5 、 $Ar^4 \sim Ar^6$ 及び 2 つの 2, 7 - ジ置換ナフタレン環は、それぞれ独立に、1 つ以上の置換基を有しても良い。

Ar^5 がベンゼン環を表す場合、 Ar^4 及び Ar^6 は、いずれもベンゼン環ではない。

但し、下記式で表される構造を有する化合物を除く。)

【化 4】



40

【請求項 9】

式 (2) において Ar^5 がベンゼン環を表す場合、 Ar^4 及び Ar^6 は、それぞれ独立に、クリセン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環

50

、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ[b]フルオランテン環及びピセン環から選択される縮合芳香族炭化水素環である請求項 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項 10】

式(2)において Ar^5 がベンゼン環を表す場合、 Ar^4 及び Ar^6 は、それぞれ独立に、互いに異なる縮合芳香族炭化水素環である請求項 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、

【請求項 11】

前記 R^4 、 R^5 、 $Ar^4 \sim Ar^6$ 及び 2, 7 - ジ置換ナフタレン環が有してもよい置換基が、炭素数 6 ~ 14 のアントラセン環を除くアリール基、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、炭素数 1 ~ 20 のハロアルキル基、炭素数 5 ~ 18 のシクロアルキル基又は炭素数 3 ~ 20 のシリル基である請求項 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項 12】

R^4 及び R^5 が水素原子であり、 Ar^4 又は Ar^6 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される基である請求項 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項 13】

R^4 及び R^5 が水素原子であり、 Ar^5 の環形成炭素数が 10 以上であり、 Ar^4 又は Ar^6 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環である請求項 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。


【請求項 14】

Ar^5 がジベンゾフラン環である請求項 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項 15】

陰極と陽極との間に、1 層または複数層からなる有機薄膜層を備え、該有機薄膜層が、下記式(1)で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料と、燐光発光材料少なくとも 1 種とを含む有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化 5】



(式中、

R^2 は、水素原子、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、ジベンゾフラン環、または $Ar^3 - R^3$ で表わされる基を表し；

$Ar^1 \sim Ar^3$ は、それぞれ独立に、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

R^1 及び R^3 は、それぞれ独立に、水素原子、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

$R^1 \sim R^3$ 及び $Ar^1 \sim Ar^3$ で表わされる上記縮合芳香族炭化水素環は、それぞれ独立に、ナフタレン環、クリセン環、フルオランテン環、トリフェニレン環、フェナントレン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ[b]フルオランテン環及びピセン環から選択される縮合芳香族炭化水素環であり；

$R^1 \sim R^3$ 、 $Ar^1 \sim Ar^3$ 及び 2, 7 - ジ置換ナフタレン環は、それぞれ独立に、1 つ以上の置換基を有しても良い。


また、 Ar^1 及び Ar^2 が共に 4 環以上で構成される縮合芳香族炭化水素環である場合、 Ar^1 及び Ar^2 は互いに異なる環であり；

Ar^1 及び Ar^2 が共にベンゼン環である場合、 R^1 及び R^2 は同時に水素原子又はナフタレン環ではなく；


R^1 及び R^2 が共に水素原子である場合、 Ar^1 及び Ar^2 は同時にナフタレン環ではなく、ナフタレン環及びベンゼン環の組合せでもない。

但し、下記式 (x-1) ~ (x-16) のいずれかで表わされる構造のものを除く。)

【化 6】




(x-1)




(x-2)


10




(x-3)




(x-4)




(x-5)



(x-6)




(x-7)




(x-8)


20



(x-9)




(x-10)




(x-11)


30




(x-12)




(x-13)



(x-14)



(x-15)



(x-16)

40

【請求項 16】

前記 $R^1 \sim R^3$ 、 $Ar^1 \sim Ar^3$ 及び 2, 7 - ジ置換ナフタレン環が有してもよい置換基が、炭素数 6 ~ 14 のアントラセン環を除くアリール基、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、炭素数 1 ~ 20 のハロアルキル基、炭素数 5 ~ 18 のシクロアルキル基又は炭素数 3 ~ 20 のシリル基である請求項 15 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

50

【請求項 17】

前記 Ar^1 及び Ar^2 が、それぞれ独立に、ベンゼン環又は前記縮合芳香族炭化水素環を表わす請求項 15 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 18】

前記 Ar^1 及び Ar^2 が、互いに異なる縮合芳香族炭化水素環を表わす請求項 17 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 19】

前記 Ar^1 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環を表す請求項 17 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

10

【請求項 20】

前記 Ar^1 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環を表し、前記 Ar^2 がベンゼン環又はナフタレン環を表す請求項 19 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 21】


前記 Ar^1 及び Ar^2 が、それぞれ独立に、フェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環を表し、 Ar^1 と Ar^2 が互いに異なる環を表す請求項 19 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 22】

陰極と陽極との間に、1層または複数層からなる有機薄膜層を備え、該有機薄膜層が、下記式(2)で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料と、燐光発光材料少なくとも1種とを含む有機エレクトロルミネッセンス素子。

20

【化7】



(式中、

$Ar^4 \sim Ar^6$ は、それぞれ独立に、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

30

R^4 及び R^5 は、それぞれ独立に、水素原子、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

R^4 、 R^5 及び $Ar^4 \sim Ar^6$ で表わされる上記縮合芳香族炭化水素環は、それぞれ独立に、ナフタレン環、クリセン環、フルオランテン環、トリフェニレン環、フェナントレン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ[*b*]フルオランテン環及びピセン環から選択される縮合芳香族炭化水素環であり；

R^4 、 R^5 、 $Ar^4 \sim Ar^6$ 及び2つの2,7-ジ置換ナフタレン環は、それぞれ独立に、1つ以上の置換基を有しても良い。

Ar^5 がベンゼン環を表す場合、 Ar^4 及び Ar^6 は、いずれもベンゼン環ではない。)

40

【請求項 23】

式(2)において Ar^5 がベンゼン環を表す場合、 Ar^4 及び Ar^6 は、それぞれ独立に、クリセン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ[*b*]フルオランテン環及びピセン環から選択される縮合芳香族炭化水素環である請求項 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 24】

式(2)において Ar^5 がベンゼン環を表す場合、 Ar^4 及び Ar^6 は、互いに異なる縮合芳香族炭化水素環である請求項 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 25】

50

前記 R^4 、 R^5 、 $Ar^4 \sim Ar^6$ 及び 2, 7 - ジ置換ナフタレン環が有してもよい置換基が、炭素数 6 ~ 14 のアントラセン環を除くアリール基、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、炭素数 1 ~ 20 のハロアルキル基、炭素数 5 ~ 18 のシクロアルキル基又は炭素数 3 ~ 20 のシリル基である請求項 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 26】

R^4 及び R^5 が水素原子であり、 Ar^4 又は Ar^6 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される基である請求項 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 27】

R^4 及び R^5 が水素原子であり、 Ar^5 の環形成炭素数が 10 以上であり、 Ar^4 又は Ar^6 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環である請求項 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

10

【請求項 28】

Ar^5 がジベンゾフラン環である請求項 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 29】

前記式 (1) 又は (2) で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料の励起 3 重項エネルギーが、2.0 eV 以上 2.8 eV 以下である請求項 15 又は 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 30】

20

前記有機薄膜層が少なくとも 1 つの発光層を有し、該発光層の少なくとも 1 つが前記式 (1) 又は (2) で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料と、燐光発光材料少なくとも 1 種とを含む請求項 15 又は 22 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 31】

前記燐光発光材料が、金属錯体を含有し、該金属錯体が、Ir, Pt, Os, Au, Cu, Re および Ru から選択される金属原子と、配位子とを有する請求項 30 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 32】

前記配位子が、オルトメタル結合を有する請求項 30 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

30

【請求項 33】

前記発光層に含まれる燐光発光材料のうち少なくとも 1 種の、発光波長の極大値が 520 nm 以上 720 nm 以下である請求項 32 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 34】

前記有機薄膜層が、前記陰極と前記発光層との間に電子輸送層又は電子注入層を有し、該電子輸送層又は前記電子注入層が、前記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含む請求項 15 又は 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 35】

前記有機薄膜層は、前記陰極と前記発光層との間に電子輸送層または電子注入層を有し、前記電子輸送層または前記電子注入層は、含窒素 6 員環もしくは 5 員環骨格を有する芳香族環または含窒素 6 員環もしくは 5 員環骨格を有する縮合芳香族環化合物を含む請求項 15 又は 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

40

【請求項 36】

前記陰極と前記有機薄膜層との界面領域に還元性ドーパントが添加されている請求項 15 又は 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子用材料及びそれを用いた有機エレクトロ

50

ルミネッセンス素子（以下、有機EL素子と略記する場合がある。）に関する。特に、赤色に発光する発光層を備えた有機エレクトロルミネッセンス素子用材料及びそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

【背景技術】

【0002】

陽極と陰極との間に発光層を含む有機薄膜層を備え、発光層に注入された正孔と電子との再結合によって生じる励起子（エキシトン）エネルギーから発光を得る有機エレクトロルミネッセンス素子が知られている。

このような有機エレクトロルミネッセンス素子は、自発光型素子としての利点を活かし、発光効率、画質、消費電力さらには薄型のデザイン性に優れた発光素子として期待されている。

10

【0003】

有機エレクトロルミネッセンス素子の更なる改善点としては、例えば、発光効率が挙げられる。

この点、内部量子効率を高めるため、3重項励起子からの発光が得られる発光材料（燐光発光材料）の開発が進められ、最近では燐光発光を示す有機エレクトロルミネッセンス素子が報告されている。

このような燐光発光材料を用いて発光層（燐光発光層）を構成することにより75%以上、理論上100%近い値の内部量子効率を実現でき、高効率、低消費電力の有機エレクトロルミネッセンス素子が得られる。

20

【0004】

また、発光層を形成するにあたっては、ホスト材料に、ドーパントとして発光材料をドーピングするドーピング法が知られている。

ドーピング法で形成した発光層では、ホスト材料に注入された電荷から効率よく励起子を生成することができる。そして、生成された励起子の励起子エネルギーをドーパントに移動させ、ドーパントから高効率の発光を得ることができる。

ここで、ホスト材料から燐光発光性の燐光ドーパントに分子間エネルギー移動を行うためには、ホスト材料の励起3重項エネルギー E_{g_H} が、燐光ドーパントの励起3重項エネルギー E_{g_D} よりも大きいことが必要である。

【0005】

30

励起3重項エネルギーが有効に大きい材料としては、CBP（4,4'-bis(N-carbazolyl)biphenyl）が代表的に知られている（例えば、特許文献1参照）。

このCBPをホスト材料とすれば、所定の発光波長（例えば、緑、赤）を示す燐光ドーパントへのエネルギー移動が可能であり、高効率の有機エレクトロルミネッセンス素子を得ることができる。

しかしながら、CBPをホスト材料として使用すると、燐光発光により発光効率は格段に向上する一方、寿命は非常に短く、実用に適さないという問題があった。

これは、CBPの分子構造上の酸化安定性が高くないため、正孔による分子の劣化が激しいためと考えられる。

また、特許文献2には、カルバゾール等の含窒素環を含有する縮合環誘導体を、赤色燐光を示す燐光発光層のホスト材料として用いた技術が開示されている。この技術により、発光効率および寿命について改善されているが、実用化には十分でない場合もあった。

40

【0006】

その一方、蛍光発光を示す蛍光ドーパント用のホスト材料（蛍光ホスト）は種々知られており、蛍光ドーパントとの組み合わせで発光効率、寿命に優れた蛍光発光層を形成できるホスト材料が種々提案されている。

しかし、蛍光ホストでは、励起1重項エネルギー $E_g(S)$ は蛍光ドーパントよりも大きい、励起3重項エネルギー $E_g(T)$ は必ずしも大きくないため、単純には燐光発光層のホスト材料（燐光ホスト）として転用できない。

【0007】

50

例えば、蛍光ホストとしてはアントラセン誘導体が良く知られている。

しかし、アントラセン誘導体は、励起3重項エネルギー $E_g(T)$ が 1.9 eV 程度と比較的小さい。このため、 520 nm から 720 nm の可視光領域の発光波長を有する燐光ドーパントに対するエネルギー移動が確保できない。また、励起された3重項エネルギーを発光層内に閉じ込めることができない。

したがって、アントラセン誘導体は燐光ホストとして不適切である。

また、ペリレン誘導体、ピレン誘導体およびナフタセン誘導体等も同様の理由で燐光ホストとして好ましくない。

【0008】

また、燐光ホストとして芳香族炭化水素化合物を用いた例が知られている（特許文献3）。ここでは、ベンゼン骨格を中心とし、置換基として2つの芳香族基がメタ位に結合した化合物を、燐光ホストとして用いている。

ただし、特許文献3の芳香族炭化水素化合物は、中心のベンゼン骨格に対し、左右対称に分子を伸張した分子構造になっているため、発光層が結晶化しやすいという問題点がある。

一方、特許文献4～9には、種々の芳香族炭化水素化合物を用いた有機エレクトロルミネッセンス素子が開示されている。しかしながら、燐光ホストとしての有効性についてはなんら言及されていない。

【0009】

さらに、特許文献10には、2,7-ナフタレン環の左右の置換位置に、縮合芳香族炭化水素環を配した化合物が例示されており、特許文献11には、2,7-ナフタレン環の左右の置換位置に、含窒素ヘテロ環であるフェナントロリン環を配する化合物が例示されており、特許文献12には、2,7-ナフタレン環の左右の置換位置に、アントラセン環を必須骨格とした芳香族置換基を有する化合物が例示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0010】

【特許文献1】US 2002 / 182441号公報

【特許文献2】WO 2005 / 112519号公報

【特許文献3】特開2003 - 142267号公報

【特許文献4】WO 2007 / 046658号公報

【特許文献5】特開2006 - 151966号公報

【特許文献6】特開2005 - 8588号公報

【特許文献7】特開2005 - 19219号公報

【特許文献8】特開2005 - 197262号公報

【特許文献9】特開2004 - 75567号公報

【特許文献10】US 2008 / 0224603号公報

【特許文献11】特開2004 - 281390号公報

【特許文献12】特開2006 - 045503号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0011】

しかしながら、本発明者らは、上記特許文献10に記載の化合物は、4環以上の環で構成される平面性の高い芳香族炭化水素環が2,7-ナフタレン環の左右対称に位置するため、分子間での重なりが大きくなるため結晶性が高く、膜としての安定性に難があり、また、上記特許文献12に記載の化合物は、アントラセン環の励起3重項エネルギーが 1.9 eV 以下であるので、燐光素子においてはエネルギーレベルが小さすぎ、特に燐光発光性材料のホストとして発光層に用いる場合は、エネルギーの低い赤色においても効率良い有機EL発光を得ることができないことを見出した。

上記のように、効率よく燐光発光材料にエネルギー移動を行うことができ、かつ、寿命

10

20

30

40

50

が実用的に長いホスト材料は知られておらず、燐光発光材料を用いた素子の実用化が妨げられていた。

そこで、本発明の目的は、高効率かつ長寿命な燐光発光性の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料及びこれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0012】

本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、下記(1)又は(2)で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料(以下、有機EL素子用材料と略記することがある)を用いることにより、高効率かつ長寿命な燐光発光性の有機エレクト


10

【0013】

すなわち、本発明は、

1. 下記(1)で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、

【化1】



20

(式中、

R^2 は、水素原子、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、ジベンゾフラン環、または $-Ar^3-R^3$ で表わされる基を表し；

$Ar^1 \sim Ar^3$ は、それぞれ独立に、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

R^1 及び R^3 は、それぞれ独立に、水素原子、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

$R^1 \sim R^3$ 及び $Ar^1 \sim Ar^3$ で表わされる上記縮合芳香族炭化水素環は、それぞれ独立に、ナフタレン環、クリセン環、フルオランテン環、トリフェニレン環、フェナントレン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ[*b*]フルオランテン環及びピセン環から選択される縮合芳香族炭化水素環であり；

30

$R^1 \sim R^3$ 、 $Ar^1 \sim Ar^3$ 及び2,7-ジ置換ナフタレン環は、それぞれ独立に、1つ以上の置換基を有しても良い。

また、 Ar^1 及び Ar^2 が共に4環以上で構成される縮合芳香族炭化水素環である場合、 Ar^1 及び Ar^2 は互いに異なる環であり；

Ar^1 及び Ar^2 が共にベンゼン環である場合、 R^1 及び R^2 は同時に水素原子又はナフタレン環ではなく；


40

R^1 及び R^2 が共に水素原子である場合、 Ar^1 及び Ar^2 は同時にナフタレン環ではなく、ナフタレン環及びベンゼン環の組合せでもない。


但し、下記式(x-1)～(x-16)のいずれかで表わされる構造のものを除く。)

【0014】


【化 2】




(x-1)




(x-2)



(x-3)




(x-4)




(x-5)


10



(x-6)




(x-7)




(x-8)


20




(x-9)




(x-10)




(x-11)



(x-12)




(x-13)




(x-14)

30



(x-15)



(x-16)

40

【 0 0 1 5 】

2. 前記 $R^1 \sim R^3$ 、 $Ar^1 \sim Ar^3$ 及び 2, 7 - ジ置換ナフタレン環が有してもよい置換基が、炭素数 6 ~ 14 のアントラセン環を除くアリール基、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、炭素数 1 ~ 20 のハロアルキル基、炭素数 5 ~ 18 のシクロアルキル基又は炭素数 3 ~ 20 のシリル基である上記 1 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、

3. 前記 Ar^1 及び Ar^2 が、それぞれ独立に、ベンゼン環又は前記縮合芳香族炭化水素環を表す上記 1 又は 2 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、

4. 前記 Ar^1 及び Ar^2 が、互いに異なる縮合芳香族炭化水素環を表す上記 3 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、

50


5. 前記 Ar^1 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環を表す上記 3 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、

6. 前記 Ar^1 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環を表し、前記 Ar^2 がベンゼン環又はナフタレン環を表す上記 5 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、

7. 前記 Ar^1 及び Ar^2 が、それぞれ独立に、フェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環を表し、 Ar^1 と Ar^2 が互いに異なる環を表す上記 5 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、

【0016】

8. 下記式 (2) で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、
【化 3】



(式中、

$Ar^4 \sim Ar^6$ は、それぞれ独立に、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

R^4 及び R^5 は、それぞれ独立に、水素原子、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

R^4 、 R^5 及び $Ar^4 \sim Ar^6$ で表わされる上記縮合芳香族炭化水素環は、それぞれ独立に、ナフタレン環、クリセン環、フルオランテン環、トリフェニレン環、フェナントレン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ [b] フルオランテン環及びピセン環から選択される縮合芳香族炭化水素環であり；

R^4 、 R^5 、 $Ar^4 \sim Ar^6$ 及び 2 つの 2, 7 - ジ置換ナフタレン環は、それぞれ独立に、1 つ以上の置換基を有しても良い。

Ar^5 がベンゼン環を表す場合、 Ar^4 及び Ar^6 は、いずれもベンゼン環ではない。) 30

9. 式 (2) において Ar^5 がベンゼン環を表す場合、 Ar^4 及び Ar^6 は、それぞれ独立に、クリセン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ [b] フルオランテン環及びピセン環から選択される縮合芳香族炭化水素環である上記 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、

10. 式 (2) において Ar^5 がベンゼン環を表す場合、 Ar^4 及び Ar^6 は、それぞれ独立に、互いに異なる縮合芳香族炭化水素環である上記 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、

11. 前記 R^4 、 R^5 、 $Ar^4 \sim Ar^6$ 及び 2, 7 - ジ置換ナフタレン環が有してもよい置換基が、炭素数 6 ~ 14 のアントラセン環を除くアリール基、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、炭素数 1 ~ 20 のハロアルキル基、炭素数 5 ~ 18 のシクロアルキル基又は炭素数 3 ~ 20 のシリル基である上記 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、 40

12. R^4 及び R^5 が水素原子であり、 Ar^4 又は Ar^6 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環である上記 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、

13. R^4 及び R^5 が水素原子であり、 Ar^5 の環形成炭素数が 10 以上であり、 Ar^4 又は Ar^6 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環である上記 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、

14. Ar^5 がジベンゾフラン環である上記 8 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料、

10

20

30


40

50

【 0 0 1 7 】

15. 陰極と陽極との間に、1層または複数層からなる有機薄膜層を備え、該有機薄膜層が、下記式(1)で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料と、燐光発光材料少なくとも1種とを含む有機エレクトロルミネッセンス素子、

【化4】



(式中、

R^2 は、水素原子、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、ジベンゾフラン環、または Ar^3-R^3 で表わされる基を表し；

$\text{Ar}^1 \sim \text{Ar}^3$ は、それぞれ独立に、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

R^1 及び R^3 は、それぞれ独立に、水素原子、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

$\text{R}^1 \sim \text{R}^3$ 及び $\text{Ar}^1 \sim \text{Ar}^3$ で表わされる上記縮合芳香族炭化水素環は、それぞれ独立に、ナフタレン環、クリセン環、フルオランテン環、トリフェニレン環、フェナントレン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ[*b*]フルオランテン環及びピセン環から選択される縮合芳香族炭化水素環であり；

$\text{R}^1 \sim \text{R}^3$ 、 $\text{Ar}^1 \sim \text{Ar}^3$ 及び2,7-ジ置換ナフタレン環は、それぞれ独立に、1つ以上の置換基を有しても良い。

また、 Ar^1 及び Ar^2 が共に4環以上で構成される縮合芳香族炭化水素環である場合、 Ar^1 及び Ar^2 は互いに異なる環であり；

Ar^1 及び Ar^2 が共にベンゼン環である場合、 R^1 及び R^2 は同時に水素原子又はナフタレン環ではなく；

R^1 及び R^2 が共に水素原子である場合、 Ar^1 及び Ar^2 は同時にナフタレン環ではなく、ナフタレン環及びベンゼン環の組合せでもない。

但し、下記式(x-1)～(x-16)のいずれかで表わされる構造のものを除く。)


【 0 0 1 8 】

10


20

30


【化 5】




(x-1)




(x-2)



(x-3)




(x-4)




(x-5)


10



(x-6)




(x-7)




(x-8)


20




(x-9)




(x-10)




(x-11)



(x-12)




(x-13)




(x-14)

30



(x-15)



(x-16)

40

【 0 0 1 9 】

16. 前記 $R^1 \sim R^3$ 、 $Ar^1 \sim Ar^3$ 及び 2, 7 - ジ置換ナフタレン環が有してもよい置換基が、炭素数 6 ~ 14 のアントラセン環を除くアリール基、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、炭素数 1 ~ 20 のハロアルキル基、炭素数 5 ~ 18 のシクロアルキル基又は炭素数 3 ~ 20 のシリル基である上記 15 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、

17. 前記 Ar^1 及び Ar^2 が、それぞれ独立に、ベンゼン環又は前記縮合芳香族炭化水素環を表わす上記 15 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、

18. 前記 Ar^1 及び Ar^2 が、互いに異なる縮合芳香族炭化水素環を表わす上記 17 記載

50

の有機エレクトロルミネッセンス素子、

19. 前記 Ar^1 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環を表す上記 17 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、

20. 前記 Ar^1 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環を表し、前記 Ar^2 がベンゼン環又はナフタレン環を表す上記 19 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、


21. 前記 Ar^1 及び Ar^2 が、それぞれ独立に、フェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環を表し、 Ar^1 と Ar^2 が互いに異なる環を表す上記 19 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、

10

【0020】

22. 陰極と陽極との間に、1層または複数層からなる有機薄膜層を備え、該有機薄膜層が、下記式(2)で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料と、燐光発光材料少なくとも1種とを含む有機エレクトロルミネッセンス素子、

【化6】



(式中、

20

$Ar^4 \sim Ar^6$ は、それぞれ独立に、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

R^4 及び R^5 は、それぞれ独立に、水素原子、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

R^4 、 R^5 及び $Ar^4 \sim Ar^6$ で表わされる上記縮合芳香族炭化水素環は、それぞれ独立に、ナフタレン環、クリセン環、フルオランテン環、トリフェニレン環、フェナントレン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ[*b*]フルオランテン環及びピセン環から選択される縮合芳香族炭化水素環であり；

R^4 、 R^5 、 $Ar^4 \sim Ar^6$ 及び2つの2,7-ジ置換ナフタレン環は、それぞれ独立に、1つ以上の置換基を有しても良い。

30

Ar^5 がベンゼン環を表す場合、 Ar^4 及び Ar^6 は、いずれもベンゼン環ではない。))

23. 式(2)において Ar^5 がベンゼン環を表す場合、 Ar^4 及び Ar^6 は、それぞれ独立に、クリセン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ[*b*]フルオランテン環及びピセン環から選択される縮合芳香族炭化水素環である上記 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、

24. 式(2)において Ar^5 がベンゼン環を表す場合、 Ar^4 及び Ar^6 は、互いに異なる縮合芳香族炭化水素環である上記 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、

25. 前記 R^4 、 R^5 、 $Ar^4 \sim Ar^6$ 及び 2,7-ジ置換ナフタレン環が有してもよい置換基が、炭素数 6 ~ 14 のアントラセン環を除くアリール基、炭素数 1 ~ 20 のアルキル基、炭素数 1 ~ 20 のハロアルキル基、炭素数 5 ~ 18 のシクロアルキル基又は炭素数 3 ~ 20 のシリル基である上記 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、

40

26. R^4 及び R^5 が水素原子であり、 Ar^4 又は Ar^6 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環である上記 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、

27. R^4 及び R^5 が水素原子であり、 Ar^5 の環形成炭素数が 10 以上であり、 Ar^4 又は Ar^6 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環である上記 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、

28. Ar^5 がジベンゾフラン環である上記 22 記載の有機エレクトロルミネッセンス素

50

子、

【 0 0 2 1 】

29．前記式(1)又は(2)で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料の励起3重項エネルギーが、2.0 eV以上2.8 eV以下である上記15又は22のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、

30．前記有機薄膜層が少なくとも1つの発光層を有し、該発光層の少なくとも1つが前記式(1)又は(2)で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料と、燐光発光材料少なくとも1種とを含む上記15又は22に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、

31．前記燐光発光材料が、金属錯体を含有し、該金属錯体が、Ir, Pt, Os, Au, Cu, ReおよびRuから選択される金属原子と、配位子とを有する上記30記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、

32．前記配位子が、オルトメタル結合を有する上記31記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、

33．前記発光層に含まれる燐光発光材料のうち少なくとも1種の、発光波長の極大値が520 nm以上720 nm以下である上記32に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、

34．前記有機薄膜層が、前記陰極と前記発光層との間に電子輸送層又は電子注入層を有し、該電子輸送層又は前記電子注入層が、上記1～10のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含む上記15又は22に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、

35．前記有機薄膜層は、前記陰極と前記発光層との間に電子輸送層または電子注入層を有し、前記電子輸送層または前記電子注入層は、含窒素6員環もしくは5員環骨格を有する芳香族環または含窒素6員環もしくは5員環骨格を有する縮合芳香族環化合物を含む上記15又は22記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、及び

36．前記陰極と前記有機薄膜層との界面領域に還元性ドーパントが添加されている上記15又は22に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子、
を提供する。

【発明の効果】

【 0 0 2 2 】

本発明によれば、前記式(1)又は(2)で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を用いることにより、高効率かつ長寿命な燐光発光性の有機エレクトロルミネッセンス素子を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 2 3 】

【図1】本発明の実施形態における有機エレクトロルミネッセンス素子の一例の概略構成を示す図である。

【符号の説明】

【 0 0 2 4 】

- 1 有機エレクトロルミネッセンス素子
- 2 基板
- 3 陽極
- 4 陰極
- 5 燐光発光層
- 6 正孔注入・輸送層
- 7 電子注入・輸送層
- 10 有機薄膜層

【発明を実施するための形態】

【 0 0 2 5 】

以下、本発明の実施形態について説明する。


【 0 0 2 6 】

(有機エレクトロルミネッセンス素子用材料)

本発明は、下記式(1)で表わされる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料(以下、有機EL素子用材料(1)と記載することがある)及び下記式(2)で表わされる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料(以下、有機EL素子用材料(2)と記載することがある)を提供する。

【 0 0 2 7 】

【化7】



10

【 0 0 2 8 】

(式中、

R^2 は、水素原子、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、ジベンゾフラン環、または $Ar^3 - R^3$ で表わされる基を表し；

$Ar^1 \sim Ar^3$ は、それぞれ独立に、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

R^1 及び R^3 は、それぞれ独立に、水素原子、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

20

$R^1 \sim R^3$ 及び $Ar^1 \sim Ar^3$ で表わされる上記縮合芳香族炭化水素環は、それぞれ独立に、ナフタレン環、クリセン環、フルオランテン環、トリフェニレン環、フェナントレン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ[*b*]フルオランテン環及びピセン環から選択される縮合芳香族炭化水素環であり；

$R^1 \sim R^3$ 、 $Ar^1 \sim Ar^3$ 及び2,7-ジ置換ナフタレン環は、それぞれ独立に、1つ以上の置換基を有しても良い。

また、 Ar^1 及び Ar^2 が共に4環以上で構成される縮合芳香族炭化水素環である場合、 Ar^1 及び Ar^2 は互いに異なる環であり；

Ar^1 及び Ar^2 が共にベンゼン環である場合、 R^1 及び R^2 は同時に水素原子又はナフタレン環ではなく；

30


R^1 及び R^2 が共に水素原子である場合、 Ar^1 及び Ar^2 は同時にナフタレン環ではなく、ナフタレン環及びベンゼン環の組合せでもない。

但し、下記式(x-1)～(x-16)のいずれかで表わされる構造のものを除く。)


ここで、4環以上で構成される縮合芳香族炭化水素環とは、クリセン環、フルオランテン環、トリフェニレン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ[*b*]フルオランテン環及びピセン環が挙げられる。

【 0 0 2 9 】


【化 8】




(x-1)




(x-2)




(x-3)




(x-4)




(x-5)




(x-6)




(x-7)




(x-8)




(x-9)




(x-10)




(x-11)




(x-12)




(x-13)



(x-14)




(x-15)



(x-16)

【 0 0 3 0 】

【化 9】



(2)

【 0 0 3 1 】

(式中、

10

20

30

40

50

$Ar^4 \sim Ar^6$ は、それぞれ独立に、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

R^4 及び R^5 は、それぞれ独立に、水素原子、ベンゼン環、縮合芳香族炭化水素環、またはジベンゾフラン環を表し；

R^4 、 R^5 及び $Ar^4 \sim Ar^6$ で表わされる上記縮合芳香族炭化水素環は、それぞれ独立に、ナフタレン環、クリセン環、フルオランテン環、トリフェニレン環、フェナントレン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ[*b*]フルオランテン環及びピセン環から選択される縮合芳香族炭化水素環であり；

R^4 、 R^5 、 $Ar^4 \sim Ar^6$ 及び2つの2, 7-ジ置換ナフタレン環は、それぞれ独立に、1つ以上の置換基を有しても良い。

Ar^5 がベンゼン環を表す場合、 Ar^4 及び Ar^6 は、いずれもベンゼン環ではない。) 【0032】

上記式(1)で表わされる有機EL素子用材料(1)は、2, 7-ジ置換ナフタレン環に対して非対称構造を有し、また、上記式(2)で表わされる有機EL素子用材料(2)は、2, 7-ジ置換ナフタレン環- Ar^5 -2, 7-ジ置換ナフタレン環構造に対して非対称構造を有するため、これを発光層中に有する有機EL素子は、寿命等が飛躍的に向上したものとなる。

【0033】

本発明の有機EL素子用材料(1)及び有機EL素子用材料(2)は、3重項エネルギーギャップ(励起3重項エネルギー)が大きいことから、燐光ドーパントに対してエネルギー移動させて燐光発光させることができる。

また、蛍光ホストとしてよく知られたアントラセン誘導体では赤色発光の燐光ドーパントにもホストとして不適であるが、本発明の有機EL素子用材料では3重項エネルギーギャップが大きいことから、有効に赤色の発光を示す燐光ドーパントを発光させることができる。

ただし、従来よく知られた燐光ホストであるCBPでは緑よりもさらに短波長の燐光ドーパントに対してもホストとして機能するが、本発明の有機EL素子用材料では、緑色の発光を示す燐光ドーパントまでしか発光させることができない。

また、本発明では、有機EL素子用材料の骨格を窒素原子を含まない多環式縮合環で構成することにより、分子の安定性を高くし素子寿命を長くすることができる。

このとき、骨格部の核原子数が少なすぎると分子の安定性が十分に高くない。一方、本発明の化合物を構成する多環式縮合環の縮合する環の数が多くなりすぎると共役が伸びすぎてHOMO-LUMOギャップが狭くなって3重項エネルギーギャップが有用な発光波長に満たなくなる。この点、前記有機EL素子用材料(1)及び有機EL素子用材料(2)は、適度な核原子数を有するので、有用な発光波長を示し安定性も高い燐光発光層の燐光ホストとして好適に利用することができる。

【0034】

従来は、緑から赤色までの幅広い波長領域において燐光ドーパントに広く適用できる燐光ドーパントに対応するホスト材料を選定していたため、3重項エネルギーギャップが広いCBP等をホスト材料としていた。

しかしCBPでは確かに3重項エネルギーギャップE_g(T)は広いが、寿命が短いという問題があった。

【0035】

この点、本発明では、青ほどワイドギャップな燐光ドーパントのホストには適用できないが、赤または緑の燐光ドーパントに対してはホストとして機能する。さらには、CBPのように3重項エネルギーギャップが広すぎると、赤色燐光ドーパントに対してはエネルギーギャップの差が大きすぎて分子間エネルギー移動が効率的に行われないう問題があるが、本発明のホストによれば、赤色または緑色燐光ドーパントに対してはエネルギーギャップが適合しているため、効率的にホストの励起子から燐光ドーパントにエネルギー

10

20

30

40

50

移動させることができ、非常に高効率の燐光発光層を構成することができる。

このように、本発明によれば、高効率かつ長寿命の燐光発光層を構成することができる。

【0036】

ここで、有機エレクトロルミネッセンス素子を構成する材料の3重項エネルギーギャップ $E_g(T)$ は、燐光発光スペクトルに基づいて規定することが例として挙げられ、例えば、本発明にあっては以下のように規定することが例として挙げられる。

すなわち、各材料をEPA溶媒(容積比でジエチルエーテル:イソペンタン:エタノール=5:5:2)に10 μ mol/リットルで溶解し、燐光測定用試料とする。

そして、燐光測定用試料を石英セルに入れ、77Kに冷却し、励起光を照射し、放射される燐光の波長を測定する。

得られた燐光スペクトルの短波長側の立ち上がりに対して接線を引き、この接線とベースラインとの交点の波長値をエネルギーに換算した値を3重項エネルギーギャップ $E_g(T)$ とする。

なお、測定には、例えば、市販の測定装置F-4500(日立製作所製)を用いることができる。

ただし、このような規定によらず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で3重項エネルギーギャップとして定義できる値であればよい。

【0037】

前記式(1)における Ar^1 及び Ar^2 は、それぞれ独立に、ベンゼン環又は前記縮合芳香族炭化水素環を表すことが好ましく、ベンゼン環又は前記縮合芳香族炭化水素環を表すことがより好ましく、互いに異なる縮合芳香族炭化水素環を表わすことがさらに好ましい。また、前記 Ar^1 はフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環を表すことが好ましく、前記 Ar^1 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環を表し、前記 Ar^2 がベンゼン環又はナフタレン環を表すことがより好ましい。

前記式(2)において Ar^5 がベンゼン環を表す場合、 Ar^4 及び Ar^6 は、それぞれ独立に、クリセン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環、ジベンゾフェナントレン環、ベンゾトリフェニレン環、ベンゾクリセン環、ベンゾ[*b*]フルオランテン環及びピセン環から選択される縮合芳香族炭化水素環であることが好ましく、 Ar^4 及び Ar^6 は、それぞれ独立に、互いに異なる縮合芳香族炭化水素環であることがより好ましい。また、前記式(2)においては、 R^4 及び R^5 が水素原子であり、 Ar^4 又は Ar^6 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される基であることが好ましく、 Ar^5 の環形成炭素数が10以上であり、 Ar^4 又は Ar^6 がフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環及びベンゾクリセン環から選択される環であることがより好ましい。

また、 Ar^5 がジベンゾフラン環であることが好ましい。

本発明の非対称構造を有する材料においては、前記 $Ar_1 \sim Ar_3$ 、 Ar_4 及び Ar_6 は、それぞれ独立に、置換もしくは無置換のフェナントレン環、置換もしくは無置換のフルオランテン環、置換もしくは無置換のベンゾフェナントレン環、置換もしくは無置換のベンゾクリセン環のような耐熱性に優れる基である場合特に好ましい。

【0038】

前記式(1)における $R^1 \sim R^3$ 、 $Ar^1 \sim Ar^3$ 及び2,7-ジ置換ナフタレン環、並びに、前記式(2)における R^4 、 R^5 、 $Ar^4 \sim Ar^6$ 及び2つの2,7-ジ置換ナフタレン環が有してもよい1つ以上の置換基は、炭素数6~22のアリール基、炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のハロアルキル基、炭素数5~18のシクロアルキル基、炭素数3~20のシリル基、シアノ基またはハロゲン原子であることが好ましく、炭素数6~14のアントラセン環を除くアリール基、炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のハロアルキル基、炭素数5~18のシクロアルキル基又は炭素数3~20のシリル基であるとより好ましい。

これらの置換基は窒素原子を有さないもので、より一層、有機 EL 素子用材料の安定性を高くし、素子寿命を長くすることができる。

ここで、前記式 (1) における $R^1 \sim R^3$ 、 $Ar^1 \sim Ar^3$ 及び 2, 7 - ジ置換ナフタレン環、並びに、前記式 (2) における R^4 、 R^5 、 $Ar^4 \sim Ar^6$ 及び 2 つの 2, 7 - ジ置換ナフタレン環がそれぞれ有する置換基は、2 以下であることが好ましく、1 以下であることがより好ましい。

【0039】

上記炭素数 6 ~ 22 のアリール置換基としては、フェニル基、ピフェニル基、ターフェニル基、ナフチル基、フェニルナフチル基、ナフチルフェニル基、ナフチルナフチル基、フェニルフェナントレニル基、クリセニル基、フルオランテニル基、9, 10 - ジアルキルフルオレニル基、9, 10 - ジアリールフルオレニル基、トリフェニレニル基、フェナントレニル基、ベンゾフェナントレニル基、ジベンゾフェナントレニル基、ベンゾトリフェニレニル基、ベンゾクリセニル基、ジベンゾフラニル基が好ましい。より好ましくは炭素数 6 ~ 18 のフェニル基、ピフェニル基、ターフェニル基、ナフチル基、クリセニル基、フェニルナフチル基、ナフチルフェニル基、フルオランテニル基、9, 10 - ジメチルフルオレニル基、トリフェニレニル基、フェナントレニル基、ベンゾフェナントレニル基、ジベンゾフラニル基である。さらに好ましくは炭素数 6 ~ 14 のフェニル基、ピフェニル基、ナフチル基、フェナントレニル基、ジベンゾフラニル基である。

【0040】

上記炭素数 1 ~ 20 のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n - ブチル基、s - ブチル基、イソブチル基、t - ブチル基、n - ペンチル基、n - ヘキシル基、n - ヘプチル基、n - オクチル基、n - ノニル基、n - デシル基、n - ウンデシル基、n - ドデシル基、n - トリデシル基、n - テトラデシル基、n - ペンタデシル基、n - ヘキサデシル基、n - ヘプタデシル基、n - オクタデシル基、ネオペンチル基、1 - メチルペンチル基、2 - メチルペンチル基、1 - ペンチルヘキシル基、1 - ブチルペンチル基、1 - ヘプチルオクチル基、3 - メチルペンチル基等が挙げられる。

【0041】

上記炭素数 1 ~ 20 のハロアルキル基としては、例えば、クロロメチル基、1 - クロロエチル基、2 - クロロエチル基、2 - クロロイソブチル基、1, 2 - ジクロロエチル基、1, 3 - ジクロロイソプロピル基、2, 3 - ジクロロ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリクロロプロピル基、プロモメチル基、1 - プロモエチル基、2 - プロモエチル基、2 - プロモイソブチル基、1, 2 - ジプロモエチル基、1, 3 - ジプロモイソプロピル基、2, 3 - ジプロモ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリプロモプロピル基、ヨードメチル基、1 - ヨードエチル基、2 - ヨードエチル基、2 - ヨードイソブチル基、1, 2 - ジヨードエチル基、1, 3 - ジヨードイソプロピル基、2, 3 - ジヨード - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリヨードプロピル基等が挙げられる。

【0042】

上記炭素数 5 ~ 18 のシクロアルキル基としては、例えば、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、3, 5 - テトラメチルシクロヘキシル基等が挙げられ、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、3, 5 - テトラメチルシクロヘキシル基等が挙げられる。

【0043】

上記炭素数 3 ~ 20 のシリル基としては、例えば、アルキルシリル基、アリールシリル基、又は、アラルキルシリル基が好ましく、例としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリブチルシリル基、トリオクチルシリル基、トリイソブチルシリル基、ジメチルエチルシリル基、ジメチルイソプロピルシリル基、ジメチルプロピルシリル基、ジメチルブチルシリル基、ジメチルターシャリーブチルシリル基、ジエチルイソプロピルシリル基、フェニルジメチルシリル基、ジフェニルメチルシリル基、ジフェニルターシャリーブチルシリル基、トリフェニルシリル基等があげられる。

ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が挙げられる。

【 0 0 4 4 】

前記式 (1) における $A r^3$ は、置換または無置換のフェナントレン環、フルオランテン環、ベンゾフェナントレン環から選択される環であることが好ましい。

このように、環構造を選択することによって、安定性に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子用薄膜が形成でき、特に赤色燐光材料と共に用いた場合、高効率、長寿命な素子を構築できる。

【 0 0 4 5 】

本発明の有機 E L 素子用材料 (1) 又は有機 E L 素子用材料 (2) の励起 3 重項エネルギーは、2 . 0 e V 以上 2 . 8 e V 以下であることが好ましい。

10

励起 3 重項エネルギーが 2 . 0 e V 以上であれば、5 2 0 n m 以上 7 2 0 n m 以下で発光する燐光発光材料へのエネルギー移動が可能である。2 . 8 e V 以下であれば、赤色燐光ドーパントに対してエネルギーギャップの差が大きすぎて発光が効率的に行われないう問題を回避できる。

なお、本発明の有機 E L 素子用材料の励起 3 重項エネルギーは、2 . 0 e V 以上 2 . 7 e V 以下であることがより好ましく、2 . 1 e V 以上 2 . 7 e V 以下であることがさらに好ましい。





























【 0 0 4 6 】

上記有機 E L 素子用材料 (1) としては、例えば、以下に示す化合物が具体例として挙げられる。

20

【 0 0 4 7 】

【化 1 0】



【 0 0 4 8】


10

20


30

40


【化 1 1】




(1-29)




(1-30)




(1-31)




(1-32)




(1-33)




(1-34)




(1-35)




(1-36)




(1-37)




(1-38)




(1-39)




(1-40)




(1-41)




(1-42)




(1-43)




(1-44)




(1-45)




(1-46)



(1-47)




(1-48)



(1-49)


【 0 0 4 9 】

【化 1 2】



【 0 0 5 0 】

【化 1 3】




【 0 0 5 1】

10

上記有機 E L 素子用材料 (2) としては、例えば、以下に示す化合物が具体例として挙げられる。

【 0 0 5 2】

【化 1 4】




20

30

【 0 0 5 3】

【化 1 5】



【 0 0 5 4】

(有機エレクトロルミネッセンス素子)

本発明はまた、陰極と陽極との間に、1層または複数層からなる有機薄膜層を備え、該有機薄膜層が、上記有機EL素子用材料(1)又は有機EL素子用材料(2)と、燐光発光材料少なくとも1種とを含む有機エレクトロルミネッセンス素子をも提供する。

【 0 0 5 5】

(素子構成)

以下、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の素子構成について説明する。

有機エレクトロルミネッセンス素子の代表的な素子構成としては、

- (1) 陽極 / 発光層 / 陰極
- (2) 陽極 / 正孔注入層 / 発光層 / 陰極
- (3) 陽極 / 発光層 / 電子注入・輸送層 / 陰極

- (4) 陽極 / 正孔注入層 / 発光層 / 電子注入・輸送層 / 陰極
- (5) 陽極 / 有機半導体層 / 発光層 / 陰極
- (6) 陽極 / 有機半導体層 / 電子障壁層 / 発光層 / 陰極
- (7) 陽極 / 有機半導体層 / 発光層 / 付着改善層 / 陰極
- (8) 陽極 / 正孔注入・輸送層 / 発光層 / 電子注入・輸送層 / 陰極
- (9) 陽極 / 絶縁層 / 発光層 / 絶縁層 / 陰極
- (10) 陽極 / 無機半導体層 / 絶縁層 / 発光層 / 絶縁層 / 陰極
- (11) 陽極 / 有機半導体層 / 絶縁層 / 発光層 / 絶縁層 / 陰極
- (12) 陽極 / 絶縁層 / 正孔注入・輸送層 / 発光層 / 絶縁層 / 陰極
- (13) 陽極 / 絶縁層 / 正孔注入・輸送層 / 発光層 / 電子注入・輸送層 / 陰極

10

などの構造を挙げることができる。

上記の中で(8)の素子構成が好ましく用いられるが、もちろんこれらに限定されるものではない。

【 0 0 5 6 】

図 1 に、本発明の実施形態における有機エレクトロルミネッセンス素子の一例の概略構成を示す。

有機エレクトロルミネッセンス素子 1 は、透明な基板 2 と、陽極 3 と、陰極 4 と、陽極 3 と陰極 4 との間に配置された有機薄膜層 10 とを有する。

有機薄膜層 10 は、燐光ホストおよび燐光ドーパントを含む燐光発光層 5 を有するが、燐光発光層 5 と陽極 3 との間に正孔注入・輸送層 6 等、燐光発光層 5 と陰極 4 との間に電

20

子注入・輸送層 7 等を備えていてもよい。

また、燐光発光層 5 の陽極 3 側に電子障壁層を、燐光発光層 5 の陰極 4 側に正孔障壁層を、それぞれ設けてもよい。

これにより、電子や正孔を燐光発光層 5 に閉じ込めて、燐光発光層 5 における励起子の生成確率を高めることができる。

【 0 0 5 7 】

なお、本明細書において、蛍光ホストおよび燐光ホストの用語は、蛍光ドーパントと組み合わせられたときには蛍光ホストと称し、燐光ドーパントと組み合わせられたときには燐光ホストと称するものであり、分子構造のみから一義的に蛍光ホストや燐光ホストに限定的に区分されるものではない。

30

言い換えると、本明細書において、蛍光ホストとは、蛍光ドーパントを含有する蛍光発光層を構成する材料を意味し、蛍光材料のホストにしか利用できないものを意味しているわけではない。

同様に燐光ホストとは、燐光ドーパントを含有する燐光発光層を構成する材料を意味し、燐光発光材料のホストにしか利用できないものを意味しているわけではない。

【 0 0 5 8 】

また、本明細書中で「正孔注入・輸送層」は「正孔注入層および正孔輸送層の少なくともいずれか 1 つ」を意味し、「電子注入・輸送層」は「電子注入層および電子輸送層の少なくともいずれか 1 つ」を意味する。

【 0 0 5 9 】

40

(透光性基板)

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、透光性の基板上に作製する。ここでいう透光性基板は有機エレクトロルミネッセンス素子を支持する基板であり、400 ~ 700 nm の可視領域の光の透過率が 50 % 以上で平滑な基板が好ましい。

具体的には、ガラス板、ポリマー板等が挙げられる。

ガラス板としては、特にソーダ石灰ガラス、バリウム・ストロンチウム含有ガラス、鉛ガラス、アルミノケイ酸ガラス、ホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石英等が挙げられる。

またポリマー板としては、ポリカーボネート系樹脂、アクリル系樹脂、ポリエチレンテレフタレート系樹脂、ポリエーテルサルファイド系樹脂、ポリサルフォン系樹脂等を原

50

料として用いてなるものを挙げることができる。

【0060】

(陽極及び陰極)

有機エレクトロルミネッセンス素子の陽極は、正孔を、正孔注入層、正孔輸送層又は発光層に注入する役割を担うものであり、4.5 eV以上の仕事関数を有することが効果的である。

陽極材料の具体例としては、酸化インジウム錫合金(ITO)、酸化錫(NESA)、酸化インジウム亜鉛酸化物、金、銀、白金、銅等が挙げられる。

陽極はこれらの電極物質を蒸着法やスパッタリング法等の方法で薄膜を形成させることにより作製することができる。

10

本実施形態のように、発光層からの発光を陽極から取り出す場合、陽極の可視領域の光の透過率を10%より大きくすることが好ましい。また、陽極のシート抵抗は、数百Ω/□以下が好ましい。陽極の膜厚は、材料にもよるが、通常10nm~1μm、好ましくは10~200nmの範囲で選択される。

【0061】

陰極としては、電子注入層、電子輸送層又は発光層に電子を注入する目的で、仕事関数の小さい材料が好ましい。

陰極材料は特に限定されないが、具体的にはインジウム、アルミニウム、マグネシウム、マグネシウム-インジウム合金、マグネシウム-アルミニウム合金、アルミニウム-リチウム合金、アルミニウム-スカンジウム-リチウム合金、マグネシウム-銀合金等が使用できる。

20

陰極も、陽極と同様に、蒸着法やスパッタリング法等の方法で薄膜を形成させることにより作製することができる。また、陰極側から、発光を取り出す態様を採用することもできる。

【0062】

(発光層)

有機エレクトロルミネッセンス素子の発光層は以下の機能を併せ持つものである。

すなわち、

(1) 注入機能；電界印加時に陽極又は正孔注入層より正孔を注入することができ、陰極又は電子注入層より電子を注入することができる機能、

30

(2) 輸送機能；注入した電荷(電子と正孔)を電界の力で移動させる機能、

(3) 発光機能；電子と正孔の再結合の場を提供し、これを発光につなげる機能、がある。

【0063】

ただし、正孔の注入されやすさと電子の注入されやすさに違いがあってもよく、また、正孔と電子の移動度で表される輸送能に大小があってもよい。

【0064】

この発光層を形成する方法としては、例えば蒸着法、スピコート法、LB法等の公知の方法を適用することができる。

発光層は、分子堆積膜であることが好ましい。

40

ここで分子堆積膜とは、気相状態の材料化合物から沈着され形成された薄膜や、溶液状態又は液相状態の材料化合物から固体化され形成された膜のことであり、通常この分子堆積膜は、LB法により形成された薄膜(分子累積膜)とは凝集構造、高次構造の相違や、それに起因する機能的な相違により区分することができる。

【0065】

また、特開昭57-51781号公報に開示されているように、樹脂等の結着剤と材料化合物とを溶剤に溶かして溶液とした後、これをスピコート法等により薄膜化することによっても、発光層を形成することができる。

さらに、発光層の膜厚は、好ましくは5~50nm、より好ましくは7~50nm、最も好ましくは10~50nmである。5nm未満では発光層形成が困難となり、色度の調

50

整が困難となる恐れがあり、50nmを超えると駆動電圧が上昇する恐れがある。

【0066】

本発明の有機EL素子における有機薄膜層は、少なくとも1つの発光層を有し、この発光層の少なくとも1つが、上記有機EL素子用材料(1)又は(2)と、燐光発光を示す燐光発光材料少なくとも1種とを含むことが好ましい。

【0067】

(燐光発光材料)

本発明において用いられる燐光発光材料は、燐光発光を示すものであり、金属錯体を含有するものが好ましい。該金属錯体としては、Ir, Pt, Os, Au, Cu, ReおよびRuから選択される金属原子と配位子とを有するものが好ましい。特に、前記配位子は、オルトメタル結合を有することが好ましい。

10


燐光量子収率が高く、発光素子の外部量子効率をより向上させることができるという点で、イリジウム(Ir)、オスミウム(Os)および白金(Pt)から選ばれる金属を含有する化合物であると好ましく、イリジウム錯体、オスミウム錯体、白金錯体等の金属錯体であるとさらに好ましく、中でもイリジウム錯体及び白金錯体がより好ましく、オルトメタル化イリジウム錯体が最も好ましい。

金属錯体の具体例を、以下に示すが、この中で緑～赤に発光する金属錯体が特に好ましい。

【0068】

【化16】

20



30

40


【0069】

The figure displays 12 chemical structures of iridium(III) complexes, arranged in four rows of three. Each structure is enclosed in brackets with a subscript indicating the number of ligands per iridium center.


- Row 1:**
 - Structure 1: [Ir(quinoline-2-yl)]₃. The quinoline ligand has a fluorine atom at the 8-position.
 - Structure 2: [Ir(quinoline-2-yl)(acetylacetonate)]₂. The quinoline ligand has a fluorine atom at the 8-position.
 - Structure 3: [Ir(quinoline-2-yl)]₃. The quinoline ligand has fluorine atoms at the 6 and 8 positions.
- Row 2:**
 - Structure 4: [Ir(quinoline-2-yl)]₃. The quinoline ligand has a fluorine atom at the 8-position and a methoxy group at the 4-position.
 - Structure 5: [Ir(quinoline-2-yl)]₂. The quinoline ligand has a fluorine atom at the 8-position. The second ligand is a 2,8-difluoroquinoline.
 - Structure 6: [Ir(quinoline-2-yl)]₃. The quinoline ligand has a fluorine atom at the 8-position and a methoxy group at the 4-position.
- Row 3:**
 - Structure 7: [Ir(quinoline-2-yl)]₃. The quinoline ligand has a fluorine atom at the 8-position and a diphenylamino group at the 4-position.
 - Structure 8: [Ir(quinoline-2-yl)]₂. The quinoline ligand has a fluorine atom at the 8-position and a dimethylamino group at the 4-position.
 - Structure 9: [Ir(quinoline-2-yl)]₃. The quinoline ligand has a fluorine atom at the 8-position and a methyl group at the 4-position.
- Row 4:**
 - Structure 10: [Pt(quinoline-2-yl)]₂. The quinoline ligand has a fluorine atom at the 8-position. The second ligand is a 2,8-difluoroquinoline.
 - Structure 11: [Ir(quinoline-2-yl)]₃. The quinoline ligand has a fluorine atom at the 8-position.
 - Structure 12: [Ir(quinoline-2-yl)]₃. The quinoline ligand has a fluorine atom at the 8-position.

【 0 0 7 0 】


【化 1 8】



10



20





【 0 0 7 1 】

Chemical structures of the complexes are shown below:


(a) $[Pt(phen)_2]^{2+}$: A platinum (Pt) center coordinated by two phenanthroline (phen) ligands.

(b) $[Ir(CF_3-phen)_3]^+$: An iridium (Ir) center coordinated by three 4-(trifluoromethyl)phenanthroline (CF_3 -phen) ligands.

(c) $[Ir(phen)(thiophene)]^{2+}$: An iridium (Ir) center coordinated by one phenanthroline (phen) ligand and two thiophene ligands.



【化 2 0】



本発明では、前記発光層に含まれる前記燐光発光材料のうち少なくとも１種は、発光波長の極大値が５２０ｎｍ以上７２０ｎｍ以下であることが好ましく、５７０ｎｍ以上７２０ｎｍ以下であることがより好ましい。

【 0 0 7 4 】

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、正孔輸送層（正孔注入層）を有していてもよく、該正孔輸送層（正孔注入層）が上記式（１）で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含有しても好ましい。また、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、電子輸送層及び／又は正孔障壁層を有していてもよく、該電子輸送層及び／又は正孔障壁層が、上記式（１）で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含有しても好ましい。

【００７５】

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、陰極と有機薄膜層との界面領域に還元性ドーパントを有することも好ましい。

このような構成によれば、有機エレクトロルミネッセンス素子における発光輝度の向上や長寿命化が図られる。

還元性ドーパントとしては、アルカリ金属、アルカリ金属錯体、アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属、アルカリ土類金属錯体、アルカリ土類金属化合物、希土類金属、希土類金属錯体、及び希土類金属化合物等から選ばれた少なくとも一種類が挙げられる。

【００７６】

アルカリ金属としては、Na（仕事関数：2.36 eV）、K（仕事関数：2.28 eV）、Rb（仕事関数：2.16 eV）、Cs（仕事関数：1.95 eV）等が挙げられ、仕事関数が2.9 eV以下のものが特に好ましい。これらのうち好ましくはK、Rb、Cs、さらに好ましくはRb又はCsであり、最も好ましくはCsである。

アルカリ土類金属としては、Ca（仕事関数：2.9 eV）、Sr（仕事関数：2.0 ~ 2.5 eV）、Ba（仕事関数：2.52 eV）等が挙げられ、仕事関数が2.9 eV以下のものが特に好ましい。

希土類金属としては、Sc、Y、Ce、Tb、Yb等が挙げられ、仕事関数が2.9 eV以下のものが特に好ましい。

以上の金属のうち好ましい金属は、特に還元能力が高く、電子注入域への比較的少量の添加により、有機エレクトロルミネッセンス素子における発光輝度の向上や長寿命化が可能である。

【００７７】

アルカリ金属化合物としては、Li₂O、Cs₂O、K₂O等のアルカリ酸化物、LiF、NaF、CsF、KF等のアルカリハロゲン化物等が挙げられ、LiF、Li₂O、NaFが好ましい。

アルカリ土類金属化合物としては、BaO、SrO、CaO及びこれらを混合したBa_xSr_{1-x}O（0 < x < 1）、Ba_xCa_{1-x}O（0 < x < 1）等が挙げられ、BaO、SrO、CaOが好ましい。

希土類金属化合物としては、YbF₃、ScF₃、ScO₃、Y₂O₃、Ce₂O₃、GdF₃、TbF₃等が挙げられ、YbF₃、ScF₃、TbF₃が好ましい。

【００７８】

アルカリ金属錯体、アルカリ土類金属錯体、希土類金属錯体としては、それぞれ金属イオンとしてアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンの少なくとも一つ含有するものであれば特に限定はない。また、配位子にはキノリノール、ベンゾキノリノール、アクリジノール、フェナントリジノール、ヒドロキシフェニルオキサゾール、ヒドロキシフェニルチアゾール、ヒドロキシジアリールオキサジアゾール、ヒドロキシジアリールチアジアゾール、ヒドロキシフェニルピリジン、ヒドロキシフェニルベンゾイミダゾール、ヒドロキシベンゾトリアゾール、ヒドロキシフルボラン、ビピリジル、フェナントロリン、フタロシアニン、ポルフィリン、シクロペンタジエン、β-ジケトン類、アゾメチン類、及びそれらの誘導体などが好ましいが、これらに限定されるものではない。

【００７９】

還元性ドーパントの添加形態としては、界面領域に層状又は島状に形成すると好ましい。形成方法としては、抵抗加熱蒸着法により還元性ドーパントを蒸着しながら、界面領域

10

20

30

40

50

を形成する発光材料や電子注入材料である有機物を同時に蒸着させ、有機物中に還元ドーパントを分散する方法が好ましい。分散濃度はモル比で有機物：還元性ドーパント = 100 : 1 ~ 1 : 100、好ましくは 5 : 1 ~ 1 : 5 である。

還元性ドーパントを層状に形成する場合は、界面の有機層である発光材料や電子注入材料を層状に形成した後に、還元ドーパントを単独で抵抗加熱蒸着法により蒸着し、好ましくは層の厚み 0.1 ~ 15 nm で形成する。

還元性ドーパントを島状に形成する場合は、界面の有機層である発光材料や電子注入材料を島状に形成した後に、還元ドーパントを単独で抵抗加熱蒸着法により蒸着し、好ましくは島の厚み 0.05 ~ 1 nm で形成する。

また、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子における、主成分と還元性ドーパントの割合としては、モル比で主成分：還元性ドーパント = 5 : 1 ~ 1 : 5 であると好ましく、2 : 1 ~ 1 : 2 であるとさらに好ましい。

【0080】

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、発光層と陰極との間に電子輸送層又は電子注入層を有し、該電子輸送層又は電子注入層は、上記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含むことが好ましく、主成分として含むことがより好ましい。ここで、電子注入層は電子輸送層として機能する層であってもよい。

なお、「主成分として」とは、電子注入層が 50 質量% 以上の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含有していることを意味する。

電子注入層又は電子輸送層は、発光層への電子の注入を助ける層であって、電子移動度が大きい。電子注入層はエネルギーレベルの急な変化を緩和する等、エネルギーレベルを調整するために設ける。


電子輸送層又は電子注入層に用いる電子輸送性材料としては、分子内にヘテロ原子を 1 個以上含有する芳香族ヘテロ環化合物が好ましく用いられ、特に含窒素環誘導体が好ましい。また、含窒素環誘導体としては、含窒素 6 員環もしくは 5 員環骨格を有する芳香族環、または含窒素 6 員環もしくは 5 員環骨格を有する縮合芳香族環化合物が好ましい。

【0081】

この含窒素環誘導体としては、例えば、下記式 (A) で表される含窒素環金属キレート錯体が好ましい。

【0082】

【化21】



【0083】

$R^2 \sim R^7$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、オキシ基、アミノ基、炭素数 1 ~ 40 の炭化水素基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルコキシカルボニル基、または、複素環基であり、これらは置換されていてもよい。

ハロゲン原子としては、例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等が挙げられる。また、置換されていてもよいアミノ基の例としては、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、アラルキルアミノ基が挙げられる。

炭素数 1 ~ 40 の炭化水素基としては、置換もしくは無置換のアルキル基、アルケニル

基、シクロアルキル基、アリール基、アラルキル基等が挙げられる。

【0084】

アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、n-ノニル基、n-デシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、n-トリデシル基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、n-ヘキサデシル基、n-ヘプタデシル基、n-オクタデシル基、ネオペンチル基、1-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、1-ペンチルヘキシル基、1-ブチルペンチル基、1-ヘプチルオクチル基、3-メチルペンチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1, 2-ジヒドロキシエチル基、1, 3-ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3-ジヒドロキシ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1, 2-ジクロロエチル基、1, 3-ジクロロイソプロピル基、2, 3-ジクロロ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1, 2-ジブロモエチル基、1, 3-ジブロモイソプロピル基、2, 3-ジブロモ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1, 2-ジヨードエチル基、1, 3-ジヨードイソプロピル基、2, 3-ジヨード-t-ブチル基、1, 2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1, 2-ジアミノエチル基、1, 3-ジアミノイソプロピル基、2, 3-ジアミノ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1, 2-ジシアノエチル基、1, 3-ジシアノイソプロピル基、2, 3-ジシアノ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、1, 2-ジニトロエチル基、2, 3-ジニトロ-t-ブチル基、1, 2, 3-トリニトロプロピル基等が挙げられる。

【0085】

これらの中でも好ましくは、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、n-ノニル基、n-デシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、n-トリデシル基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、n-ヘキサデシル基、n-ヘプタデシル基、n-オクタデシル基、ネオペンチル基、1-メチルペンチル基、1-ペンチルヘキシル基、または、1-ブチルペンチル基、1-ヘプチルオクチル基である。

【0086】

アルケニル基としては、例えば、ビニル基、アリル基、1-ブテニル基、2-ブテニル基、3-ブテニル基、1, 3-ブタンジエニル基、1-メチルビニル基、スチリル基、2, 2-ジフェニルビニル基、1, 2-ジフェニルビニル基、1-メチルアリル基、1, 1-ジメチルアリル基、2-メチルアリル基、1-フェニルアリル基、2-フェニルアリル基、3-フェニルアリル基、3, 3-ジフェニルアリル基、1, 2-ジメチルアリル基、1-フェニル-1-ブテニル基、3-フェニル-1-ブテニル基等が挙げられ、好ましくは、スチリル基、2, 2-ジフェニルビニル基、1, 2-ジフェニルビニル基等が挙げられる。

【0087】

シクロアルキル基としては、例えば、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、3, 5-テトラメチルシクロヘキシル基等が挙げられ、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、および、3, 5-テトラメチルシクロヘキシル基が好ましい。

アルコキシ基は-OYと表される基である。Yの具体例としては、前記アルキル基で説明したものと同様のものが挙げられ、好ましい例も同様である。

【 0 0 8 8 】

非縮合アリール基としては、例えば、フェニル基、ビフェニル - 2 - イル基、ビフェニル - 3 - イル基、ビフェニル - 4 - イル基、p - ターフェニル - 4 - イル基、p - ターフェニル - 3 - イル基、p - ターフェニル - 2 - イル基、m - ターフェニル - 4 - イル基、m - ターフェニル - 3 - イル基、m - ターフェニル - 2 - イル基、o - トリル基、m - トリル基、p - トリル基、p - t - ブチルフェニル基、p - (2 - フェニルプロピル) フェニル基、4' - メチルビフェニルイル基、4'' - t - ブチル - p - ターフェニル - 4 - イル基、o - クメニル基、m - クメニル基、p - クメニル基、2 , 3 - キシリル基、3 , 4 - キシリル基、2 , 5 - キシリル基、メシチル基、および、m - クウォーターフェニル基等が挙げられる。

10

【 0 0 8 9 】

これらの中でも好ましくは、フェニル基、ビフェニル - 2 - イル基、ビフェニル - 3 - イル基、ビフェニル - 4 - イル基、m - ターフェニル - 4 - イル基、m - ターフェニル - 3 - イル基、m - ターフェニル - 2 - イル基、p - トリル基、3 , 4 - キシリル基、m - クウォーターフェニル - 2 - イル基である。

縮合アリール基としては、例えば、1 - ナフチル基、2 - ナフチル基が挙げられる。

【 0 0 9 0 】

複素環基は、単環又は縮合環であり、好ましくは核炭素数 1 ~ 20、より好ましくは核炭素数 1 ~ 12、さらに好ましくは核炭素数 2 ~ 10 の複素環基であり、窒素原子、酸素原子、硫黄原子、セレン原子の少なくとも一つのヘテロ原子を含む芳香族複素環基である。この複素環基の例としては、例えば、ピロリジン、ピペリジン、ピペラジン、モルフォリン、チオフェン、セレノフェン、フラン、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、ビリジン、ピラジン、ピリダジン、ピリミジン、トリアゾール、トリアジン、インドール、インダゾール、プリン、チアゾリン、チアゾール、チアジアゾール、オキサゾリン、オキサゾール、オキサジアゾール、キノリン、イソキノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、プテリジン、アクリジン、フェナントロリン、フェナジン、テトラゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾトリアゾール、テトラザインデン、カルバゾール、アゼピン等から誘導される基が挙げられ、好ましくは、フラン、チオフェン、ビリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、トリアジン、キノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリンであり、より好ましくはフラン、チオフェン、ビリジン、および、キノリンから誘導される基であり、さらに好ましくはキノリニル基である。

20

30

【 0 0 9 1 】

アラルキル基としては、例えば、ベンジル基、1 - フェニルエチル基、2 - フェニルエチル基、1 - フェニルイソプロピル基、2 - フェニルイソプロピル基、フェニル - t - ブチル基、 α - ナフチルメチル基、1 - α - ナフチルエチル基、2 - α - ナフチルエチル基、1 - α - ナフチルイソプロピル基、2 - α - ナフチルイソプロピル基、 β - ナフチルメチル基、1 - β - ナフチルエチル基、2 - β - ナフチルエチル基、1 - β - ナフチルイソプロピル基、2 - β - ナフチルイソプロピル基、p - メチルベンジル基、m - メチルベンジル基、o - メチルベンジル基、p - クロロベンジル基、m - クロロベンジル基、o - クロロベンジル基、p - ブロモベンジル基、m - ブロモベンジル基、o - ブロモベンジル基、p - ヨードベンジル基、m - ヨードベンジル基、o - ヨードベンジル基、p - ヒドロキシベンジル基、m - ヒドロキシベンジル基、o - ヒドロキシベンジル基、p - アミノベンジル基、m - アミノベンジル基、o - アミノベンジル基、p - ニトロベンジル基、m - ニトロベンジル基、o - ニトロベンジル基、p - シアノベンジル基、m - シアノベンジル基、o - シアノベンジル基、1 - ヒドロキシ - 2 - フェニルイソプロピル基、1 - クロロ - 2 - フェニルイソプロピル基等が挙げられる。

40

【 0 0 9 2 】

これらの中でも好ましくは、ベンジル基、p - シアノベンジル基、m - シアノベンジル基、o - シアノベンジル基、1 - フェニルエチル基、2 - フェニルエチル基、1 - フェニ

50

ルイソプロピル基、2 - フェニルイソプロピル基である。

【0093】

アリールオキシ基は、- O Y ' と表され、Y ' の例としてはフェニル基、1 - ナフチル基、2 - ナフチル基、1 - アントリル基、2 - アントリル基、9 - アントリル基、1 - フェナントリル基、2 - フェナントリル基、3 - フェナントリル基、4 - フェナントリル基、9 - フェナントリル基、1 - ナфтаセニル基、2 - ナфтаセニル基、9 - ナфтаセニル基、1 - ビレニル基、2 - ビレニル基、4 - ビレニル基、2 - ビフェニルイル基、3 - ビフェニルイル基、4 - ビフェニルイル基、p - ターフェニル - 4 - イル基、p - ターフェニル - 3 - イル基、p - ターフェニル - 2 - イル基、m - ターフェニル - 4 - イル基、m - ターフェニル - 3 - イル基、m - ターフェニル - 2 - イル基、o - トリル基、m - トリル基、p - トリル基、p - t - ブチルフェニル基、p - (2 - フェニルプロピル)フェニル基、3 - メチル - 2 - ナフチル基、4 - メチル - 1 - ナフチル基、4 - メチル - 1 - アントリル基、4 ' - メチルビフェニルイル基、4 " - t - ブチル - p - ターフェニル - 4 - イル基等が挙げられる。

【0094】

アリールオキシ基のうちヘテロアリールオキシ基は、- O Z ' と表され、Z ' の例としては2 - ピロリル基、3 - ピロリル基、ピラジニル基、2 - ピリジニル基、3 - ピリジニル基、4 - ピリジニル基、2 - インドリル基、3 - インドリル基、4 - インドリル基、5 - インドリル基、6 - インドリル基、7 - インドリル基、1 - イソインドリル基、3 - イソインドリル基、4 - イソインドリル基、5 - イソインドリル基、6 - イソインドリル基、7 - イソインドリル基、2 - フリル基、3 - フリル基、2 - ベンゾフラニル基、3 - ベンゾフラニル基、4 - ベンゾフラニル基、5 - ベンゾフラニル基、6 - ベンゾフラニル基、7 - ベンゾフラニル基、1 - イソベンゾフラニル基、3 - イソベンゾフラニル基、4 - イソベンゾフラニル基、5 - イソベンゾフラニル基、6 - イソベンゾフラニル基、7 - イソベンゾフラニル基、2 - キノリル基、3 - キノリル基、4 - キノリル基、5 - キノリル基、6 - キノリル基、7 - キノリル基、8 - キノリル基、1 - イソキノリル基、3 - イソキノリル基、4 - イソキノリル基、5 - イソキノリル基、6 - イソキノリル基、7 - イソキノリル基、8 - イソキノリル基、2 - キノキサリニル基、5 - キノキサリニル基、6 - キノキサリニル基、1 - カルバゾリル基、2 - カルバゾリル基、3 - カルバゾリル基、4 - カルバゾリル基、1 - フェナンスリジニル基、2 - フェナンスリジニル基、3 - フェナンスリジニル基、4 - フェナンスリジニル基、6 - フェナンスリジニル基、7 - フェナンスリジニル基、8 - フェナンスリジニル基、9 - フェナンスリジニル基、10 - フェナンスリジニル基、1 - アクリジニル基、2 - アクリジニル基、3 - アクリジニル基、4 - アクリジニル基、9 - アクリジニル基、1, 7 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 8 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 9 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 7 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 9 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 7 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 8 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 7 - イル基、2, 9 - フェナンスロ

10

20

30

40

50

リン - 8 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 10 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 7 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 9 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 10 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 8 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 9 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1 - フェナジニル基、2 - フェナジニル基、1 - フェノチアジニル基、2 - フェノチアジニル基、3 - フェノチアジニル基、4 - フェノチアジニル基、1 - フェノキサジニル基、2 - フェノキサジニル基、3 - フェノキサジニル基、4 - フェノキサジニル基、2 - オキサゾリル基、4 - オキサゾリル基、5 - オキサゾリル基、2 - オキサジアゾリル基、5 - オキサジアゾリル基、3 - フラザニル基、2 - チエニル基、3 - チエニル基、2 - メチルピロール - 1 - イル基、2 - メチルピロール - 3 - イル基、2 - メチルピロール - 4 - イル基、2 - メチルピロール - 5 - イル基、3 - メチルピロール - 1 - イル基、3 - メチルピロール - 2 - イル基、3 - メチルピロール - 4 - イル基、3 - メチルピロール - 5 - イル基、2 - t - ブチルピロール - 4 - イル基、3 - (2 - フェニルプロピル)ピロール - 1 - イル基、2 - メチル - 1 - インドリル基、4 - メチル - 1 - インドリル基、2 - メチル - 3 - インドリル基、4 - メチル - 3 - インドリル基、2 - t - ブチル 1 - インドリル基、4 - t - ブチル 1 - インドリル基、2 - t - ブチル 3 - インドリル基、4 - t - ブチル 3 - インドリル基等が挙げられる。

10

20

【0095】

アルコキシカルボニル基は - C O O Y ' と表され、Y ' の例としては前記アルキル基と同様のものが挙げられる。

【0096】

アルキルアミノ基およびアラルキルアミノ基は - N Q¹Q² と表される。Q¹及びQ²の具体例としては、それぞれ独立に、前記アルキル基、前記アラルキル基で説明したものと同様のものが挙げられ、好ましい例も同様である。Q¹およびQ²の一方は水素原子であってもよい。

アリールアミノ基は - N A r¹A r² と表され、A r¹およびA r²の具体例としては、それぞれ独立に前記非縮合アリール基および縮合アリールで説明した基と同様である。A r¹およびA r²の一方は水素原子であってもよい。

30


【0097】

Mは、アルミニウム (A l)、ガリウム (G a) 又はインジウム (I n) であり、I n であると好ましい。


上記式 (A) の L は、下記式 (A') 又は (A'') で表される基である。

【0098】

【化 2 2】



又は



10

【 0 0 9 9 】

前記式中、 $R^8 \sim R^{12}$ は、それぞれ独立に、水素原子又は置換もしくは無置換の炭素数 1 ～ 40 の炭化水素基であり、互いに隣接する基が環状構造を形成していてもよい。また、 $R^{13} \sim R^{27}$ は、それぞれ独立に、水素原子又は置換もしくは無置換の炭素数 1 ～ 40 の炭化水素基であり、互いに隣接する基が環状構造を形成していてもよい。

20

【 0 1 0 0 】

前記式 (A') 及び式 (A'') の $R^8 \sim R^{12}$ 及び $R^{13} \sim R^{27}$ が示す炭素数 1 ～ 40 の炭化水素基としては、 $R^2 \sim R^7$ の具体例と同様のものが挙げられる。

また、 $R^8 \sim R^{12}$ 及び $R^{13} \sim R^{27}$ の互いに隣接する基が環状構造を形成した場合の 2 価の基としては、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、ジフェニルメタン - 2, 2' - ジイル基、ジフェニルエタン - 3, 3' - ジイル基、ジフェニルプロパン - 4, 4' - ジイル基等が挙げられる。


【 0 1 0 1 】

前記式 (A) で表される含窒素環金属キレート錯体の具体例を以下に示すが、これら例示化合物に限定されるものではない。

30

【 0 1 0 2 】

【化 2 3】



【 0 1 0 3】


10

20

30

40

【化 2 4】



【 0 1 0 4】







10

20

30

40

【化 25】



【0105】

本発明では、電子注入層や電子輸送層は、含窒素複素環誘導体を含むことが好ましい。

【0106】

電子注入層又は電子輸送層は、発光層への電子の注入を助ける層であって、電子移動度が大きい。電子注入層はエネルギーレベルの急な変化を緩和する等、エネルギーレベルを調整するために設ける。電子注入層又は電子輸送層に用いられる材料としては、8-ヒドロキシキノリン又はその誘導体の金属錯体、オキサジアゾール誘導体、含窒素複素環誘導体が好適である。上記8-ヒドロキシキノリン又はその誘導体の金属錯体の具体例としては、オキシシ（一般に8-キノリノール又は8-ヒドロキシキノリン）のキレートを含む金属キレートオキシノイド化合物、例えばトリス（8-キノリノール）アルミニウムを用いることができる。そして、オキサジアゾール誘導体としては、下記のことを挙げるこ

10

20

30


40

50

ができる。

【 0 1 0 7 】

【 化 2 6 】



10

【 0 1 0 8 】


前記式中、 Ar^{17} 、 Ar^{18} 、 Ar^{19} 、 Ar^{21} 、 Ar^{22} 及び Ar^{25} は、それぞれ置換基を有する若しくは有しないアリール基を示し、 Ar^{17} と Ar^{18} 、 Ar^{19} と Ar^{21} 、 Ar^{22} と Ar^{25} は、たがいに同一でも異なってもよい。 Ar^{20} 、 Ar^{23} 及び Ar^{24} は、それぞれ置換基を有する若しくは有しないアリーレン基を示し、 Ar^{23} と Ar^{24} は、たがいに同一でも異なってもよい。

また、アリーレン基としては、フェニレン基、ナフチレン基、ピフェニレン基、アントラニレン基、ペリレニレン基、ピレニレン基などが挙げられる。そして、これらへの置換基としては炭素数1～10のアルキル基、炭素数1～10のアルコキシ基またはシアノ基等が挙げられる。この電子伝達化合物は、薄膜形成性の良好なものが好ましく用いられる。そして、これら電子伝達性化合物の具体例としては、下記のことを挙げる事ができる。

20

【 0 1 0 9 】

【 化 2 7 】



30

40


【 0 1 1 0 】

含窒素複素環誘導体としては、以下のを有する有機化合物からなる含窒素複素環誘導体であって、金属錯体でない含窒素化合物が挙げられる。例えば、(A)に示す骨格を含有する5員環もしくは6員環や、(B)に示す構造のものが挙げられる。

50

【 0 1 1 1 】

【 化 2 8 】



10

【 0 1 1 2 】

前記 (B) 中、X は炭素原子もしくは窒素原子を表す。Z₁ ならびに Z₂ は、それぞれ独立に含窒素ヘテロ環を形成可能な原子群を表す。

【 0 1 1 3 】

【 化 2 9 】



20

【 0 1 1 4 】

好ましくは、5員環もしくは6員環からなる含窒素芳香多環族を有する有機化合物。さらには、このような複数窒素原子を有する含窒素芳香多環族の場合は、上記式 (A) と (B) もしくは式 (A) と (C) を組み合わせた骨格を有する含窒素芳香多環有機化合物。


【 0 1 1 5 】

含窒素有機化合物の含窒素基は、例えば、以下で表される含窒素複素環基から選択される。

30

【 0 1 1 6 】

【化 3 0】



10

20

30

【0117】


前記各式中、Rは、炭素数6～40のアリール基、炭素数3～40のヘテロアリール基、炭素数1～20のアルキル基又は炭素数1～20のアルコキシ基であり、nは0～5の整数であり、nが2以上の整数であるとき、複数のRは互いに同一又は異なってもよい。

【0118】

さらに、好ましい具体的な化合物として、下記式で表される含窒素複素環誘導体が挙げられる。

【0119】

【化 3 1】



【0120】

前記式中、HArは、置換基を有していても良い炭素数3～40の含窒素複素環であり、 L^1 は単結合、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリーレン基又は置換基を

40

50


有していてもよい炭素数 3 ~ 40 のヘテロアリーレン基であり、 Ar^1 は置換基を有していてもよい炭素数 6 ~ 40 の 2 価の芳香族炭化水素基であり、 Ar^2 は置換基を有していてもよい炭素数 6 ~ 40 のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 40 のヘテロアリール基である。

【0121】

HAr は、例えば、下記の群から選択される。

【0122】

【化32】




【0123】

L^1 は、例えば、下記の群から選択される。

【0124】

【化33】




【0125】

50

Ar^2 は、例えば、下記の群から選択される。

【0126】

【化34】




10

【0127】

Ar^1 は、例えば、下記のアリールアントラニル基から選択される。

【0128】

【化35】



20

【0129】

前記式中、 $R^1 \sim R^{14}$ は、それぞれ独立して、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1～20のアルキル基、炭素数1～20のアルコキシ基、炭素数6～40のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリール基又は炭素数3～40のヘテロアリール基であり、 Ar^3 は、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリール基又は炭素数3～40のヘテロアリール基である。

30


また、上記式で表される Ar^1 において、 $R^1 \sim R^8$ は、いずれも水素原子である含窒素複素環誘導体。

【0130】

この他、下記の化合物（特開平9-3448号公報参照）も好適に用いられる。

【0131】

【化36】



40

【0132】

前記式中、 $R_1 \sim R_4$ は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは未置換の脂肪族基、

50


置換もしくは未置換の脂肪族式環基、置換もしくは未置換の炭素環式芳香族環基、置換もしくは未置換の複素環基を表し、 X_1 、 X_2 は、それぞれ独立に、酸素原子、硫黄原子もしくはジシアノメチレン基を表す。

【 0 1 3 3 】

また、下記の化合物（特開 2 0 0 0 - 1 7 3 7 7 4 号公報参照）も好適に用いられる。

【 0 1 3 4 】

【 化 3 7 】




10

【 0 1 3 5 】

前記式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 及び R^4 は互いに同一の又は異なる基であって、下記式で表わされるアリール基である。

【 0 1 3 6 】

【 化 3 8 】



20

【 0 1 3 7 】

前記式中、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 及び R^9 は互いに同一の又は異なる基であって、水素原子、或いはそれらの少なくとも1つが飽和または不飽和アルコキシ基、アルキル基、アミノ基又はアルキルアミノ基である。

30

【 0 1 3 8 】


さらに、該含窒素複素環基もしくは含窒素複素環誘導体を含む高分子化合物であってもよい。

【 0 1 3 9 】


また、電子輸送層は、下記式（201）～（203）で表される含窒素複素環誘導体の少なくともいずれか1つを含有することが好ましい。

【 0 1 4 0 】


【化 3 9】



10



20



30

【0141】

前記式(201)～(203)中、Rは、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリール基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいキノリル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基又は置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基で、nは0～4の整数であり、R¹は、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリール基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいキノリル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基又は炭素数1～20のアルコキシ基であり、R²及びR³は、それぞれ独立に、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリール基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいキノリル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基又は置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基であり、Lは、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリーレン基、置換基を有していてもよいピリジニレン基、置換基を有していてもよいキノリニレン基又は置換基を有していてもよいフルオレニレン基であり、Ar¹は、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリーレン基、置換基を有していてもよいピリジニレン基又は置換基を有していてもよいキノリニレン基であり、Ar²は、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリール基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいキノリル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基又は置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基である。

40

50

Ar^3 は、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリール基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいキノリル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基、又は $-Ar^1-Ar^2$ で表される基(Ar^1 及び Ar^2 は、それぞれ前記と同じ)である。

【0142】

なお、前記式(201)～(203)において、Rは、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリール基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいキノリル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基又は置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基である。

【0143】

前記炭素数6～60のアリール基としては、炭素数6～40のアリール基が好ましく、炭素数6～20のアリール基がさらに好ましく、具体的には、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、ナфтаセニル基、クリセニル基、ピレニル基、ビフェニル基、ターフェニル基、トリル基、*t*-ブチルフェニル基、(2-フェニルプロピル)フェニル基、フルオランテニル基、フルオレニル基、スピロビフルオレンからなる1価の基、パーフルオロフェニル基、パーフルオロナフチル基、パーフルオロアントリル基、パーフルオロビフェニル基、9-フェニルアントラセンからなる1価の基、9-(1'-ナフチル)アントラセンからなる1価の基、9-(2'-ナフチル)アントラセンからなる1価の基、6-フェニルクリセンからなる1価の基、9-[4-(ジフェニルアミノ)フェニル]アントラセンからなる1価の基等が挙げられ、フェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、ターフェニル基、9-(10-フェニル)アントリル基、9-[10-(1'-ナフチル)]アントリル基、9-[10-(2'-ナフチル)]アントリル基等が好ましい。

【0144】

炭素数1～20のアルキル基としては、炭素数1～6のアルキル基が好ましく、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基等の他、トリフルオロメチル基等のハロアルキル基が挙げられ、炭素数が3以上のものは直鎖状、環状又は分岐を有するものでよい。

炭素数1～20のアルコキシ基としては、炭素数1～6のアルコキシ基が好ましく、具体的には、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基等が挙げられ、炭素数が3以上のものは直鎖状、環状又は分岐を有するものでよい。

【0145】

Rの示す各基の置換基としては、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数3～40のヘテロアリール基等が挙げられる。

ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等が挙げられる。

炭素数1～20のアルキル基、炭素数1～20のアルコキシ基、炭素数6～40のアリール基としては、前記と同様のものが挙げられる。

【0146】

炭素数6～40のアリールオキシ基としては、例えば、フェノキシ基、ビフェニルオキシ基等が挙げられる。

炭素数3～40のヘテロアリール基としては、例えば、ピローリル基、フリル基、チエニル基、シローリル基、ピリジル基、キノリル基、イソキノリル基、ベンゾフリル基、イミダゾリル基、ピリミジル基、カルバゾリル基、セレンフェニル基、オキサジアゾリル基、トリアゾリル基等が挙げられる。

nは0～4の整数であり、0～2であると好ましい。

【0147】

前記式(201)において、 R^1 は、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリール基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいキノリル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基又は炭素数1～20のアルコキシ基である。

これら各基の具体例、好ましい炭素数及び置換基としては、前記Rについて説明したものと同様である。

【0148】

前記式(202)及び(203)において、 R^2 及び R^3 は、それぞれ独立に、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリール基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいキノリル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基又は置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基である。

10

これら各基の具体例、好ましい炭素数及び置換基としては、前記Rについて説明したものと同様である。

【0149】

前記式(201)～(203)において、Lは、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリーレン基、置換基を有していてもよいピリジニレン基、置換基を有していてもよいキノリニレン基又は置換基を有していてもよいフルオレニレン基である。

炭素数6～60のアリーレン基としては、炭素数6～40のアリーレン基が好ましく、炭素数6～20のアリーレン基がさらに好ましく、具体的には、前記Rについて説明したアリール基から水素原子1個を除去して形成される2価の基が挙げられる。Lの示す各基の置換基としては、前記Rについて説明したものと同様である。


20

【0150】

また、Lは、下記からなる群から選択される基であると好ましい。

【0151】

【化40】



30

【0152】


前記式(201)において、 Ar^1 は、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリーレン基、置換基を有していてもよいピリジニレン基又は置換基を有していてもよいキノリニレン基である。 Ar^1 及び Ar^3 の示す各基の置換基としては、それぞれ前記Rについて説明したものと同様である。

40

また、 Ar^1 は、下記式(101)～(110)で表される縮合環基から選択されるいずれかの基であると好ましい。

【0153】

【化 4 1】



10

20

【 0 1 5 4 】


前記式(101)～(110)中、それぞれの縮合環は、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数3～40のヘテロアリール基からなる結合基が結合していてもよく、該結合基が複数ある場合は、該結合基は互いに同一でも異なってもよい。これら各基の具体例としては、前記と同様のものが挙げられる。

30

前記式(110)において、L'は、単結合、又は下記からなる群から選択される基である。

【 0 1 5 5 】

【化 4 2】



40


【 0 1 5 6 】

Ar^1 の示す前記式(103)が、下記式(111)～(125)で表される縮合環基であると好ましい。


50

【 0 1 5 7 】


【 化 4 3 】




(111)



(112)




(113)




(114)


10




(115)



(116)




(117)




(118)


20




(119)




(120)




(121)




(122)



(123)



(124)



(125)

30

【 0 1 5 8 】

前記式(111)～(125)中、それぞれの縮合環は、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数6～40のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数3～40のヘテロアリール基からなる結合基が結合していてもよく、該結合基が複数ある場合は、該結合基は互いに同一でも異なってもよい。これら各基の具体例としては、前記と同様のものが挙げられる。

40

【 0 1 5 9 】

前記式(201)において、 Ar^2 は、置換基を有していてもよい炭素数6～60のアリール基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいキノリル基、置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルキル基又は置換基を有していてもよい炭素数1～20のアルコキシ基である。

これら各基の具体例、好ましい炭素数及び置換基としては、前記Rについて説明したも

50

のと同様である。

【 0 1 6 0 】


前記式 (2 0 2) 及び (2 0 3) において、 Ar^3 は、置換基を有していてもよい炭素数 6 ~ 6 0 のアリール基、置換基を有していてもよいピリジル基、置換基を有していてもよいキノリル基、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 2 0 のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 2 0 のアルコキシ基、又は $-Ar^1 - Ar^2$ で表される基 (Ar^1 及び Ar^2 は、それぞれ前記と同じ) である。

これら各基の具体例、好ましい炭素数及び置換基としては、前記 R について説明したものと同様である。

また、 Ar^3 は、下記式 (1 2 6) ~ (1 3 5) で表される縮合環基から選択されるいずれかの基であると好ましい。

【 0 1 6 1 】

【 化 4 4 】



【 0 1 6 2 】

前記式 (1 2 6) ~ (1 3 5) 中、それぞれの縮合環は、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 2 0 のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 2 0 のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数 6 ~ 4 0 のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数 6 ~ 4 0 のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 4 0 のヘテロアリール基からなる結合基が結合していてもよく、該結合基が複数ある場合は、該結合基は互いに同一でも異なってもよい。これら各基の具体例としては、前記と同様のものが挙げられる。

前記式 (1 3 5) において、 L' は、前記と同じである。


前記式 (1 2 6) ~ (1 3 5) において、 R' は、水素原子、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 2 0 のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数 6 ~ 4 0 のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 4 0 のヘテロアリール基である。これら各基の具体例としては、前記と同様のものが挙げられる。

Ar^3 の示す (1 2 8) が、下記式 (1 3 6) ~ (1 5 8) で表される縮合環基である

と好ましい。

【 0 1 6 3 】

【 化 4 5 】




【 0 1 6 4 】

前記式 (1 3 6) ~ (1 5 8) 中、それぞれの縮合環は、ハロゲン原子、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 2 0 のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数 1 ~ 2 0 のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数 6 ~ 4 0 のアリールオキシ基、置換基を有していてもよい炭素数 6 ~ 4 0 のアリール基又は置換基を有していてもよい炭素数 3 ~ 4 0 のヘテロアリール基からなる結合基が結合していてもよく、該結合基が複数ある場合は、該結合基は互いに同一でも異なってもよい。これら各基の具体例としては、前記と同様のものが挙げられる。R' は、前記と同じである。

また、 Ar^2 及び Ar^3 は、それぞれ独立に、下記からなる群から選択される基であると好ましい。

【 0 1 6 5 】

【化 4 6】



10

【 0 1 6 6 】




本発明の前記式(201)～(203)で示される含窒素複素環誘導体の具体例を下記に示すが、本発明はこれらの例示化合物に限定されるものではない。

なお、下記表において、H A r は、前記式(201)～(203)における、下記構造を示す。

【 0 1 6 7 】

【化 4 7】


20



30

【 0 1 6 8 】

【化 4 8】



10


20

30

40


【 0 1 6 9 】

【化 4 9】



【 0 1 7 0 】


【化 5 0】



【 0 1 7 1】

30

【化 5 1】



【 0 1 7 2 】


10

20

30


40

【化 5 2】




【 0 1 7 3 】

【化 5 3】



【 0 1 7 4 】

【化 5 4】



10


20

30

【 0 1 7 5 】

40

【化 5 5】



【 0 1 7 6 】


10

20

30

40

【化 5 6】



【 0 1 7 7 】


10

20

30

40

【化 5 7】




10

20

30


【 0 1 7 8 】

【化 5 8】



【 0 1 7 9 】

【化 5 9】



【 0 1 8 0 】


10

20

30

40

【化 6 0】




10

20

【 0 1 8 1】

【化 6 1】




30

40

【 0 1 8 2】

50

【化 6 2】



10


20

30

【 0 1 8 3】

40


【化 6 3】



【 0 1 8 4 】

40

【化 6 4】



【0185】

40

以上の具体例のうち、特に、(1-1)、(1-5)、(1-7)、(2-1)、(3-1)、(4-2)、(4-6)、(7-2)、(7-7)、(7-8)、(7-9)、(9-1)、(9-7)が好ましい。

【0186】

なお、電子注入層又は電子輸送層の膜厚は、特に限定されないが、好ましくは、1～100nmである。

【0187】

また、電子注入層の構成成分として、含窒素環誘導体の他に無機化合物として、絶縁体又は半導体を使用することが好ましい。電子注入層が絶縁体や半導体で構成されていれば、電流のリークを有効に防止して、電子注入性を向上させることができる。

50

このような絶縁体としては、アルカリ金属カルコゲニド、アルカリ土類金属カルコゲニド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物からなる群から選択される少なくとも一つの金属化合物を使用するのが好ましい。電子注入層がこれらのアルカリ金属カルコゲニド等で構成されていれば、電子注入性をさらに向上させることができる点で好ましい。具体的に、好ましいアルカリ金属カルコゲニドとしては、例えば、 Li_2O 、 K_2O 、 Na_2S 、 Na_2Se 及び Na_2O が挙げられ、好ましいアルカリ土類金属カルコゲニドとしては、例えば、 CaO 、 BaO 、 SrO 、 BeO 、 BaS 及び CaSe が挙げられる。また、好ましいアルカリ金属のハロゲン化物としては、例えば、 LiF 、 NaF 、 KF 、 LiCl 、 KCl 及び NaCl 等が挙げられる。また、好ましいアルカリ土類金属のハロゲン化物としては、例えば、 CaF_2 、 BaF_2 、 SrF_2 、 MgF_2 及び BeF_2 等のフッ化物や、フッ化物以外のハロゲン化物が挙げられる。

10

また、半導体としては、 Ba 、 Ca 、 Sr 、 Yb 、 Al 、 Ga 、 In 、 Li 、 Na 、 Cd 、 Mg 、 Si 、 Ta 、 Sb 及び Zn の少なくとも一つの元素を含む酸化物、窒化物又は酸化窒化物等の一種単独又は二種以上の組み合わせが挙げられる。また、電子注入層を構成する無機化合物が、微結晶又は非晶質の絶縁性薄膜であることが好ましい。電子注入層がこれらの絶縁性薄膜で構成されていれば、より均質な薄膜が形成されるために、ダークスポット等の画素欠陥を減少させることができる。なお、このような無機化合物としては、アルカリ金属カルコゲニド、アルカリ土類金属カルコゲニド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物等が挙げられる。

このような絶縁体又は半導体を使用する場合、その層の好ましい厚みは、 $0.1\text{ nm} \sim 15\text{ nm}$ 程度である。また、本発明における電子注入層は、前述の還元性ドーパントを含有していても好ましい。


20

【0188】

正孔注入層又は正孔輸送層（正孔注入輸送層も含む）には芳香族アミン化合物、例えば、下記（I）で表わされる芳香族アミン誘導体が好適に用いられる。

【0189】

【化65】



30

【0190】

前記（I）において、 $\text{Ar}^1 \sim \text{Ar}^4$ は置換もしくは無置換の核炭素数 6 ~ 50 のアリーール基または置換もしくは無置換の核原子数 5 ~ 50 のヘテロアリーール基を表す。

【0191】

置換もしくは無置換の核炭素数 6 ~ 50 のアリーール基としては、例えば、フェニル基、1 - ナフチル基、2 - ナフチル基、1 - アントリル基、2 - アントリル基、9 - アントリル基、1 - フェナントリル基、2 - フェナントリル基、3 - フェナントリル基、4 - フェナントリル基、9 - フェナントリル基、1 - ナфтаセニル基、2 - ナфтаセニル基、9 - ナфтаセニル基、1 - ピレニル基、2 - ピレニル基、4 - ピレニル基、2 - ビフェニルイル基、3 - ビフェニルイル基、4 - ビフェニルイル基、p - ターフェニル - 4 - イル基、p - ターフェニル - 3 - イル基、p - ターフェニル - 2 - イル基、m - ターフェニル - 4 - イル基、m - ターフェニル - 3 - イル基、m - ターフェニル - 2 - イル基、o - トリル基、m - トリル基、p - トリル基、p - t - ブチルフェニル基、p - (2 - フェニルプロピル) フェニル基、3 - メチル - 2 - ナフチル基、4 - メチル - 1 - ナフチル基、4 - メチル - 1 - アントリル基、4' - メチルビフェニルイル基、4'' - t - ブチル - p - ターフェニル - 4 - イル基、フルオランテニル基、フルオレニル基などが挙げられる。

40

50

【 0 1 9 2 】

置換もしくは無置換の核原子数 5 ~ 50 のヘテロアリール基としては、例えば、1 - ピロリル基、2 - ピロリル基、3 - ピロリル基、ピラジニル基、2 - ピリジニル基、3 - ピリジニル基、4 - ピリジニル基、1 - インドリル基、2 - インドリル基、3 - インドリル基、4 - インドリル基、5 - インドリル基、6 - インドリル基、7 - インドリル基、1 - イソインドリル基、2 - イソインドリル基、3 - イソインドリル基、4 - イソインドリル基、5 - イソインドリル基、6 - イソインドリル基、7 - イソインドリル基、2 - フリル基、3 - フリル基、2 - ベンゾフラニル基、3 - ベンゾフラニル基、4 - ベンゾフラニル基、5 - ベンゾフラニル基、6 - ベンゾフラニル基、7 - ベンゾフラニル基、1 - イソベンゾフラニル基、3 - イソベンゾフラニル基、4 - イソベンゾフラニル基、5 - イソベンゾフラニル基、6 - イソベンゾフラニル基、7 - イソベンゾフラニル基、キノリル基、3 - キノリル基、4 - キノリル基、5 - キノリル基、6 - キノリル基、7 - キノリル基、8 - キノリル基、1 - イソキノリル基、3 - イソキノリル基、4 - イソキノリル基、5 - イソキノリル基、6 - イソキノリル基、7 - イソキノリル基、8 - イソキノリル基、2 - キノキサリニル基、5 - キノキサリニル基、6 - キノキサリニル基、1 - カルバゾリル基、2 - カルバゾリル基、3 - カルバゾリル基、4 - カルバゾリル基、9 - カルバゾリル基、1 - フェナンスリジニル基、2 - フェナンスリジニル基、3 - フェナンスリジニル基、4 - フェナンスリジニル基、6 - フェナンスリジニル基、7 - フェナンスリジニル基、8 - フェナンスリジニル基、9 - フェナンスリジニル基、10 - フェナンスリジニル基、1 - アクリジニル基、2 - アクリジニル基、3 - アクリジニル基、4 - アクリジニル基、9 - アクリジニル基、1, 7 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 8 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 9 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 7 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 9 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 7 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 8 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 7 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 8 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 10 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 7 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 9 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 10 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 8 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 9 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1 - フェナジニル基、2 - フェナジニル基、1 - フェノチアジニル基、2 - フェノチアジニル基、3 - フェノチアジニル基、4 - フェノチアジニル基、10 - フェノチアジニル基、1 - フェノキサジニル基、2 - フェノキサジニル基、3 - フェノキサジニル基、4 - フェノキサジニル基、10 - フェノキサジニル基、2 - オキサゾリル基、4 - オキサゾリル基、5 - オキサゾリル基、2 - オキサジアゾリル基、5 - オキサジアゾリル

10

20

30

40

50

基、3 - フラザニル基、2 - チエニル基、3 - チエニル基、2 - メチルピロール - 1 - イル基、2 - メチルピロール - 3 - イル基、2 - メチルピロール - 4 - イル基、2 - メチルピロール - 5 - イル基、3 - メチルピロール - 1 - イル基、3 - メチルピロール - 2 - イル基、3 - メチルピロール - 4 - イル基、3 - メチルピロール - 5 - イル基、2 - t - ブチルピロール - 4 - イル基、3 - (2 - フェニルプロピル)ピロール - 1 - イル基、2 - メチル - 1 - インドリル基、4 - メチル - 1 - インドリル基、2 - メチル - 3 - インドリル基、4 - メチル - 3 - インドリル基、2 - t - ブチル 1 - インドリル基、4 - t - ブチル 1 - インドリル基、2 - t - ブチル 3 - インドリル基、4 - t - ブチル 3 - インドリル基等が挙げられる。好ましくはフェニル基、ナフチル基、ピフェニル基、アントラニル基、フェナンスリル基、ピレニル基、クリセニル基、フルオランテニル基、フルオレニル基などが挙げられる。

10

【0193】

Lは連結基である。具体的には置換もしくは無置換の核炭素数6～50のアリーレン基、置換もしくは無置換の核原子数5～50のヘテロアリーレン基、または、2個以上のアリーレン基もしくはヘテロアリーレン基を単結合、エーテル結合、チオエーテル結合、炭素数1～20のアルキレン基、炭素数2～20のアルケニレン基、アミノ基で結合して得られる2価の基である。核炭素数6～50のアリーレン基としては、例えば、1,4 - フェニレン基、1,2 - フェニレン基、1,3 - フェニレン基、1,4 - ナフチレン基、2,6 - ナフチレン基、1,5 - ナフチレン基、9,10 - アントラニレン基、9,10 - フェナントレニレン基、3,6 - フェナントレニレン基、1,6 - ピレニレン基、2,7 - ピレニレン基、6,12 - クリセニレン基、4,4' - ビフェニレン基、3,3' - ビフェニレン基、2,2' - ビフェニレン基、2,7 - フルオレニレン基等が挙げられる。核原子数5～50のアリーレン基としては、例えば、2,5 - チオフェニレン基、2,5 - シローリレン基、2,5 - オキサジアゾーリレン基等が挙げられる。好ましくは1,4 - フェニレン基、1,2 - フェニレン基、1,3 - フェニレン基、1,4 - ナフチレン基、9,10 - アントラニレン基、6,12 - クリセニレン基、4,4' - ビフェニレン基、3,3' - ビフェニレン基、2,2' - ビフェニレン基、2,7 - フルオレニレン基である。

20

【0194】

Lが2個以上のアリーレン基またはヘテロアリーレン基からなる連結基である場合、隣り合うアリーレン基またはヘテロアリーレン基は2価の基を介して互いに結合して新たな環を形成してもよい。環を形成する2価基の例としては、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、ジフェニルメタン - 2,2' - ジイル基、ジフェニルエタン - 3,3' - ジイル基、ジフェニルプロパン - 4,4' - ジイル基等が挙げられる。

30

【0195】

$Ar^1 \sim Ar^4$ およびLの置換基としては、置換もしくは無置換の核炭素数6～50のアリール基、置換もしくは無置換の核原子数5～50のヘテロアリール基、置換もしくは無置換の炭素数1～50のアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数3～50のシクロアルキル基、置換もしくは無置換の炭素数1～50のアルコキシ基、置換もしくは無置換の炭素数7～50のアラルキル基、置換もしくは無置換の核炭素数6～50のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核原子数5～50のヘテロアリールオキシ基、置換もしくは無置換の核炭素数6～50のアリールチオ基、置換もしくは無置換の核原子数5～50のヘテロアリールチオ基、置換もしくは無置換の炭素数2～50のアルコキシカルボニル基、置換もしくは無置換の核炭素数6～50のアリール基または置換もしくは無置換の核原子数5～50のヘテロアリール基で置換されたアミノ基、ハロゲン基、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシル基等である。

40

【0196】

置換もしくは無置換の核炭素数6～50のアリール基の例としては、フェニル基、1 - ナフチル基、2 - ナフチル基、1 - アントリル基、2 - アントリル基、9 - アントリル基、1 - フェナントリル基、2 - フェナントリル基、3 - フェナントリル基、4 - フェナン

50

トリル基、9 - フェナントリル基、1 - ナフタセニル基、2 - ナフタセニル基、9 - ナフタセニル基、1 - ピレニル基、2 - ピレニル基、4 - ピレニル基、2 - ビフェニルイル基、3 - ビフェニルイル基、4 - ビフェニルイル基、p - ターフェニル - 4 - イル基、p - ターフェニル - 3 - イル基、p - ターフェニル - 2 - イル基、m - ターフェニル - 4 - イル基、m - ターフェニル - 3 - イル基、m - ターフェニル - 2 - イル基、o - トリル基、m - トリル基、p - トリル基、p - t - ブチルフェニル基、p - (2 - フェニルプロピル) フェニル基、3 - メチル - 2 - ナフチル基、4 - メチル - 1 - ナフチル基、4 - メチル - 1 - アントリル基、4' - メチルビフェニルイル基、4'' - t - ブチル - p - ターフェニル - 4 - イル基、フルオランテニル基、フルオレニル基等が挙げられる。

【0197】

置換もしくは無置換の核原子数5～50のヘテロアリール基の例としては、1 - ピロリル基、2 - ピロリル基、3 - ピロリル基、ピラジニル基、2 - ピリジニル基、3 - ピリジニル基、4 - ピリジニル基、1 - インドリル基、2 - インドリル基、3 - インドリル基、4 - インドリル基、5 - インドリル基、6 - インドリル基、7 - インドリル基、1 - イソインドリル基、2 - イソインドリル基、3 - イソインドリル基、4 - イソインドリル基、5 - イソインドリル基、6 - イソインドリル基、7 - イソインドリル基、2 - フリル基、3 - フリル基、2 - ベンゾフラニル基、3 - ベンゾフラニル基、4 - ベンゾフラニル基、5 - ベンゾフラニル基、6 - ベンゾフラニル基、7 - ベンゾフラニル基、1 - イソベンゾフラニル基、3 - イソベンゾフラニル基、4 - イソベンゾフラニル基、5 - イソベンゾフラニル基、6 - イソベンゾフラニル基、7 - イソベンゾフラニル基、キノリル基、3 - キノリル基、4 - キノリル基、5 - キノリル基、6 - キノリル基、7 - キノリル基、8 - キノリル基、1 - イソキノリル基、3 - イソキノリル基、4 - イソキノリル基、5 - イソキノリル基、6 - イソキノリル基、7 - イソキノリル基、8 - イソキノリル基、2 - キノキサリニル基、5 - キノキサリニル基、6 - キノキサリニル基、1 - カルバゾリル基、2 - カルバゾリル基、3 - カルバゾリル基、4 - カルバゾリル基、9 - カルバゾリル基、1 - フェナンスリジニル基、2 - フェナンスリジニル基、3 - フェナンスリジニル基、4 - フェナンスリジニル基、6 - フェナンスリジニル基、7 - フェナンスリジニル基、8 - フェナンスリジニル基、9 - フェナンスリジニル基、10 - フェナンスリジニル基、1 - アクリジニル基、2 - アクリジニル基、3 - アクリジニル基、4 - アクリジニル基、9 - アクリジニル基、1, 7 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 8 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 9 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 7 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 9 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 7 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 8 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 7 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 8 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 10 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 7 - イル基、2, 8 - フェナンス

10

20

30

40

50

ロリン - 10 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 8 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 9 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1 - フェナジニル基、2 - フェナジニル基、1 - フェノチアジニル基、2 - フェノチアジニル基、3 - フェノチアジニル基、4 - フェノチアジニル基、10 - フェノチアジニル基、1 - フェノキサジニル基、2 - フェノキサジニル基、3 - フェノキサジニル基、4 - フェノキサジニル基、10 - フェノキサジニル基、2 - オキサゾリル基、4 - オキサゾリル基、5 - オキサゾリル基、2 - オキサジアゾリル基、5 - オキサジアゾリル基、3 - フラザニル基、2 - チエニル基、3 - チエニル基、2 - メチルピロール - 1 - イル基、2 - メチルピロール - 3 - イル基、2 - メチルピロール - 4 - イル基、2 - メチルピロール - 5 - イル基、3 - メチルピロール - 1 - イル基、3 - メチルピロール - 2 - イル基、3 - メチルピロール - 4 - イル基、3 - メチルピロール - 5 - イル基、2 - t - ブチルピロール - 4 - イル基、3 - (2 - フェニルプロピル)ピロール - 1 - イル基、2 - メチル - 1 - インドリル基、4 - メチル - 1 - インドリル基、2 - メチル - 3 - インドリル基、4 - メチル - 3 - インドリル基、2 - t - ブチル 1 - インドリル基、4 - t - ブチル 1 - インドリル基、2 - t - ブチル 3 - インドリル基、4 - t - ブチル 3 - インドリル基等が挙げられる。

10

【0198】

置換又は無置換の炭素数 1 ~ 50 のアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n - ブチル基、s - ブチル基、イソブチル基、t - ブチル基、n - ペンチル基、n - ヘキシル基、n - ヘプチル基、n - オクチル基、ヒドロキシメチル基、1 - ヒドロキシエチル基、2 - ヒドロキシエチル基、2 - ヒドロキシイソブチル基、1, 2 - ジヒドロキシエチル基、1, 3 - ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3 - ジヒドロキシ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1 - クロロエチル基、2 - クロロエチル基、2 - クロロイソブチル基、1, 2 - ジクロロエチル基、1, 3 - ジクロロイソプロピル基、2, 3 - ジクロロ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリクロロプロピル基、ブromoメチル基、1 - ブromoエチル基、2 - ブromoエチル基、2 - ブromoイソブチル基、1, 2 - ジブromoエチル基、1, 3 - ジブromoイソプロピル基、2, 3 - ジブromo - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリブromoプロピル基、ヨードメチル基、1 - ヨードエチル基、2 - ヨードエチル基、2 - ヨードイソブチル基、1, 2 - ジヨードエチル基、1, 3 - ジヨードイソプロピル基、2, 3 - ジヨード - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1 - アミノエチル基、2 - アミノエチル基、2 - アミノイソブチル基、1, 2 - ジアミノエチル基、1, 3 - ジアミノイソプロピル基、2, 3 - ジアミノ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1 - シアノエチル基、2 - シアノエチル基、2 - シアノイソブチル基、1, 2 - ジシアノエチル基、1, 3 - ジシアノイソプロピル基、2, 3 - ジシアノ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1 - ニトロエチル基、2 - ニトロエチル基、2 - ニトロイソブチル基、1, 2 - ジニトロエチル基、1, 3 - ジニトロイソプロピル基、2, 3 - ジニトロ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリニトロプロピル基等が挙げられる。

20

30

40

【0199】

置換もしくは無置換の炭素数 3 ~ 50 のシクロアルキル基の例としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、4 - メチルシクロヘキシル基、1 - アダマンチル基、2 - アダマンチル基、1 - ノルボルニル基、2 - ノルボルニル基等が挙げられる。

【0200】

置換又は無置換の炭素数 1 ~ 50 のアルコキシ基は、- OY で表される基である。Y の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n - ブチル基、s - ブチル基、イソブチル基、t - ブチル基、n - ペンチル基、n - ヘキシル基、n - ヘプチル

50

基、n - オクチル基、ヒドロキシメチル基、1 - ヒドロキシエチル基、2 - ヒドロキシエチル基、2 - ヒドロキシイソブチル基、1, 2 - ジヒドロキシエチル基、1, 3 - ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3 - ジヒドロキシ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1 - クロロエチル基、2 - クロロエチル基、2 - クロロイソブチル基、1, 2 - ジクロロエチル基、1, 3 - ジクロロイソプロピル基、2, 3 - ジクロロ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリクロロプロピル基、プロモメチル基、1 - プロモエチル基、2 - プロモエチル基、2 - プロモイソブチル基、1, 2 - ジプロモエチル基、1, 3 - ジプロモイソプロピル基、2, 3 - ジプロモ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリプロモプロピル基、ヨードメチル基、1 - ヨードエチル基、2 - ヨードエチル基、2 - ヨードイソブチル基、1, 2 - ジヨードエチル基、1, 3 - ジヨードイソプロピル基、2, 3 - ジヨード - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1 - アミノエチル基、2 - アミノエチル基、2 - アミノイソブチル基、1, 2 - ジアミノエチル基、1, 3 - ジアミノイソプロピル基、2, 3 - ジアミノ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1 - シアノエチル基、2 - シアノエチル基、2 - シアノイソブチル基、1, 2 - ジシアノエチル基、1, 3 - ジシアノイソプロピル基、2, 3 - ジシアノ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1 - ニトロエチル基、2 - ニトロエチル基、2 - ニトロイソブチル基、1, 2 - ジニトロエチル基、1, 3 - ジニトロイソプロピル基、2, 3 - ジニトロ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリニトロプロピル基等が挙げられる。

10

【0201】

20

置換又は無置換の炭素数7～50のアラルキル基の例としては、ベンジル基、1 - フェニルエチル基、2 - フェニルエチル基、1 - フェニルイソプロピル基、2 - フェニルイソプロピル基、フェニル - t - ブチル基、 α - ナフチルメチル基、1 - α - ナフチルエチル基、2 - α - ナフチルエチル基、1 - α - ナフチルイソプロピル基、2 - α - ナフチルイソプロピル基、 β - ナフチルメチル基、1 - β - ナフチルエチル基、2 - β - ナフチルエチル基、1 - β - ナフチルイソプロピル基、2 - β - ナフチルイソプロピル基、1 - ピロリルメチル基、2 - (1 - ピロリル)エチル基、p - メチルベンジル基、m - メチルベンジル基、o - メチルベンジル基、p - クロロベンジル基、m - クロロベンジル基、o - クロロベンジル基、p - プロモベンジル基、m - プロモベンジル基、o - プロモベンジル基、p - ヨードベンジル基、m - ヨードベンジル基、o - ヨードベンジル基、p - ヒドロキシベンジル基、m - ヒドロキシベンジル基、o - ヒドロキシベンジル基、p - アミノベンジル基、m - アミノベンジル基、o - アミノベンジル基、p - ニトロベンジル基、m - ニトロベンジル基、o - ニトロベンジル基、p - シアノベンジル基、m - シアノベンジル基、o - シアノベンジル基、1 - ヒドロキシ - 2 - フェニルイソプロピル基、1 - クロロ - 2 - フェニルイソプロピル基等が挙げられる。

30

【0202】

置換又は無置換の核炭素数6～50のアリールオキシ基は、-OY'と表され、Y'の例としてはフェニル基、1 - ナフチル基、2 - ナフチル基、1 - アントリル基、2 - アントリル基、9 - アントリル基、1 - フェナントリル基、2 - フェナントリル基、3 - フェナントリル基、4 - フェナントリル基、9 - フェナントリル基、1 - ナфтаセニル基、2 - ナфтаセニル基、9 - ナфтаセニル基、1 - ピレニル基、2 - ピレニル基、4 - ピレニル基、2 - ビフェニルイル基、3 - ビフェニルイル基、4 - ビフェニルイル基、p - ターフェニル - 4 - イル基、p - ターフェニル - 3 - イル基、p - ターフェニル - 2 - イル基、m - ターフェニル - 4 - イル基、m - ターフェニル - 3 - イル基、m - ターフェニル - 2 - イル基、o - トリル基、m - トリル基、p - トリル基、p - t - ブチルフェニル基、p - (2 - フェニルプロピル)フェニル基、3 - メチル - 2 - ナフチル基、4 - メチル - 1 - ナフチル基、4 - メチル - 1 - アントリル基、4' - メチルビフェニルイル基、4' - t - ブチル - p - ターフェニル - 4 - イル基等が挙げられる。

40

【0203】

置換もしくは無置換の核原子数5～50のヘテロアリールオキシ基は、-OZ'と表さ

50

れ、Z'の例としては2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1,7-フェナンスロリン-2-イル基、1,7-フェナンスロリン-3-イル基、1,7-フェナンスロリン-4-イル基、1,7-フェナンスロリン-5-イル基、1,7-フェナンスロリン-6-イル基、1,7-フェナンスロリン-8-イル基、1,7-フェナンスロリン-9-イル基、1,7-フェナンスロリン-10-イル基、1,8-フェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェナンスロリン-5-イル基、1,8-フェナンスロリン-6-イル基、1,8-フェナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン-9-イル基、1,8-フェナンスロリン-10-イル基、1,9-フェナンスロリン-2-イル基、1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロリン-4-イル基、1,9-フェナンスロリン-5-イル基、1,9-フェナンスロリン-6-イル基、1,9-フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、2,9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-6-イル基、2,9-フェナンスロリン-7-イル基、2,9-フェナンスロリン-8-イル基、2,9-フェナンスロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェナンスロリン-4-イル基、2,8-フェナンスロリン-5-イル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基、2,8-フェナンスロリン-7-イル基、2,8-フェナンスロリン-9-イル基、2,8-フェナンスロリン-10-イル基、2,7-フェナンスロリン-1-イル基、2,7-フェナンスロリン-3-イル基、2,7-フェナンスロリン-4-イル基、2,7-フェナンスロリン-5-イル基、2,7-フェナンスロリン-6-イル基、2,7-フェナンスロリン-8-イル基、2,7-フェナンスロリン-9-イル基、2,7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピ

10

20

30

40

50

ロール - 4 - イル基、3 - メチルピロール - 5 - イル基、2 - t - ブチルピロール - 4 - イル基、3 - (2 - フェニルプロピル)ピロール - 1 - イル基、2 - メチル - 1 - インドリル基、4 - メチル - 1 - インドリル基、2 - メチル - 3 - インドリル基、4 - メチル - 3 - インドリル基、2 - t - ブチル 1 - インドリル基、4 - t - ブチル 1 - インドリル基、2 - t - ブチル 3 - インドリル基、4 - t - ブチル 3 - インドリル基等が挙げられる。

【0204】

置換又は無置換の核炭素数 6 ~ 50 のアリールチオ基は、- S Y " と表され、Y " の例としてはフェニル基、1 - ナフチル基、2 - ナフチル基、1 - アントリル基、2 - アントリル基、9 - アントリル基、1 - フェナントリル基、2 - フェナントリル基、3 - フェナントリル基、4 - フェナントリル基、9 - フェナントリル基、1 - ナфтаセニル基、2 - ナфтаセニル基、9 - ナфтаセニル基、1 - ピレニル基、2 - ピレニル基、4 - ピレニル基、2 - ビフェニルイル基、3 - ビフェニルイル基、4 - ビフェニルイル基、p - ターフェニル - 4 - イル基、p - ターフェニル - 3 - イル基、p - ターフェニル - 2 - イル基、m - ターフェニル - 4 - イル基、m - ターフェニル - 3 - イル基、m - ターフェニル - 2 - イル基、o - トリル基、m - トリル基、p - トリル基、p - t - ブチルフェニル基、p - (2 - フェニルプロピル)フェニル基、3 - メチル - 2 - ナフチル基、4 - メチル - 1 - ナフチル基、4 - メチル - 1 - アントリル基、4' - メチルビフェニルイル基、4" - t - ブチル - p - ターフェニル - 4 - イル基等が挙げられる。

【0205】

置換もしくは無置換の核原子数 5 ~ 50 のヘテロアリールチオ基は、- S Z " と表され、Z " の例としては 2 - ピロリル基、3 - ピロリル基、ピラジニル基、2 - ピリジニル基、3 - ピリジニル基、4 - ピリジニル基、2 - インドリル基、3 - インドリル基、4 - インドリル基、5 - インドリル基、6 - インドリル基、7 - インドリル基、1 - イソインドリル基、3 - イソインドリル基、4 - イソインドリル基、5 - イソインドリル基、6 - イソインドリル基、7 - イソインドリル基、2 - フリル基、3 - フリル基、2 - ベンゾフラニル基、3 - ベンゾフラニル基、4 - ベンゾフラニル基、5 - ベンゾフラニル基、6 - ベンゾフラニル基、7 - ベンゾフラニル基、1 - イソベンゾフラニル基、3 - イソベンゾフラニル基、4 - イソベンゾフラニル基、5 - イソベンゾフラニル基、6 - イソベンゾフラニル基、7 - イソベンゾフラニル基、2 - キノリル基、3 - キノリル基、4 - キノリル基、5 - キノリル基、6 - キノリル基、7 - キノリル基、8 - キノリル基、1 - イソキノリル基、3 - イソキノリル基、4 - イソキノリル基、5 - イソキノリル基、6 - イソキノリル基、7 - イソキノリル基、8 - イソキノリル基、2 - キノキサリニル基、5 - キノキサリニル基、6 - キノキサリニル基、1 - カルバゾリル基、2 - カルバゾリル基、3 - カルバゾリル基、4 - カルバゾリル基、1 - フェナンスリジニル基、2 - フェナンスリジニル基、3 - フェナンスリジニル基、4 - フェナンスリジニル基、6 - フェナンスリジニル基、7 - フェナンスリジニル基、8 - フェナンスリジニル基、9 - フェナンスリジニル基、10 - フェナンスリジニル基、1 - アクリジニル基、2 - アクリジニル基、3 - アクリジニル基、4 - アクリジニル基、9 - アクリジニル基、1, 7 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 8 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 9 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 7 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 9 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 7 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 8 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 3 - イ

10

20

30

40

50

ル基、1, 10 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 7 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 8 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 10 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 7 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 9 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 10 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 8 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 9 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1 - フェナジニル基、2 - フェナジニル基、1 - フェノチアジニル基、2 - フェノチアジニル基、3 - フェノチアジニル基、4 - フェノチアジニル基、1 - フェノキサジニル基、2 - フェノキサジニル基、3 - フェノキサジニル基、4 - フェノキサジニル基、2 - オキサゾリル基、4 - オキサゾリル基、5 - オキサゾリル基、2 - オキサジアゾリル基、5 - オキサジアゾリル基、3 - フラザニル基、2 - チエニル基、3 - チエニル基、2 - メチルピロール - 1 - イル基、2 - メチルピロール - 3 - イル基、2 - メチルピロール - 4 - イル基、2 - メチルピロール - 5 - イル基、3 - メチルピロール - 1 - イル基、3 - メチルピロール - 2 - イル基、3 - メチルピロール - 4 - イル基、3 - メチルピロール - 5 - イル基、2 - t - ブチルピロール - 4 - イル基、3 - (2 - フェニルプロピル)ピロール - 1 - イル基、2 - メチル - 1 - インドリル基、4 - メチル - 1 - インドリル基、2 - メチル - 3 - インドリル基、4 - メチル - 3 - インドリル基、2 - t - ブチル 1 - インドリル基、4 - t - ブチル 1 - インドリル基、2 - t - ブチル 3 - インドリル基、4 - t - ブチル 3 - インドリル基等が挙げられる。

【0206】

置換又は無置換の炭素数 2 ~ 50 のアルコキシカルボニル基は - COOZ と表され、Z の例としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n - ブチル基、s - ブチル基、イソブチル基、t - ブチル基、n - ペンチル基、n - ヘキシル基、n - ヘプチル基、n - オクチル基、ヒドロキシメチル基、1 - ヒドロキシエチル基、2 - ヒドロキシエチル基、2 - ヒドロキシイソブチル基、1, 2 - ジヒドロキシエチル基、1, 3 - ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3 - ジヒドロキシ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1 - クロロエチル基、2 - クロロエチル基、2 - クロロイソブチル基、1, 2 - ジクロロエチル基、1, 3 - ジクロロイソプロピル基、2, 3 - ジクロロ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリクロロプロピル基、ブromoメチル基、1 - ブromoエチル基、2 - ブromoエチル基、2 - ブromoイソブチル基、1, 2 - ジブromoエチル基、1, 3 - ジブromoイソプロピル基、2, 3 - ジブromo - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリブromoプロピル基、ヨードメチル基、1 - ヨードエチル基、2 - ヨードエチル基、2 - ヨードイソブチル基、1, 2 - ジヨードエチル基、1, 3 - ジヨードイソプロピル基、2, 3 - ジヨード - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1 - アミノエチル基、2 - アミノエチル基、2 - アミノイソブチル基、1, 2 - ジアミノエチル基、1, 3 - ジアミノイソプロピル基、2, 3 - ジアミノ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1 - シアノエチル基、2 - シアノエチル基、2 - シアノイソブチル基、1, 2 - ジシアノエチル基、1, 3 - ジシアノイソプロピル基、2, 3 - ジシアノ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1 - ニトロエチル基、2 - ニトロエチル基、2 - ニトロイソブチル基、1, 2 - ジニトロエチル基、1, 3 - ジニトロイソプロピル基、2, 3 - ジニトロ - t - ブチル基、1, 2, 3 - トリニトロプロピル基等が挙げられる。

【0207】

前記置換もしくは無置換の核炭素数 6 ~ 50 のアリール基または置換もしくは無置換の

10

20

30

40

50

核原子数 5 ~ 50 のヘテロアリール基で置換されたアミノ基は - N P Q と表わされ、P、Q の例としては、フェニル基、1 - ナフチル基、2 - ナフチル基、1 - アントリル基、2 - アントリル基、9 - アントリル基、1 - フェナントリル基、2 - フェナントリル基、3 - フェナントリル基、4 - フェナントリル基、9 - フェナントリル基、1 - ナфтаセニル基、2 - ナфтаセニル基、9 - ナфтаセニル基、1 - ピレニル基、2 - ピレニル基、4 - ピレニル基、2 - ビフェニルイル基、3 - ビフェニルイル基、4 - ビフェニルイル基、p - ターフェニル - 4 - イル基、p - ターフェニル - 3 - イル基、p - ターフェニル - 2 - イル基、m - ターフェニル - 4 - イル基、m - ターフェニル - 3 - イル基、m - ターフェニル - 2 - イル基、o - トリル基、m - トリル基、p - トリル基、p - t - プチルフェニル基、p - (2 - フェニルプロピル) フェニル基、3 - メチル - 2 - ナフチル基、4 - メチル - 1 - ナフチル基、4 - メチル - 1 - アントリル基、4' - メチルビフェニルイル基、4'' - t - プチル - p - ターフェニル - 4 - イル基、2 - ピロリル基、3 - ピロリル基、ピラジニル基、2 - ピリジニル基、3 - ピリジニル基、4 - ピリジニル基、2 - インドリル基、3 - インドリル基、4 - インドリル基、5 - インドリル基、6 - インドリル基、7 - インドリル基、1 - イソインドリル基、3 - イソインドリル基、4 - イソインドリル基、5 - イソインドリル基、6 - イソインドリル基、7 - イソインドリル基、2 - フリル基、3 - フリル基、2 - ベンゾフラニル基、3 - ベンゾフラニル基、4 - ベンゾフラニル基、5 - ベンゾフラニル基、6 - ベンゾフラニル基、7 - ベンゾフラニル基、1 - イソベンゾフラニル基、3 - イソベンゾフラニル基、4 - イソベンゾフラニル基、5 - イソベンゾフラニル基、6 - イソベンゾフラニル基、7 - イソベンゾフラニル基、2 - キノリル基、3 - キノリル基、4 - キノリル基、5 - キノリル基、6 - キノリル基、7 - キノリル基、8 - キノリル基、1 - イソキノリル基、3 - イソキノリル基、4 - イソキノリル基、5 - イソキノリル基、6 - イソキノリル基、7 - イソキノリル基、8 - イソキノリル基、2 - キノキサリニル基、5 - キノキサリニル基、6 - キノキサリニル基、1 - カルバゾリル基、2 - カルバゾリル基、3 - カルバゾリル基、4 - カルバゾリル基、1 - フェナンスリジニル基、2 - フェナンスリジニル基、3 - フェナンスリジニル基、4 - フェナンスリジニル基、6 - フェナンスリジニル基、7 - フェナンスリジニル基、8 - フェナンスリジニル基、9 - フェナンスリジニル基、10 - フェナンスリジニル基、1 - アクリジニル基、2 - アクリジニル基、3 - アクリジニル基、4 - アクリジニル基、9 - アクリジニル基、1, 7 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 8 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 9 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 7 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 9 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 7 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 8 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 7 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 8 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 10 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 7 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 9 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 10

10

20

30

40

50

- イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 8 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 9 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1 - フェナジニル基、2 - フェナジニル基、1 - フェノチアジニル基、2 - フェノチアジニル基、3 - フェノチアジニル基、4 - フェノチアジニル基、1 - フェノキサジニル基、2 - フェノキサジニル基、3 - フェノキサジニル基、4 - フェノキサジニル基、2 - オキサゾリル基、4 - オキサゾリル基、5 - オキサゾリル基、2 - オキサジアゾリル基、5 - オキサジアゾリル基、3 - フラザニル基、2 - チエニル基、3 - チエニル基、2 - メチルピロール - 1 - イル基、2 - メチルピロール - 3 - イル基、2 - メチルピロール - 4 - イル基、2 - メチルピロール - 5 - イル基、3 - メチルピロール - 1 - イル基、3 - メチルピロール - 2 - イル基、3 - メチルピロール - 4 - イル基、3 - メチルピロール - 5 - イル基、2 - t - ブチルピロール - 4 - イル基、3 - (2 - フェニルプロピル)ピロール - 1 - イル基、2 - メチル - 1 - インドリル基、4 - メチル - 1 - インドリル基、2 - メチル - 3 - インドリル基、4 - メチル - 3 - インドリル基、2 - t - ブチル 1 - インドリル基、4 - t - ブチル 1 - インドリル基、2 - t - ブチル 3 - インドリル基、4 - t - ブチル 3 - インドリル基等が挙げられる。

10


【0208】

前記(I)の化合物の具体例を以下に記すが、これらに限定されるものではない。

【0209】

20

【化 6 6】




【 0 2 1 0 】

また、下記 (I I) の芳香族アミンも正孔注入層または正孔輸送層の形成に好適に用いられる。 40

【 0 2 1 1 】

【化 6 7】




【 0 2 1 2 】

前記 (I I) において、 $\text{Ar}^1 \sim \text{Ar}^3$ の定義は前記 (I) の $\text{Ar}^1 \sim \text{Ar}^4$ の定義と同様 50

である。以下に (I I) の化合物の具体例を記すがこれらに限定されるものではない。

【 0 2 1 3 】

【 化 6 8 】




10

20

【 0 2 1 4 】

【化 6 9】



10

20

【 0 2 1 5 】

なお、本発明は、上記の説明に限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲での変更は本発明に含まれる。

30

例えば次のような変更も本発明の好適な変形例である。

本発明では、前記発光層が電荷注入補助材を含有していることも好ましい。

エネルギーギャップが広いホスト材料を用いて発光層を形成した場合、ホスト材料のイオン化ポテンシャル（ I_p ）と正孔注入・輸送層等の I_p との差が大きくなり、発光層への正孔の注入が困難となり、十分な輝度を得るための駆動電圧が上昇するおそれがある。

【 0 2 1 6 】

このような場合、発光層に、正孔注入・輸送性の電荷注入補助剤を含有させることで、発光層への正孔注入を容易にし、駆動電圧を低下させることができる。

電荷注入補助剤としては、例えば、一般的な正孔注入・輸送材料等が利用できる。

具体例としては、トリアゾール誘導体（米国特許 3, 112, 197 号明細書等参照）、オキサジアゾール誘導体（米国特許 3, 189, 447 号明細書等参照）、イミダゾール誘導体（特公昭 37 - 16096 号公報等参照）、ポリアリールアルカン誘導体（米国特許 3, 615, 402 号明細書、同第 3, 820, 989 号明細書、同第 3, 542, 544 号明細書、特公昭 45 - 555 号公報、同 51 - 10983 号公報、特開昭 51 - 93224 号公報、同 55 - 17105 号公報、同 56 - 4148 号公報、同 55 - 108667 号公報、同 55 - 156953 号公報、同 56 - 36656 号公報等参照）、ピラゾリン誘導体及びピラズロン誘導体（米国特許第 3, 180, 729 号明細書、同第 4, 278, 746 号明細書、特開昭 55 - 88064 号公報、同 55 - 88065 号公報、同 49 - 105537 号公報、同 55 - 51086 号公報、同 56 - 80051 号公報、同 56 - 88141 号公報、同 57 - 45545 号公報、同 54 - 112637 号公

40

50

報、同 55 - 74546 号公報等参照)、フェニレンジアミン誘導体(米国特許第 3, 615, 404 号明細書、特公昭 51 - 10105 号公報、同 46 - 3712 号公報、同 47 - 25336 号公報、特開昭 54 - 53435 号公報、同 54 - 110536 号公報、同 54 - 119925 号公報等参照)、アリアルアミン誘導体(米国特許第 3, 567, 450 号明細書、同第 3, 180, 703 号明細書、同第 3, 240, 597 号明細書、同第 3, 658, 520 号明細書、同第 4, 232, 103 号明細書、同第 4, 175, 961 号明細書、同第 4, 012, 376 号明細書、特公昭 49 - 35702 号公報、同 39 - 27577 号公報、特開昭 55 - 144250 号公報、同 56 - 119132 号公報、同 56 - 22437 号公報、西独特許第 1, 110, 518 号明細書等参照)、アミノ置換カルコン誘導体(米国特許第 3, 526, 501 号明細書等参照)、オキサゾール誘導体(米国特許第 3, 257, 203 号明細書等に開示のもの)、スチリルアントラセン誘導体(特開昭 56 - 46234 号公報等参照)、フルオレノン誘導体(特開昭 54 - 110837 号公報等参照)、ヒドラゾン誘導体(米国特許第 3, 717, 462 号明細書、特開昭 54 - 59143 号公報、同 55 - 52063 号公報、同 55 - 52064 号公報、同 55 - 46760 号公報、同 55 - 85495 号公報、同 57 - 11350 号公報、同 57 - 148749 号公報、特開平 2 - 311591 号公報等参照)、スチルベン誘導体(特開昭 61 - 210363 号公報、同第 61 - 228451 号公報、同 61 - 14642 号公報、同 61 - 72255 号公報、同 62 - 47646 号公報、同 62 - 36674 号公報、同 62 - 10652 号公報、同 62 - 30255 号公報、同 60 - 93455 号公報、同 60 - 94462 号公報、同 60 - 174749 号公報、同 60 - 175052 号公報等参照)、シラザン誘導体(米国特許第 4, 950, 950 号明細書)、ポリシラン系(特開平 2 - 204996 号公報)、アニリン系共重合体(特開平 2 - 282263 号公報)、特開平 1 - 211399 号公報に開示されている導電性高分子オリゴマー(特にチオフェンオリゴマー)等を挙げることができる。

10

20

【0217】

正孔注入性の材料としては上記のものを挙げることができるが、ポルフィリン化合物(特開昭 63 - 295695 号公報等に開示のもの)、芳香族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物(米国特許第 4, 127, 412 号明細書、特開昭 53 - 27033 号公報、同 54 - 58445 号公報、同 54 - 149634 号公報、同 54 - 64299 号公報、同 55 - 79450 号公報、同 55 - 144250 号公報、同 56 - 119132 号公報、同 61 - 295558 号公報、同 61 - 98353 号公報、同 63 - 295695 号公報等参照)、特に芳香族第三級アミン化合物が好ましい。

30

【0218】

また、米国特許第 5, 061, 569 号に記載されている 2 個の縮合芳香族環を分子内に有する、例えば、4, 4'-ビス(N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ)ピフェニル(以下 NPD と略記する)、また特開平 4 - 308688 号公報に記載されているトリフェニルアミンユニットが 3 つスターバースト型に連結された 4, 4', 4"-トリス(N-(3-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ)トリフェニルアミン(以下 MTDA と略記する)等を挙げることができる。

また、特許公報第 3614405 号、3571977 号または米国特許 4, 780, 536 に記載されているヘキサアザトリフェニレン誘導体等も正孔注入性の材料として好適に用いることができる。

40

【0219】

また、p 型 Si、p 型 SiC 等の無機化合物も正孔注入材料として使用することができる。

【0220】

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の各層の形成方法は特に限定されない。従来公知の真空蒸着法、スピンコーティング法等による形成方法を用いることができる。本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子に用いる有機薄膜層は、真空蒸着法、分子線蒸着法(MBE 法)あるいは溶媒に解かした溶液のディッピング法、スピンコーティング法

50

、キャストリング法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法による公知の方法で形成することができる。

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の各有機層の膜厚は特に制限されないが、一般に膜厚が薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じやすく、逆に厚すぎると高い印加電圧が必要となり効率が悪くなるため、通常は数 nm から 1 μm の範囲が好ましい。

【実施例】

【0221】

次に、実施例および比較例を挙げて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例の記載内容に何ら制限されるものではない。

なお、下の表には、各材料の物性値を記載したところ、これら物性値は次のように測定した。

三重項エネルギーギャップ E_g は、燐光発光スペクトルに基づいて規定した。

すなわち、各材料を EPA 溶媒（容積比でジエチルエーテル：イソペンタン：エタノール = 5 : 5 : 2）に 10 μmol/L で溶解し、燐光測定用試料とする。

そして、燐光測定用試料を石英セルに入れ、77 K に冷却し、励起光を照射し、放射される燐光を波長に対して測定する。


得られた燐光スペクトルの短波長側の立ち上がりに対して接線を引き、該波長値をエネルギーに換算した値を三重項エネルギーギャップ $E_g(T)$ とする。

なお、測定には市販の測定装置 F-4500（日立製）を用いた。

【0222】

合成実施例 1（化合物（1-1）の合成）

【化70】



【0223】


アルゴン雰囲気下、臭素化物 I-1 5.0 g (18 mmol)、ボロン酸 I-2 6.2 g (18 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 420 mg (0.36 mmol)、トルエン 120 ml、ジメトキシエタン 40 ml、2 M 炭酸ナトリウム水溶液 26 ml を加え、90 °C にて、10 時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて 1 時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物（1-1）を 6.4 g（収率 70%）得た。

FD マス分析の結果、分子量 506 に対し、 $m/e = 506$ であった。

【0224】

合成実施例 2（化合物（1-3）の合成）

【化71】



【0225】

アルゴン雰囲気下、臭素化物 I-3 5.0 g (15 mmol)、ボロン酸 I-4 5.3 g (15 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 350 mg (0.30 mmol)、トルエン 100 ml、ジメトキシエタン 30 ml、2 M 炭酸ナトリウム水溶液 22 ml を加え、90 °C にて、12 時間攪拌した。反応混合物を室温


まで放冷し、水を加え室温にて1時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(1-3)を5.5g(収率66%)得た。

FDマス分析の結果、分子量556に対し、 $m/e = 556$ であった。

【0226】

合成実施例3(化合物(1-6)の合成)

【化72】



10

【0227】

アルゴン雰囲気下、臭素化物I-5 5.0g(18mmol)、ボロン酸I-4 6.2g(18mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)420mg(0.36mmol)、トルエン120ml、ジメトキシエタン40ml、2M炭酸ナトリウム水溶液26mlを加え、90℃にて、15時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(1-6)を6.2g(収率68%)得た。


20

FDマス分析の結果、分子量504に対し、 $m/e = 504$ であった。

【0228】

合成実施例4(化合物(1-7)の合成)

【化73】



30

【0229】

アルゴン雰囲気下、ボロン酸I-6 5.2g(14mmol)、臭素化物I-7 4.3g(14mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)330mg(0.28mmol)、トルエン120ml、ジメトキシエタン40ml、2M炭酸ナトリウム水溶液20mlを加え、90℃にて、15時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(1-7)を4.9g(収率63%)得た。


40

FDマス分析の結果、分子量554に対し、 $m/e = 554$ であった。

【0230】

合成実施例5(化合物(1-11)の合成)

【化 7 4】



【 0 2 3 1】


アルゴン雰囲気下、ボロン酸 I - 8 5.2 g (18 mmol)、ジ臭素化体 I - 9 5.1 g (18 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 420 mg (0.36 mmol)、トルエン 120 ml、ジメトキシエタン 40 ml、2 M 炭酸ナトリウム水溶液 26 ml を加え、90℃にて、12時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(1-11)を6.3 g (収率57%)得た。

FDマス分析の結果、分子量612に対し、 $m/e = 612$ であった。

【 0 2 3 2】

合成実施例 6 (化合物(1-13)の合成)

【化 7 5】



【 0 2 3 3】


アルゴン雰囲気下、ボロン酸 I - 10 5.0 g (15 mmol)、ジ臭素化体 I - 9 4.2 g (15 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 350 mg (0.30 mmol)、トルエン 100 ml、ジメトキシエタン 35 ml、2 M 炭酸ナトリウム水溶液 22 ml を加え、90℃にて、12時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(1-11)を6.4 g (収率50%)得た。

FDマス分析の結果、分子量712に対し、 $m/e = 712$ であった。

【 0 2 3 4】

[合成実施例 7] 化合物(2-1)の合成

【化 7 6】



【 0 2 3 5】

アルゴン雰囲気下、ボロン酸 I - 11 5.0 g (20 mmol)、ジ臭素化物 I - 1

10

20

30

40

50

2 7.7 g (20 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 470 mg (0.40 mmol)、トルエン150 ml、ジメトキシエタン50 ml、2 M炭酸ナトリウム水溶液 30 mlを加え、90 にて、15時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエン、テトラヒドロフランで再結晶化することにより、化合物(2-1)を5.2 g(収率49%)得た。


FDマス分析の結果、分子量632に対し、 $m/e = 632$ であった。

【0236】

[合成実施例8] 化合物(2-5)の合成

10

【化77】



【0237】

アルゴン雰囲気下、ボロン酸I-13 5.4 g (18 mmol)、ジ臭素化物I-14 5.8 g (18 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 420 mg (0.36 mmol)、トルエン120 ml、ジメトキシエタン40 ml、2 M炭酸ナトリウム水溶液 26 mlを加え、90 にて、12時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(2-5)を6.5 g(収率54%)得た。


20

FDマス分析の結果、分子量672に対し、 $m/e = 672$ であった。

【0238】

合成実施例9(化合物(1-17)の合成)

【化78】



30

【0239】

アルゴン雰囲気下、ボロン酸I-15 5.2 g (13 mmol)、臭素化物I-16 3.7 g (13 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 305 mg (0.26 mmol)、トルエン100 ml、ジメトキシエタン30 ml、2 M炭酸ナトリウム水溶液 19 mlを加え、90 にて、11時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(1-17)を4.0 g(収率55%)得た。


40

FDマス分析の結果、分子量556に対し、 $m/e = 556$ であった。

【0240】

合成実施例10(化合物(1-20)の合成)

【化 7 9】



【 0 2 4 1】

アルゴン雰囲気下、ボロン酸 I - 1 7 4 . 8 g (1 3 m m o l)、臭素化物 I - 1 8 3 . 7 g (1 3 m m o l)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 3 0 5 m g (0 . 2 6 m m o l)、トルエン 9 0 m l、ジメトキシエタン 3 0 m l、2 M 炭酸ナトリウム水溶液 1 9 m l を加え、9 0 にて、1 2 時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1 時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(1 - 2 0) を 3 . 6 g (収率 5 2 %) 得た。


10

F D マス分析の結果、分子量 5 3 0 に対し、 $m / e = 5 3 0$ であった。

【 0 2 4 2】

合成実施例 1 1 (化合物(1 - 2 5) の合成)

【化 8 0】



20

【 0 2 4 3】

アルゴン雰囲気下、ボロン酸 I - 1 3 5 . 1 g (1 7 m m o l)、臭素化物 I - 1 9 6 . 9 g (1 7 m m o l)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 4 0 0 m g (0 . 3 4 m m o l)、トルエン 1 2 0 m l、ジメトキシエタン 4 0 m l、2 M 炭酸ナトリウム水溶液 2 5 m l を加え、9 0 にて、1 2 時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1 時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(1 - 2 5) を 5 . 2 g (収率 5 3 %) 得た。


30

F D マス分析の結果、分子量 5 8 0 に対し、 $m / e = 5 8 0$ であった。

【 0 2 4 4】

合成実施例 1 2 (化合物(1 - 2 7) の合成)

【化 8 1】



40

【 0 2 4 5】

アルゴン雰囲気下、ボロン酸 I - 4 5 . 6 g (1 6 m m o l)、臭素化物 I - 1 6 4 . 5 g (1 6 m m o l)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 3 7 5 m g (0 . 3 2 m m o l)、トルエン 1 0 0 m l、ジメトキシエタン 4 0 m l、2 M 炭酸ナトリウム水溶液 2 3 m l を加え、9 0 にて、1 2 時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1 時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相

50


を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(1-27)を5.5g(収率68%)得た。

FDマス分析の結果、分子量506に対し、 $m/e = 506$ であった。

【0246】

合成実施例13(化合物(1-36)の合成)

【化82】



10

【0247】

アルゴン雰囲気下、ボロン酸I-17 5.6g(15mmol)、臭素化物I-20 5.8g(15mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 350mg(0.30mmol)、トルエン100ml、ジメトキシエタン40ml、2M炭酸ナトリウム水溶液 22mlを加え、90℃にて、12時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(1-36)を5.1g(収率54%)得た。


20

FDマス分析の結果、分子量630に対し、 $m/e = 630$ であった。

【0248】

合成実施例14(化合物(1-2)の合成)

【化83】



30

【0249】

アルゴン雰囲気下、臭素化物I-21 6.9g(18mmol)、ボロン酸I-2 6.2g(18mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 420mg(0.36mmol)、トルエン120ml、ジメトキシエタン40ml、2M炭酸ナトリウム水溶液 26mlを加え、90℃にて、12時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(1-2)を6.8g(収率62%)得た。


40

FDマス分析の結果、分子量606に対し、 $m/e = 606$ であった。

【0250】

合成実施例15(化合物(1-50)の合成)

【化84】



50

【0251】

アルゴン雰囲気下、臭素化物 I - 3 5.0 g (15 mmol)、ボロン酸 I - 22 6.0 g (15 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 350 mg (0.30 mmol)、トルエン 100 ml、ジメトキシエタン 30 ml、2 M 炭酸ナトリウム水溶液 22 ml を加え、90 にて、14 時間撹拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1時間撹拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(1-50)を5.8 g (収率64%)得た。


FDマス分析の結果、分子量606に対し、 $m/e = 606$ であった。

10

【0252】

合成実施例16(化合物(1-51)の合成)

【化85】



【0253】

アルゴン雰囲気下、臭素化物 I - 3 5.0 g (15 mmol)、ボロン酸 I - 23 6.7 g (15 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 350 mg (0.30 mmol)、トルエン 100 ml、ジメトキシエタン 30 ml、2 M 炭酸ナトリウム水溶液 22 ml を加え、90 にて、14 時間撹拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1時間撹拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(1-51)を5.5 g (収率56%)得た。


FDマス分析の結果、分子量656に対し、 $m/e = 656$ であった。

20

【0254】

合成実施例17(化合物(1-60)の合成)

【化86】



【0255】

アルゴン雰囲気下、臭素化物 I - 24 5.7 g (15 mmol)、ボロン酸 I - 22 6.0 g (15 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 350 mg (0.30 mmol)、トルエン 100 ml、ジメトキシエタン 30 ml、2 M 炭酸ナトリウム水溶液 22 ml を加え、90 にて、14 時間撹拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1時間撹拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(1-60)を5.4 g (収率55%)得た。


FDマス分析の結果、分子量656に対し、 $m/e = 656$ であった。

40

【0256】

合成実施例18(化合物(1-69)の合成)

【化 8 7】



【 0 2 5 7】


アルゴン雰囲気下、臭素化物 I - 2 5 6 . 1 g (1 7 m m o l)、ボロン酸 I - 2 3 7 . 7 g (1 7 m m o l)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 4 0 0 m g (0 . 3 4 m m o l)、トルエン 1 2 0 m l、ジメトキシエタン 4 0 m l、2 M炭酸ナトリウム水溶液 2 6 m lを加え、9 0 にて、1 4 時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1 時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(1 - 6 9)を6 . 0 g (収率 5 2 %)得た。

F D マス分析の結果、分子量 6 8 0 に対し、 $m/e = 6 8 0$ であった。

【 0 2 5 8】

合成実施例 1 9 (化合物(2 - 1 7) の合成)

【化 8 8】



【 0 2 5 9】


アルゴン雰囲気下、ジ臭素化物 I - 2 6 2 . 1 g (7 . 3 m m o l)、ボロン酸 I - 4 5 . 3 g (1 5 m m o l)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 4 0 0 m g (0 . 3 0 m m o l)、トルエン 1 0 0 m l、ジメトキシエタン 3 0 m l、2 M炭酸ナトリウム水溶液 2 2 m lを加え、9 0 にて、1 2 時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1 時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(2 - 1 7)を3 . 1 g (収率 6 2 %)得た。

F D マス分析の結果、分子量 7 3 2 に対し、 $m/e = 7 3 2$ であった。

【 0 2 6 0】

合成実施例 2 0 (化合物(2 - 1 8) の合成)

【化 8 9】



【 0 2 6 1】

アルゴン雰囲気下、ジ臭素化物 I - 9 2 . 1 g (7 . 3 m m o l)、ボロン酸 I - 4 5 . 3 g (1 5 m m o l)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 4 0 0 m g (0 . 3 0 m m o l)、トルエン 1 0 0 m l、ジメトキシエタン 3 0 m l、2 M炭酸ナトリウム水溶液 2 2 m lを加え、9 0 にて、1 4 時間攪拌した。反応混合物を室温まで放冷し、水を加え室温にて1 時間攪拌後、トルエンで抽出した。分液後、有機

相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、トルエンで再結晶化することにより、化合物(2-18)を3.4 g(収率64%)得た。

FDマス分析の結果、分子量732に対し、 $m/e = 732$ であった。

【0262】

実施例 1

(有機EL素子の作製)

25 mm × 75 mm × 0.7 mm厚のITO透明電極付きガラス基板(旭硝子製)をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。洗浄後の透明電極ライン付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極ラインが形成されている側の面上に、前記透明電極を覆うようにして膜厚50 nmのHT1を成膜した。該HT1膜は正孔注入輸送層として機能する。さらに、該正孔注入輸送層の成膜に続けて、この膜上に膜厚40 nmの上記化合物(1-1)、および燐光発光性のドーパントとして $\text{Ir}(\text{piq})_3$ を10質量%になるよう抵抗加熱により共蒸着膜成膜した。該膜は、発光層(燐光発光層)として機能する。該発光層成膜に続けて、膜厚40 nmでET1を成膜した。該膜は電子輸送層として機能する。この後、LiFを電子注入性電極(陰極)として成膜速度0.1 nm/minで膜厚0.5 nm形成した。このLiF層上に金属Alを蒸着させ、金属陰極を膜厚150 nm形成し有機エレクトロルミネッセンス素子を形成した。

【0263】

実施例 2 ~ 23、比較例 1 ~ 7


実施例 1 の化合物(1-1)に代えて、下記の表 1 に示す化合物を用いた以外は、実施例 1 と同様にして有機エレクトロルミネッセンス素子を形成した。

【0264】

実施例 2 4

燐光発光性のドーパントとして、 $\text{Ir}(\text{piq})_3$ に代えて下記Complex Aを用いた以外は、実施例 1 4 と同様にして有機エレクトロルミネッセンス素子を形成した。

【化90】



Complex A

【0265】

実施例 2 5

燐光発光性のドーパントとして、 $\text{Ir}(\text{piq})_3$ に代えて下記Complex Bを用いた以外は、実施例 1 4 と同様にして有機エレクトロルミネッセンス素子を形成した。


10

20

30

40

【化 9 1】



Complex B

10

【 0 2 6 6 】

比較例 8

化合物 (1 - 2) に代えて C B P を用いた以外は、実施例 2 4 と同様にして有機エレクトロルミネッセンス素子を形成した。

【 0 2 6 7 】

比較例 9

化合物 (1 - 2) に代えて B A 1 q を用いた以外は、実施例 2 5 と同様にして有機エレクトロルミネッセンス素子を形成した。

20

【 0 2 6 8 】





〔有機エレクトロルミネッセンス素子の発光性能評価〕

上記の実施例 1 ~ 2 5、比較例 1 ~ 9 で作製した有機 E L 素子を、直流電流駆動により発光させ、電流密度 10 mA/cm^2 における電圧、発光効率および輝度半減寿命 (初期輝度 3000 cd/m^2) を測定した。また、70 駆動時における画素均一性を目視で確認し、均一な場合は A、不均一な部分が見られる場合は B とした。さらに、試料の燐光スペクトルを測定し ($10 \mu\text{mol/l}$ / リットル E P A (ジエチルエーテル : イソペンタン : イソプロピルアルコール = 5 : 5 : 2 容積比) 溶液、77 K、石英セル、S P E X 社 F L U O R O L O G I I)、燐光スペクトルの短波長側の立ち上がりに対して接線を引き横軸との交点である波長 (発光端) を求めた。この波長をエネルギー値に換算して、有機 E L 素子用材料の励起 3 重項エネルギー ($E_g(T)$) を測定した。なお、試料は全て昇華精製等の精製物を用いた。これらの評価の結果を表 1 及び表 2 に示す。


30

【 0 2 6 9 】






【化 9 2】

**Ir(piq)₃****HT1****CBP****ET1**

10

**BAlq**

20

**(A)****(B)****(C)****(D)****(E)**

30

【 0 2 7 0 】

【表 1】

表 1 - 1

	化合物	化合物の E _g (T) (eV)	電圧 (V)	発光効率 (cd/A)	輝度 半減寿命 (時間)	70℃駆動時 画素均一性
実施例 1	(1-1)	2.46	4.2	11.6	8100	A
実施例 2	(1-3)	2.44	3.9	13.0	9000	A
実施例 3	(1-6)	2.28	4.1	11.1	7200	A
実施例 4	(1-7)	2.26	4.0	11.3	8000	A
実施例 5	(1-11)	2.50	4.3	10.3	7500	A
実施例 6	(1-13)	2.44	4.3	10.2	7300	A
実施例 7	(1-17)	2.43	4.0	11.2	8400	A
実施例 8	(1-20)	2.25	4.1	11.6	8600	A
実施例 9	(1-25)	2.22	4.2	11.3	8400	A
実施例 10	(1-27)	2.46	4.3	10.9	8300	A
実施例 11	(1-36)	2.28	3.8	12.5	8800	A
実施例 12	(2-1)	2.48	4.2	10.3	7600	A
実施例 13	(2-5)	2.48	4.3	10.4	7000	A
比較例 1	CBP	2.81	5.7	6.3	1200	B
比較例 2	BAIq	2.28	5.3	7.0	2300	B
比較例 3	(A)	2.21	4.6	8.4	4000	B
比較例 4	(B)	2.50	4.5	8.7	3300	B
比較例 5	(C)	2.40	4.8	7.4	3500	B
比較例 6	(D)	2.20	4.7	7.0	3100	B

【 0 2 7 1 】

10

20

30

【表 2】

表 1 - 2

	化合物	化合物の E _g (T) (eV)	電圧 (V)	発光効率 (cd/A)	輝度 半減寿命 (時間)	70℃駆動時 画素均一性
実施例 14	(1-2)	2.50	4.3	11.4	7800	A
実施例 15	(1-50)	2.41	4.0	11.7	8800	A
実施例 16	(1-51)	2.37	4.1	10.8	7400	A
実施例 17	(1-60)	2.41	4.2	11.6	8500	A
実施例 18	(1-69)	2.31	4.1	10.9	7200	A
実施例 19	(2-17)	2.48	4.3	10.5	7000	A
実施例 20	(2-18)	2.49	4.3	10.2	6800	A
実施例 21	(2-19)	2.50	4.5	10.7	6600	A
実施例 22	(2-20)	2.44	4.2	11.6	7000	A
実施例 23	(2-21)	2.39	4.4	11.3	7500	A
比較例 7	(E)	2.50	4.8	9.1	2700	B

【0272】

【表 3】

表 2

	ドーパント	有機EL 素子用材料	電圧 (V)	発光効率 (cd/A)	輝度 半減寿命 (時間)	70℃駆動時 画素均一性
実施例 24	Complex A	(1-2)	4.6	9.0	6000	A
実施例 25	Complex B	(1-2)	4.5	8.2	6200	A
比較例 8	Complex A	CBP	5.9	4.3	1000	B
比較例 9	Complex B	BAIq	5.1	5.1	1800	B

【0273】

表 1 及び 2 より明らかなように、発光効率について、本発明の有機 EL 素子用材料を用いて構成した実施例 1 ~ 25 の有機エレクトロルミネッセンス素子は、外部量子効率が高く、寿命が格段に長いことが示された。

これに対し、比較例 1 ~ 9 は、電圧が高めで、発光効率が低く、寿命が短いことがわかる。特に、比較例 1 は、発光効率が低く、寿命も短い。比較例 2 は寿命も短い。比較例 3 ~ 6 は、発光効率は高めだが、寿命は実施例に比べて短い。また比較例は 70 の発光面の均一性に劣る。

【0274】

本発明の組合せの特徴は、ホスト材料の 3 重項エネルギーギャップとドーパントの 3 重項エネルギーギャップが適切であるため発光効率が向上することと、有機 EL 素子用材料に含窒素環、窒素原子等が置換されていないため、発光材料が正孔、電子に対し高い耐性を持っており、これにより、従来知られていた組合せよりも長寿命化することである。ま


た、薄膜の熱安定性が良好なため、70 駆動時でも安定した素子が得られる。

【産業上の利用可能性】

【0275】

本発明は、高効率かつ長寿命な燐光発光性の有機エレクトロルミネッセンス素子として利用できる。

【図1】



フロントページの続き

- (51)Int.Cl. F I
C 0 7 C 13/66
C 0 7 C 15/38
- (56)参考文献 特開 2 0 0 9 - 2 7 2 1 4 4 (J P , A)
特開 2 0 0 7 - 0 8 4 4 8 5 (J P , A)
特開 2 0 1 0 - 0 5 9 1 5 8 (J P , A)
国際公開第 2 0 1 0 / 0 8 3 8 6 9 (W O , A 1)
国際公開第 2 0 1 0 / 0 4 7 7 0 7 (W O , A 1)
- (58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)
H 0 1 L 5 1 / 5 0
C 0 9 K 1 1 / 0 6

专利名称(译)	用于有机电致发光器件的材料和使用其的有机电致发光器件		
公开(公告)号	JP5351901B2	公开(公告)日	2013-11-27
申请号	JP2010544867	申请日	2009-12-25
[标]申请(专利权)人(译)	出光兴产株式会社		
申请(专利权)人(译)	出光兴产株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	出光兴产株式会社		
[标]发明人	岩隈俊裕 高嶋頼由 荻原俊成		
发明人	岩隈 俊裕 高嶋 頼由 荻原 俊成		
IPC分类号	H01L51/50 C09K11/06 C07C15/30 C07C13/66 C07C15/38		
CPC分类号	C07C13/66 C07C15/20 C07C15/30 C07C15/38 C07C2602/28 C07C2603/26 C07C2603/42 C07C2603/52 C07D307/91 C07D407/10 C09K11/06 C09K2211/1011 H01L51/0058 H01L51/0065 H01L51/5016 H05B33/14		
FI分类号	H05B33/14.B H05B33/22.B C09K11/06.660 C09K11/06.690 C07C15/30 C07C13/66 C07C15/38		
优先权	2009000332 2009-01-05 JP		
其他公开文献	JPWO2010076878A1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

用于在分子中具有2,7-二取代萘环的有机电致发光器件的材料，和在阴极和阳极之间包含一层或多层的有机薄膜层，所述有机薄膜层包含摘要：有机电致发光器件包括用于有机电致发光器件的材料和至少一种磷光发光材料，提供了具有长寿命和高发光效率的有机电致发光器件以及用于实现该有机电致发光器件的有机电致发光器件材料。

