



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102426253 A

(43) 申请公布日 2012. 04. 25

(21) 申请号 201110257932. 0

(22) 申请日 2011. 08. 31

(71) 申请人 内蒙古科慧生物科技有限责任公司
地址 012000 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔经济技术开发区赛汗工业园区平一路北

(72) 发明人 不公告发明人

(74) 专利代理机构 北京富天民宏济知识产权代理事务所(普通合伙) 11272
代理人 刘寿椿 龚雅民

(51) Int. Cl.

G01N 33/74 (2006. 01)

G01N 33/531 (2006. 01)

G01N 21/76 (2006. 01)

权利要求书 3 页 说明书 11 页

(54) 发明名称

雌二醇 (E2) 定量测定试剂盒及其检测方法

(57) 摘要

本发明公开了一种雌二醇 E2 的定量测定试剂盒,其特征在于,该试剂盒包含 E2 磁分离试剂,酶反应物,反应增强剂,稀释液, E2 校准品、E2 质控品,清洗液浓缩液以及底物溶液。本发明还公开了该试剂盒的制备方法。本发明试剂盒将化学发光技术与免疫磁微粒相结合,提供了一种接近均相的反应体系,与现有技术相比,本发明试剂盒具有更高的检测灵敏度和特异性,并达到了较佳的性能参数,并且大大降低了产品成本。

1. 一种雌二醇 E2 的定量测定试剂盒,其特征在于,该试剂盒包含 E2 磁分离试剂,酶反应物,反应增强剂,稀释液,E2 校准品、E2 质控品,清洗液浓缩液以及底物溶液。

2. 如权利要求 1 所述的试剂盒,其特征在于,所述的 E2 磁分离试剂含有标记有抗 E2 单克隆抗体的磁性微球;

所述的酶反应物是含有碱性磷酸酶标记的 E2 抗原;

所述的反应增强剂是含有 Tris 的缓冲液;

所述稀释液是含有 BSA 的溶液;

所述的校准品及质控品是含有一定量的 E2 抗原的 BSA 溶液;

所述清洗液浓缩液是含有 TWEEN-20 和 Proclin-300 的缓冲液;

所述的底物溶液为酶促化学发光底物溶液。

3. 如权利要求 1-2 任其一所述的试剂盒,其特征在于,所述试剂盒中各组分按照如下制备方法制得:

一、磁分离试剂的制备过程

一)、磁珠缓冲液配制操作步骤,配制 1L:

(1)、称取 TRIS 4.58g 和 NaCl6.81g 于 1L 容器中,称取 0.96g TWEEN-20 于 20ml 容器中加适量水使其完全溶解后,倒入上述 1L 容器中;

(2)、用移液器将 Proclin-300 量取 0.2ml 于 10ml 纯化水的烧杯中完全溶解后,倒入上述 1L 容器中,然后在上述 1L 容器中加入 800ml 纯化水,充分搅拌;

(3)、调节 PH,控制 PH 在 7.95-8.05 之间;

(4)、称取 BSA 3g 倒入上述 1L 容器中;

(5)、最后定容至 1000ml,用 0.2um 滤器过滤即得;

二)、磁分离试剂的制备过程

(1)、将 1.0mg 辛二酸二琥珀酰亚胺酯溶于 50ul DMSO 中,取 2mg 抗 E2 单克隆抗体溶于 PH 9.5 的 0.1mol/L PB 缓冲液中至总体积为 1ml;

(2)、用移液枪吸取上述辛二酸二琥珀酰亚胺酯加入到步骤 1 的抗体溶液中,置室温 90min;

(3)、将步骤 2 所得溶液加入到浓缩管中,然后放入到高速冷冻离心机中在 3000g 下离心 30min 浓缩至 0.5ml;

(4)、取 0.5ml 磁珠,加入 5ml 反应杯中,经磁铁吸附 2 分钟后吸取上清,然后加入 1.5ml PH9.50.1mol/L PB,混匀 30 秒,然后加入步骤 3 获得的抗体溶液,混匀后室温反应 4 小时;

(5)、加入 0.3ml 1mol/L 的 TRIS 溶液 37°C 15 分钟,然后加入 1.5ml PH 7.20.1mol/L PB 清洗已经标记的磁珠,混匀 30 秒;

(6)、用 100ml 磁珠保存液将磁珠转入玻璃瓶;

(7)、将步骤 6 获得的溶液与上述磁珠缓冲液按照 1 : 1 的体积比例混匀,即得权利要求 1 或 2 所述试剂盒中的磁分离试剂;

二、酶反应物的制备过程

一)、酶反应物稀释液配制操作步骤,配制 1L:

(1)、取 Tris 6.06g、NaCl 13.0g、Zncl₂ 0.05g、Proclin-300 0.2ml 和 MgCl₂ 0.05g 于烧瓶中,然后在烧瓶中加入 800ml 纯化水,充分搅拌,使试剂完全溶解;

- (2)、调 PH,控制 PH 在 7.35-7.45 范围内;
- (3)、称取 BSA 3g 倒入上述烧杯中;
- (4)、最后定容至 1000ml,用 0.2um 滤器过滤即得;

二)、碱性磷酸酶 ALP 与 E2 抗原的偶联

- (1)、取 E2-6-cmo-BSA 抗原;
- (2)、取 200ul DMSO 溶解抗原使抗原的终浓度到达 5mg/ml,充分混匀;
- (3)、按照 1mol 抗原加入 10mol 的辛二酸二琥珀酰亚胺酯的摩尔比例加辛二酸二琥珀酰亚胺酯到步骤 2 的溶液中,37℃恒温箱中反应 1.5 小时;
- (4)、按照 3mol 抗原加入 1mol 的 ALP 的摩尔比往步骤 3 溶液中添加 ALP,然后加入 1mlPH 为 7.4 浓度为 0.1M 的 PB 缓冲液,置于 37 度恒温箱中反应 3 小时;
- (5)、将步骤 4 的溶液用 PD-10 柱纯化,收集纯化液,按照 1 : 3000 的体积比添加上述步骤一)获得的酶反应物稀释液,混合均匀,即得酶反应物。

三、反应增强剂的制备过程,配制 1L:

- (1)、取 TRIS1.56g 和 NaCl 4.23g 于 1L 容器中,取 0.2ml Proclin-300 于 10ml 纯化水的烧杯中完全溶解后,倒入上述 1L 容器中;
- (2)、取 800ml 纯化水于上述 1L 容器中,充分搅拌直至完全溶解,调 PH 在 7.35-7.45 之间;
- (3)、称取 Mak330.9g 于上述 1L 容器中;最后定容 1000ml,完全溶解后,用 0.2um 滤器过滤即得;

四、稀释液的制备过程,配制 1L:

- (1)、称取 NaCl9.0g 和 BSA 60g 于 1L 的容器中;
- (2)、取 0.5ml Proclin-300 加 10ml 纯化水溶解,倒入上述 1L 的容器中;
- (3)、最后定容 1000ml,完全溶解后,用 0.2um 滤器过滤即得;

五、E2 校准品和 E2 质控品的配制:

E2 校准品中 E2 抗原的浓度分别为 50,100,250,750,1500,3000pg/ml ;E2 质控品中 E2 抗原的浓度分别为 100,1500pg/ml ;

六、清洗液浓缩液的制备过程,配制 1L:

- (1)、取 TRIS 12.54g 和 NaCl 325.6g 于 1L 容器中;
- (2)、取 5g Tween-20 于 100ml 容器加 20ml 水使其完全溶解后,倒入上述 1L 容器中;
- (3)、取 0.2ml Proclin-300 于盛有 10ml 纯化水的烧杯中完全溶解后,倒入上述 1L 容器中;
- (4)、取 800ml 纯化水于上述 1L 容器中,充分搅拌,直至完全溶解;
- (5)、调 PH,控制其范围在 7.35-7.45 之间;
- (6)、最后定容 1000ml,完全溶解后用 0.2um 滤器过滤即得;

七、底物溶液的制备过程,配制 1L:

- (1)、取 TRIS 2.35g、NaCl 6.41g、Na₂SO₃ 0.002g 和 Proclin-300 0.2ml 于 1L 烧杯中;
- (2)、取 600ml 纯化水于 1L 烧杯中,充分搅拌直至完全溶解,调 PH 在 7.95-8.05 之间;
- (3)、加入 250ml Lumi-Phos 480,用 0.2um 滤器过滤收集滤液,用纯化水定容至 1000ml,混匀后即得。

4. 如权利要求 1-3 任其一所述的试剂盒,其特征在于,所述试剂盒的使用方法如下:

1)、加 45 μ l E2 校准品、E2 质控品、待测标本至对应试管底部;

2)、加 60 μ l 酶反应物至每一试管中;

3)、加 60 μ l 反应增强剂至每一试管中;

4)、加 30 μ l 磁分离试剂至每一试管中;

5)、用塑料薄膜覆盖试管,多管混匀器轻轻振荡试管架 30s 后,置 37°C 水浴 30 分钟;

6)、然后放至磁分离器上,确保每支试管都与分离器表面接触,沉淀 2 分钟,倒转分离器倒出上清液;

7)、清洗液浓缩液用纯化水稀释 20 倍后,加 200 μ l 稀释后的清洗液至每一试管中,置多管混匀器上轻轻振荡混匀 30s;

8)、加 200 μ l 底物溶液至试管中混匀 3 秒,发光检测仪检测。

5. 如权利要求 4 所述的试剂盒,其特征在于,所述待测标本为高值 HOOK 样本时,根据需要使用稀释液对标本进行稀释。

雌二醇 (E2) 定量测定试剂盒及其检测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及测定血清的试剂盒及其测试方法,尤其是涉及测定血清中雌二醇 (E2) 含量的试剂盒及其测试方法。

背景技术

[0002] 雌二醇 (E2) 是一种含芳香化 A 环的 18 碳类固醇激素,分子量为 272.4 道尔顿。雌二醇是女性雌激素中生物活性最强的一种甾体激素,主要来源于卵巢、黄体 and 胎盘,少量由肾上腺分泌。男性主要由睾丸产生。血循环中 98% 的雌二醇与性激素结合球蛋白 (SHBG) 结合,少量与白蛋白结合,只有极少量呈游离态的雌二醇具有生理活性。雌二醇的作用是通过与相应的核受体结合,在细胞核水平触发相应的调节反应。其生理效应主要是促使女性生殖器官的生长发育、促使第二性征的发育、对下丘脑-垂体轴的影响等。并对女性月经维持、产卵、排卵、受精、妊娠起着重要作用。男性体内也有少量雌二醇,如果雌激素与睾酮比例失调,男性会出现一些特定的症状,例如腹型肥胖、乳房发育、性欲下降和雄激素低下所引发的其他一些症状。一些治疗药物、慢性酒精中毒和一些长期处于亚健康状态的情况也常会导致雌二醇水平升高。临床上雌二醇水平常用于评价卵巢功能,也可用于诊断女性性早熟和男子女性化乳房发育。对于临床常见的无月经情况,如更年期、怀孕或其他疾病所致的闭经,雌二醇也是很重要的检查之一。在辅助生殖技术中,连续检测雌二醇用于体外受精前确定卵泡生长情况。此外,还用于监测更年期激素替代治疗。在孕期筛查方面,雌二醇与母体 AFP、hCG 和抑制素 A 共同用于监测胎儿畸形的一些疾病,如唐氏综合征。从检测角度来说,目前临床上用于测定 E2 的方法主要有放免法、ELISA 法、化学发光法等。

[0003] 过去以放免为代表的雌二醇 (E2) 测定试剂盒受方法学的限制,其灵敏度和抗干扰能力严重不足,存在很大的弊端,已基本退出市场,目前应用较多的为酶联免疫检测技术和化学发光技术。化学发光技术兴起于上个世纪 80 年代是继酶联免疫技术和放免技术之后发展起来的新兴技术,由于其高灵敏度、高特异性,同时方法简便、快速,标记结合物稳定,无放射性同位素损伤和污染等特点,在近些年得到了飞速发展。

[0004] 磁微粒分离酶联免疫检测技术是一种以磁性微粒为固相分离载体,将免疫磁微粒分离技术与酶联免疫检测技术相结合而建立的一种新型免疫检测方法。传统 ELISA 方法,抗原、抗体的结合反应是在固相 (ELISA 板反应孔) 表面进行的,而磁微粒分离酶联免疫检测方法,抗原、抗体的结合反应也在近似液相的条件下进行,因而反应快速、彻底。与传统 ELISA 相比具有灵敏度高,检测用时少的优点。

发明内容

[0005] 本发明需要解决的技术问题在于提供一种雌二醇 (E2) 定量测定试剂盒及其检测方法,采用该试剂盒进行 E2 检测具有较高的灵敏度和特异性,和更短的获得检测结果的时间和更简便的操作方式。

[0006] 本发明提供了一种雌二醇 (E2) 的定量测定试剂盒,其包含的试剂有 E2 磁分离试

剂,酶反应物,反应增强剂,稀释液,校准品、质控品,清洗液浓缩液以及底物溶液。

[0007] 所述的磁分离试剂含有标记有抗 E2 单克隆抗体的磁性微球。

[0008] 所述的酶反应物是含有碱性磷酸酶标记的 E2 抗原。

[0009] 所述的反应增强剂是含有 Tris 的缓冲液。

[0010] 所述稀释液是含有 BSA 溶液。

[0011] 所述的校准品及质控品是含有一定量的 E2 抗原的 BSA 蛋白溶液。

[0012] 所述清洗液浓缩液是含有 TWEEN-20 和 Proclin-300 的缓冲液。

[0013] 所述的底物溶液为酶促化学发光底物溶液。

[0014] 本发明雌二醇 (E2) 的定量测定试剂盒的制备方法,包括下述步骤:

[0015] 第一步:磁分离试剂的制备过程

[0016] 一、磁珠缓冲液配制操作步骤,配制 1L:

[0017] 1、称取 TRIS 4.58g 和 NaCl 6.81g 于 1L 容器中,称取 0.96g TWEEN-20 于 20ml 容器中加适量水使其完全溶解后,倒入上述容器中;

[0018] 2、用移液器将 Proclin-300 量取 0.2ml 于 10ml 纯化水的烧杯中完全溶解后,倒入上述 1L 容器中,然后在上述 1L 容器中加入 800ml 纯化水,充分搅拌;

[0019] 3、调节 PH 计测量其 PH 值,调 PH,控制 PH 在 7.95-8.05 之间;

[0020] 4、称取 BSA 3g 倒入上述 1L 容器中;

[0021] 5、最后定容至 1000ml,用 0.2um 滤器过滤;过滤完后贴好标签于 2-8℃ 冷库贮存。

[0022] 二、磁分离试剂的制备过程

[0023] 1、将 1.0mg 辛二酸二琥珀酰亚胺酯溶于 50ul DMSO 中,取 2mg 抗 E2 单克隆抗体溶于 PH 9.5 的 0.1mol/L PB 缓冲液中至总体积为 1ml;

[0024] 2、确定辛二酸二琥珀酰亚胺酯的投入量,用移液枪吸取辛二酸二琥珀酰亚胺酯加入到步骤 1 的抗体溶液中,置室温 90min;

[0025] 3、将步骤 2 抗体溶液加入到 Centricon-10 浓缩管中然后放入到高速冷冻离心机中在 3000g 下浓缩 30min 至体积为 0.5ml;

[0026] 4、取 0.5ml 磁珠,加入 5ml 反应杯中,放入专用试管架,经磁铁吸附 2 分钟后吸取上清;

[0027] 5、每次加入 1.5ml PH9.5 0.1mol/L PB,混匀 30 秒,上架,去上清,重复操作 3 次;将步骤 4 获得的抗体溶液加入到上述磁珠中,混匀后室温反应 4 小时;

[0028] 6、加入 0.3ml 1mol/L 的 TRIS 溶液 37℃ 15 分钟;

[0029] 7、每次加入 1.5ml PH 7.2 0.1mol/L PB 清洗已经标记的磁珠,混匀 30 秒,上架,去上清,重复操作 3 次;

[0030] 8、用 100ml 磁珠保存液将磁珠转入 125ml 玻璃瓶,即为 0.05% 的 E2 磁分离试剂;磁珠保存液配方为 0.1% BSA,0.05% 吐温 -20,0.02% NaN₃,20% 乙醇,4℃ 保存。

[0031] 9、将步骤 9 获得的磁分离试剂用磁珠缓冲液按照 1:1 的比例混匀,即得本发明试剂盒中磁分离试剂。

[0032] 第二步:酶反应物制备过程

[0033] 一、酶反应物稀释液配制操作步骤,配制 1L:

[0034] 1、取 Tris 6.06g、NaCl 13.0g、ZnCl₂ 0.05g、Proclin-300 0.2ml 和 MgCl₂ 0.05g

于烧瓶中,然后在烧瓶中加入 800ml 纯化水,充分搅拌,使试剂完全溶解;

[0035] 2、调 PH,控制 PH 在 7.35-7.45 范围内;

[0036] 3、称取 BSA 3g 倒入上述烧杯中;

[0037] 4、最后定容至 1000ml,用 0.2um 滤器过滤即得。

[0038] 二、碱性磷酸酶 ALP 与 E2 抗原的偶联

[0039] 1、取 E2-6-cmo-BSA 抗原 1mg 放置于 1ml 玻璃管中;

[0040] 2、取 200ul DMSO 溶解抗原使抗原的终浓度到达 5mg/ml,充分混匀;

[0041] 3、按照 1mol 抗原加入 10mol 的辛二酸二琥珀酰亚胺酯的摩尔比例加辛二酸二琥珀酰亚胺酯到步骤 2 的溶液中,37℃恒温箱中反应 1.5 小时;

[0042] 4、按照 3mol 抗原加入 1mol 的 ALP 的摩尔比往步骤 3 溶液中添加 ALP,然后加入 1ml 的 PH 为 7.4 浓度为 0.1M 的 PB 缓冲液,置于 37 度恒温箱中反应 3 小时;

[0043] 5、将步骤 4 的溶液用 PD-10 柱纯化,收集纯化液,按照 1 : 3000 的体积添加上述步骤一)获得的酶反应物稀释液,混合均匀,即得酶反应物。

[0044] 第三步:

[0045] 反应增强剂配制步骤,配制 1L:

[0046] 1、称取 TRIS1.56g 和 NaCl 4.23g 于 1L 容器中;用移液器将 Proclin-300 量取 0.2ml 于 10ml 纯化水的烧杯中完全溶解后,倒入上述 1L 容器中;

[0047] 2、用量筒量取 800ml 纯化水于上述 1L 容器中,充分搅拌,直至完全溶解调 PH,控制 PH 在 7.35-7.45 之间;

[0048] 3、称取 Mak33 0.9g 于上述 1L 容器中;最后定容 1000ml,完全溶解后,用 0.2um 滤器过滤。

[0049] 第四步:

[0050] 稀释液配制步骤,配制 1L:

[0051] 1、称取 NaCl9.0g 和 BSA 60g 于 1L 的容器中;

[0052] 2、用移液器将 Proclin-300 量取 0.5ml 加 10ml 纯化水溶解,倒入上述 1L 的容器中;

[0053] 3、最后定容 1000ml,完全溶解后,用 0.2um 滤器过滤,贴好标签于 2-8℃冷库贮存,有效期为 12 个月。

[0054] 第五步:

[0055] 校准品和质控品的配制:

[0056] 校准品浓度分别为 50,100,250,750,1500,3000pg/ml;质控品浓度分别为 100,1500pg/ml。

[0057] 第六步:

[0058] 清洗浓缩液配制步骤,配制 1L:

[0059] 1、称取 TRIS 12.54g 和 NaCl 325.6g 于 1L 容器中;

[0060] 2、称取 5g Tween-20 于 100ml 容器中加 20ml 水使其完全溶解后,倒入上述 1L 容器中;

[0061] 3、用移液器将 Proclin-300 量取 0.2ml 于盛有 10ml 纯化水的烧杯中完全溶解后,倒入上述 1L 容器中;

- [0062] 4、用量筒量取 800ml 纯化水于上述 1L 容器中,充分搅拌,直至完全溶解;
- [0063] 5、调 PH,控制其范围在 7.35-7.45 之间;
- [0064] 6、最后定容 1000ml,完全溶解后用 0.2um 滤器过滤即得。
- [0065] 第七步:
- [0066] 底物溶液配制步骤,配制 1L:
- [0067] 1、称取 TRIS 2.35g、NaCl 6.41g、 Na_2SO_3 0.002g 和 Proclin-300 0.2ml 于 1L 烧杯中;
- [0068] 2、用量筒量取 600ml 纯化水于 1L 烧杯中,充分搅拌,直至完全溶解,调 PH,控制其范围在 7.95-8.05 之间;
- [0069] 3、加入 250ml Lumi-Phos 480 后,用 0.2um 滤器过滤收集滤液,用纯化水定容至 1000ml,混匀后即得。
- [0070] 本发明工作原理:本发明为竞争法化学发光免疫分析法与磁性微粒分离技术相结合的一种检测方法。在标本、校准品和质控品中加入定量的酶标 E2 抗原、结合着磁性微粒的 E2 单克隆抗体及稳定增强剂。37℃ 孵育后,酶标 E2 抗原与标本、校准品和质控品中 E2 竞争的与结合着磁性微粒的 E2 单克隆抗体发生特异性结合。在外加磁场中直接沉淀,不需离心即可分离。倒去上清液,清洗沉淀的复合物,然后加入酶促化学发光底物。底物在酶作用下被催化裂解,形成不稳定的激发态中间体,当激发态中间体回到基态时便发出光子,形成发光反应,即可使用发光仪检测反应的发光强度。在检测范围内,反应的发光强度与样本中的 E2 浓度成反比。
- [0071] 本发明的主要创新之处在于:
- [0072] 1、本发明试剂盒将化学发光技术与免疫磁微粒相结合,提供了一种接近均相的反应体系,与现有技术相比,本发明试剂盒具有更高的检测灵敏度和特异性,并达到了较佳的性能参数。
- [0073] 2、本发明公开了一种新的专用稳定增强剂以及清洗液浓缩液,使得反应过程更加稳定可靠,实验数据灵敏有效,在提高产品性能的同时,并且大大降低了产品成本;
- [0074] 3、试剂盒中的磁分离试剂,酶反应物,稳定增强剂,校准品、质控品,清洗液浓缩液、稀释液以及底物溶液均是该反应体系下的最优配方,给该试剂盒的使用效期及检测性能提供了有力保障。

具体实施方式

- [0075] 实施例 1、
- [0076] 一、磁珠缓冲液配制操作规程:配方见表 1,以配制 1L 为例:
- [0077] 1、称取 TRIS 4.58g 和 NaCl 6.81g 于 1L 容器中,称取 0.96g TWEEN-20 于 20ml 容器中加适量水使其完全溶解后,倒入上述容器中;
- [0078] 2、用移液器将 Proclin-300 量取 0.2ml 于少量纯化水的烧杯中完全溶解后,倒入上述 1L 容器中;然后在 1L 容器中加入 800ml 纯化水,充分搅拌,使试剂完全溶解;
- [0079] 3、调节 PH 值,测量其 PH 值;用 HCl 或 NaOH 调 PH,测量其 PH 在 7.95-8.05 之间即符合要求;
- [0080] 4、称取 BSA(牛血清白蛋白)3g 倒入上述容器中;

[0081] 5、最后定容至 1000ml,测 PH 值,范围在 7.95-8.05 之间即符合要求,用 0.2um 滤器过滤;过滤完后贴好标签于 2-8℃冷库贮存,磁珠缓冲液有效期为 12 个月;

[0082] 磁珠缓冲液表 1

[0083]

| 试剂 | 1000ml 用量 | 试剂级别 |
|-------------|----------------|------|
| TRIS | 4.58g | 分析纯 |
| NaCl | 6.81g | 分析纯 |
| TWEEN-20 | 0.96g | 分析纯 |
| Proclin-300 | 0.2ml | / |
| 加水至 | 加至 800ml, 溶解混匀 | |
| PH | 8.0±0.05 | |
| 加水至 | 加至 1000ml | |
| BSA | 3.0g | |
| 验证 PH | 8.0±0.05 | |
| 0.2um 滤器过滤 | | |

[0084]

[0085] 二、磁分离试剂的制备过程

[0086] 1、将 1.0mg DSS(辛二酸二琥珀酰亚胺酯)溶于 50ul DMSO 中,即浓度为 20mg/ml;取 2mg 抗 E2 单克隆抗体(天健生物制药(天津)有限公司,浓度为 3.63mg/ml)溶于 PH 9.5 的 0.1mol/LPB 缓冲液中至总体积为 1ml;

[0087] 2、计算 DSS 的投入量,按照以下公式计算:(抗体质量/16000)×10×368/C_{DSS},其中 C_{DSS} 指代 DSS 的物质的量浓度 mol/L;

[0088] 3、用移液枪吸取相应体积的 DSS 加入到步骤 1 的抗体溶液中,置室温 90min;

[0089] 4、将步骤 3 抗体溶液加入到 Centricon-10 浓缩管中然后放入到 sigma2-16k 高速冷冻离心机中在 3000g 的离心力下浓缩约 30min 至体积为 0.5ml;

[0090] 5、取 0.5ml 磁珠,磁珠浓度为 0.5g/ml,所述的磁珠直径在 0.9 μm 之间,加入 5ml 反应杯中,放入专用试管架,经磁铁吸附 2 分钟后吸取上清;

[0091] 6、每次加入 1.5ml PH9.5 0.1mol/L PB,混匀 30 秒,上架,去上清,重复操作 3 次;将步骤 4 获得的抗体溶液加入到磁珠中,混匀后室温反应 4 小时,保持混匀状态;

[0092] 7、加入 0.3ml 1mol/L 的 TRIS 溶液 37 度 15 分钟,其中 TRIS 的加样量为 1mg 抗体加 0.15ml TRIS;

[0093] 8、每次加入 1.5ml PH 7.2 0.1mol/L PB 清洗已经标记的磁珠,混匀 30 秒,上架,去上清,重复操作 3 次;

[0094] 9、用 100ml 磁珠保存液将磁珠转入 125ml 玻璃瓶,即为 0.05%的 E2 磁分离试剂;磁珠保存液配方为 0.1% BSA,0.05%吐温-20,0.02% NaN₃,20%乙醇,4℃保存。

[0095] 10、将步骤 9 获得的磁分离试剂用磁珠缓冲液按照 1 : 1 的比例混匀;

[0096] 11、贴好标签于 2-8℃冷库贮存,磁分离试剂有效期为 12 个月;

[0097] 实施例 2

[0098] 一、酶反应物稀释液配制操作规程;配方见表 2,以配制 1L 为例:

[0099] 1、取 Tris 6.06g、NaCl 13.0g、ZnCl₂ 0.05g、Proclin-300 0.2ml 和 MgCl₂ 0.05g 于烧瓶中;然后在烧瓶中加入 800ml 纯化水,充分搅拌,使试剂完全溶解;

[0100] 2、用 HCl 或 NaOH 调 PH,测量使 PH 在 7.35-7.45 范围内;

[0101] 3、称取 BSA 3g 倒入上述容器中;

[0102] 4、最后定容至 1000ml,测 PH 值,范围在 7.35-7.45 之间即符合要求,用 0.2um 滤器过滤;过滤完后,贴好标签于 2-8℃冷库贮存,有效期为 12 个月;

[0103] 酶反应物稀释液表 2

[0104]

| 试剂 | 1000ml 用量 | 试剂级别 |
|-------------------|------------------|------|
| TRIS | 6.06g | 分析纯 |
| NaCl | 13.0g | 分析纯 |
| Proclin-300 | 0.2ml | / |
| MgCl ₂ | 0.05g | 分析纯 |
| Zncl ₂ | 0.05g | 分析纯 |
| 纯化水 | 加至 800ml, 溶解混匀 | |
| HCL 或者 NaOH | 调节 PH 到 7.4±0.05 | |
| BSA | 3.0g | / |
| 纯化水 | 加至 1000ml, 充分混匀 | |
| 验证 PH | 7.4±0.05 | |
| 0.2um 滤器过滤 | | |

[0105] 二、碱性磷酸酶 ALP 与 E2 抗原的偶联

[0106] 1、取 E2-6-cmo-BSA 抗原 1mg 放置于 1ml 玻璃管中;

[0107] 2、取 200u_l DMSO 溶解抗原使抗原的终浓度到达 5mg/ml,充分混匀;

[0108] 3、按照 1mol 抗原加入 10mol 的辛二酸二琥珀酰亚胺酯的摩尔比例加辛二酸二琥珀酰亚胺酯到步骤 2 的溶液中,37℃恒温箱中反应 1.5 小时;

[0109] 4、按照 3mol 抗原加入 1mol 的 ALP 的摩尔比 3 : 1 往步骤 3 溶液中添加 ALP,然后加入 1ml 的 PH 为 7.4 浓度为 0.1M 的 PB 缓冲液,置于 37 度恒温箱中反应 3 小时;

[0110] 5、将步骤 4 的溶液用 PD-10 柱纯化,收集纯化液,按照 1 : 3000 的体积添加酶反

应物稀释液,混合均匀,即得酶反应物。

[0111] 实施例 3

[0112] 反应增强剂配制操作规程:配方见(表 3),以配制 1L 为例:

[0113] 1、称取 TRIS(三羟甲基氨基甲烷,分子式:(HOCH₂)₃CNH₂) 1.56g 和 NaCl 4.23g 于 1L 容器中;用移液器将 Proclin-300 量取 0.2ml 于少量纯化水的烧杯中完全溶解后,倒入上述 1L 容器中;

[0114] 2、用量筒量取 800ml 纯化水于 1L 容器中,充分搅拌,直至完全溶解;用 HCL 或 NaOH 调 PH,测量其范围在 7.35-7.45 之间;

[0115] 3、称取 Mak33 0.9g 于上述 1L 容器中;

[0116] 4、最后定容 1000ml,完全溶解后,测 PH 值,范围在 7.35-7.45 之间即符合要求,用 0.2um 滤器过滤;过滤完后,贴好标签于 2-8℃冷库贮存,有效期为 12 个月;

[0117] 反应增强剂的配制(表 3)

[0118]

| 试剂 | 1000ml 用量 | 试剂级别 |
|-------------|---------------------------|------|
| TRIS | 1.56g | 分析纯 |
| NaCl | 4.23g | 分析纯 |
| Proclin-300 | 0.2ml | / |
| 纯化水 | 加至 800ml, 混匀溶解 | |
| PH | 7.4±0.05 | |
| Mak33 | 加 Mak33 0.9g 于 800ml 纯化水中 | |
| 纯化水 | 加至 1000ml, 充分混匀 | |
| 验证 PH | 7.4±0.05 | |
| 0.2um 滤器过滤 | | |

[0119] 实施例 4

[0120] 稀释液配方见(表 4),以配制 1L 为例:

[0121] 1、称取 NaCl 9.0g 和 BSA 60g 于 1L 的容器中;

[0122] 2、用移液器将 Proclin-300 量取 0.5ml 加 10ml 纯化水溶解,倒入上述 1L 的容器中;

[0123] 3、最后定容 1000ml,完全溶解后,用 0.2um 滤器过滤,贴好标签于 2-8℃冷库贮存,有效期为 12 个月。

[0124] 稀释液的配制(表 4)

[0125]

| 试剂 | 1000ml 用量 | 试剂级别 |
|-------------|-----------|------|
| NaCl | 9g | 分析纯 |
| Proclin-300 | 0.5ml | / |
| BSA | 60g | / |
| 0.2um 滤器过滤 | | |

[0126] 实施例 5

[0127] 校准品和质控品的配制：

[0128] 1、最高点：最高浓度点为 X，目标点浓度为 A, B, C, D, E, F，配制 V 体积的溶液时，需加入原料的体积为分别为：表 5

[0129]

| 浓度 | 加入校准品稀释液体积 | 加入 X 体积 |
|----|------------|---------|
| A | $V-A*V/X$ | $A*V/X$ |
| B | $V-B*V/X$ | $B*V/X$ |
| C | $V-C*V/X$ | $C*V/X$ |
| D | $V-D*V/X$ | $D*V/X$ |
| E | $V-E*V/X$ | $E*V/X$ |
| OF | $V-F*V/X$ | $F*V/X$ |

[0130] 2、雌二醇 (E2) 定量测定试剂盒 E2 校准品原料 (购于 AMG 公司, 浓度为 10mg/ml) 用稀释液 (具体配方见实施例 4) 配制成浓度点为 50, 100, 250, 750, 1500, 3000pg/ml；质控品用稀释液配制的浓度点为 100, 1500pg/ml。

[0131] 3、完全溶解后, 贴好标签于 2-8°C 冷库贮存, 有效期为 12 个月。

[0132] 实施例 6：

[0133] 清洗浓缩液配制操作规程：配方见 (表 6), 以配制 1L 为例：

[0134] 1、称取 TRIS 12.54g 和 NaCl 325.6g 于 1L 容器中；

[0135] 2、称取 5g Tween-20 于 100ml 容器中加适量水使其完全溶解后, 倒入上述容器中；

[0136] 3、用移液器将 Proclin-300 量取 0.2ml 于盛有 10ml 纯化水的烧杯中完全溶解后, 倒入上述 1L 容器中；

[0137] 4、用量筒量取 800ml 纯化水于上述 1L 容器中, 充分搅拌, 直至完全溶解；

[0138] 5、用 HCL 或 NaOH 调 PH, 测量其范围在 7.35-7.45 之间；

[0139] 6、最后定容 1000ml, 测 PH 值, 范围在 7.35-7.45 之间即符合要求, 完全溶解后用 0.2um 滤器过滤；过滤完后, 贴好标签于 2-8°C 冷库贮存, 有效期为 12 个月；

[0140] 清洗浓缩液的配制 (表 6)

[0141]

| 试剂 | 1000ml 用量 | 试剂级别 |
|-------------|-----------------|------|
| TRIS | 12.54g | 分析纯 |
| NaCl | 325.6g | 分析纯 |
| Tween-20 | 5g | 分析纯 |
| Proclin-300 | 0.2ml | / |
| 纯化水 | 加至 800ml, 混匀溶解 | |
| PH | 7.4±0.05 | |
| 纯化水 | 加至 1000ml, 混匀溶解 | |
| 验证 PH | 7.4±0.05 | |
| 0.2um 滤器过滤 | | |

[0142]

[0143] 实施例 7

[0144] 底物溶液配制操作规程: 配方见(表 7), 以配制 1L 为例:

[0145] 1、称取 TRIS 2.35g、NaCl 6.41g、Na₂SO₃ 0.002g 和 Proclin-300 0.2ml 于 1L 烧杯中;

[0146] 2、用量筒量取 600ml 纯化水于 1L 烧杯中, 充分搅拌, 直至完全溶解; 用 HCl 或 NaOH 调 PH, 测量其范围在 7.95-8.05 之间;

[0147] 3、加入 250ml Lumi-Phos 480 后, 用 0.2um 滤器过滤收集滤液, 用纯化水定容至 1000ml, 混匀后, 贴好标签于 2-8℃ 冷库贮存, 有效期为 12 个月。

[0148] 化学发光底物的配制(表 7)

[0149]

| 试剂 | 1000ml 用量 | 试剂级别 |
|---------------------------------|-----------------|------|
| TRIS | 2.35g | 分析纯 |
| NaCl | 6.41g | 分析纯 |
| Na ₂ SO ₃ | 0.002g | 分析纯 |
| Proclin-300 | 0.2ml | / |
| 纯化水 | 加至 600ml, 混匀溶解 | |
| PH | 8.0±0.05 | |
| Lumi-Phos 480 | 250ml, 混匀 | |
| 验证 PH | 8.0±0.05 | |
| 0.2um 滤器过滤 | | |
| 纯化水 | 加至 1000ml, 充分混匀 | |

[0150] 本发明的测试方法如下

[0151] 1、加 45 μl E2 校准品、质控品、待测标本至对应试管底部。

[0152] 2、加 60 μl 酶反应物至每一试管中。

[0153] 3、加 60 μl 反应增强剂至每一试管中。

[0154] 4、加 30 μl 磁分离试剂至每一试管中。

[0155] 5、用塑料薄膜覆盖试管, 多管混匀器轻轻振荡试管架 30s 后, 置 37℃ 水浴 30 分钟。

[0156] 6、试管连架放至磁分离器上, 确保每支试管都与分离器表面接触, 沉淀 2 分钟。缓慢的倒转分离器倒出上清液, 把倒转的试管连同分离器一起放在滤纸上, 用力拍击分离器底部以除去粘在管壁上的所有液滴。

[0157] 7、清洗液浓缩液用纯化水稀释 20 倍后, 加 200 μl 稀释后的清洗液至每一试管中, 置多管混匀器上轻轻振荡混匀 30s。加样时应避免加样力度过大而导致磁珠溅出。混匀要彻底。

[0158] 8、重复步骤 6、7、6 一遍。

[0159] 9、加 200 μl 底物溶液至试管中混匀 3 秒, 迅速用准备好的发光检测仪进行检测。

[0160] 10、如遇到高值 HOOK 样本, 为了避免出现高值 HOOK 效应, 建议临床医师根据其余测试指标选择合适的稀释倍数对样品进行稀释。

[0161] 临床试验:

[0162] 1、检测数据

[0163] 标本采自 640 例正常体检、供血者。样本体检结果均无肝、脑、肾、消化道疾病, 半年内无输血和重大手术史, 妇女不在妊娠期和哺乳期。将测值进行统计学分析, 得出正常血清参考范围:

[0164]

| | 例数 | 范围 (pg/ml) |
|-----|-----|---------------|
| 男性 | 100 | <44.70 |
| 女性 | | |
| 卵泡期 | 140 | 7.30-35.30 |
| 排卵期 | 150 | 102.20-173.80 |
| 黄体期 | 130 | 30.80-126.30 |
| 绝经后 | 120 | <51.50 |

[0165] 与国外知名公司生产的试剂盒的检测结果相比,本发明试剂盒更加精确,精确到小数点后两位。

[0166] 本数据仅供参考,不同地区、不同个体以及采用不同方法进行检测,所测得的 E2 水平也会有所不同,建议各实验室建立自己的正常值范围。不可仅凭本方法得出的 E2 值作出诊断,仅作为中间数据参考作用,应结合临床其他资料分析结果,包括病人的具体情况和治疗状况。通过其他方法得到的样品中的 E2 浓度值与本试剂盒测定结果不具有直接的可比性。超出试剂盒测定范围的样本,系统将无法给出确切的数值。如欲测定其确切的结果,建议稀释后再进行测定。本试剂盒的检测结果仅供临床参考,不能单独作为确诊或排除病例的依据,为达到诊断目的,此检测结果要与临床检查、病史和别的检查结合使用。本品可用于血清样本的测定,用于其他体液样本中 E2 浓度测定的可靠性未得到充分确认。

[0167] 2、本发明试剂盒性能指标

[0168] 分析灵敏度定义为:对 20 次零校准品的测定,取其 2 倍的平均偏差,其在标准曲线上所对应的浓度即为分析灵敏度;分析灵敏度:8.00pg/ml;精密性:批内 CV% ≤ 10%,批间 CV% ≤ 15.0%;线性范围:8.00-3000pg/ml;线性系数: $r \geq 0.9900$;特异性:与主要类似物的交叉反应情况:

[0169]

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 潜在交叉 反应物 | 17-羟孕酮 5×10 ⁵ pg/ml | 17-羟基孕烯醇 酮 5×10 ⁵ pg/ml | 雌三醇 1×10 ⁵ pg/ml | 硫酸雌酮 1×10 ⁶ pg/ml | 皮质醇 1×10 ⁶ p g/ml |
| 干扰度 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% |

| | | | |
|----------------|--|---------|------------|
| 专利名称(译) | 雌二醇(E2)定量测定试剂盒及其检测方法 | | |
| 公开(公告)号 | CN102426253A | 公开(公告)日 | 2012-04-25 |
| 申请号 | CN201110257932.0 | 申请日 | 2011-08-31 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 内蒙古科慧生物科技有限责任公司 | | |
| 申请(专利权)人(译) | 内蒙古科慧生物科技有限责任公司 | | |
| 当前申请(专利权)人(译) | 内蒙古科慧生物科技有限责任公司 | | |
| [标]发明人 | 不公告发明人 | | |
| 发明人 | 不公告发明人 | | |
| IPC分类号 | G01N33/74 G01N33/531 G01N21/76 | | |
| 代理人(译) | 刘寿椿 | | |
| 外部链接 | Espacenet SIPO | | |

摘要(译)

本发明公开了一种雌二醇E2的定量测定试剂盒，其特征在于，该试剂盒包含E2磁分离试剂，酶反应物，反应增强剂，稀释液，E2校准品、E2质控品，清洗液浓缩液以及底物溶液。本发明还公开了该试剂盒的制备方法。本发明试剂盒将化学发光技术与免疫磁微粒相结合，提供了一种接近均相的反应体系，与现有技术相比，本发明试剂盒具有更高的检测灵敏度和特异性，并达到了较佳的性能参数，并且大大降低了产品成本。

| 试剂 | 1000ml用量 | 试剂级别 |
|-------------|----------|------|
| TRIS | 4.58g | 分析纯 |
| NaCl | 6.81g | 分析纯 |
| TWEEN-20 | 0.96g | 分析纯 |
| Proclin-300 | 0.2ml | / |