

(19)日本国特許庁 ( J P )

(12) **公表特許公報** ( A ) (11)特許出願公表番号

**特表2003 - 510050**

(P2003 - 510050A)

(43)公表日 平成15年3月18日(2003.3.18)

(51) Int. Cl <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-マ-コード* (参考)
C 1 2 N 15/09	ZNA	A 6 1 K 35/76	2 G 0 4 5
A 6 1 K 35/76		39/00	H 4 B 0 2 4
38/00		39/118	4 B 0 6 3
39/00		39/395	D 4 B 0 6 4
39/118			N 4 B 0 6 5

審査請求 未請求 予備審査請求 (全 87数) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001 - 525362(P2001 - 525362)

(86) (22)出願日 平成12年9月15日(2000.9.15)

(85)翻訳文提出日 平成14年3月20日(2002.3.20)

(86)国際出願番号 PCT/CA00/01088

(87)国際公開番号 W001/021804

(87)国際公開日 平成13年3月29日(2001.3.29)

(31)優先権主張番号 60/154,652

(32)優先日 平成11年9月20日(1999.9.20)

(33)優先権主張国 米国(US)

(71)出願人 アベンティス、パストゥール、リミテッド  
AVENTIS PASTEUR LI  
M I T E D

カナダ国オンタリオ州、トロント、ステイ  
ーレス、アベニュー、ウェスト、1755

(72)発明者 アンドリュ-、ディー、マーディン  
カナダ国オンタリオ州、リッチモンド、ヒ  
ル、フォレスト、ヒル、ドライブ、11

(72)発明者 レイモンド、ピー、オーメン  
カナダ国オンタリオ州、オーロラ、ケネデ  
ィ-、ストリート、ダブリュー、29

(74)代理人 弁理士 吉武 賢次 (外4名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 クラミジア抗原および対応するDNA断片ならびにその使用

(57)【要約】

本発明は、クラミジア、特に肺炎クラミジア株の感染によって引き起こされる疾病に対してヒトをはじめとする宿主の核酸 (DNAを含む) 感作法であって、肺炎クラミジア系統のOMP (外膜タンパク質) 遺伝子をコードするヌクレオチド配列を含むベクターおよび宿主においてOMP (外膜タンパク質) を発現させるプロモターを用いる方法を提供する。本発明の範囲内で改変も可能である。

**【特許請求の範囲】****【請求項1】**

(a) 配列番号2、

(b) (a)のポリペプチド由来の少なくとも12個の連続するアミノ酸を含んでなる免疫原性断片、および

(c) 免疫原性を失わずに改変された(a)または(b)のポリペプチドであって、対応する(a)または(b)のポリペプチドとアミノ酸配列において少なくとも75%の同一性を有する、改変ポリペプチドのいずれかから選択されるポリペプチドをコードする核酸配列を含んでなる、核酸分子。

**【請求項2】**

(a) 配列番号1、

(b) 配列番号1によってコードされるポリペプチドをコードする配列、

(c) (a)および(b)の核酸配列のいずれか1つに由来する少なくとも38個の連続するヌクレオチドを含んでなる配列、および

(d) 配列番号1によってコードされるポリペプチドとアミノ酸配列において少なくとも75%の同一性を有するポリペプチドをコードする配列のいずれかから選択される核酸配列を含んでなる、核酸分子。

**【請求項3】**

請求項1または2に記載の核酸分子に対してアンチセンスである核酸配列を含んでなる、核酸分子。

**【請求項4】**

請求項1に記載の核酸分子によってコードされるポリペプチドと、第二のポリペプチドとを含んでなる融合タンパク質を、コードする核酸配列を含んでなる、核酸分子。

**【請求項5】**

第二のポリペプチドが異種シグナルペプチドである、請求項4に記載の核酸分子。

**【請求項6】**

第二のポリペプチドがアジュバント活性を有する、請求項4に記載の核酸分子

。

【請求項7】

1種以上の発現制御配列に作動可能に連結された、請求項1～6のいずれか一項に記載の核酸分子。

【請求項8】

ワクチンベクターと、

(i) 配列番号1、

(ii) 配列番号1によってコードされるポリペプチドをコードする核酸配列、

(iii) (i)および(ii)の核酸配列のいずれか一つに由来する少なくとも38個の連続するヌクレオチドを含んでなる、核酸配列、

(iv) 配列番号1によってコードされるポリペプチドとアミノ酸配列において少なくとも75%の同一性を有するポリペプチドをコードする、核酸配列、

(v) 配列が配列番号2で示されるポリペプチドをコードする、核酸配列、

(vi) 配列番号2に由来する少なくとも12個の連続するアミノ酸を含んでなる免疫原性断片をコードする核酸配列、および

(vii) (i)～(v)で定義されるポリペプチド、または免疫原性を失わずに改変された、(vi)で定義される免疫原性断片をコードする核酸配列であって、対応する(i)～(v)のポリペプチドまたは対応する(vi)の断片とアミノ酸配列において少なくとも75%の同一性を有する、改変ポリペプチドまたは断片のいずれかから選択される少なくとも一つの第一の核酸と

を含んでなる、ワクチンであって、

ここで、各々の第一の核酸は発現可能であり、

所望によりこの第一の核酸によって発現されるポリペプチドに対する免疫応答を増強する付加的なポリペプチドをコードし、かつそれを発現し得る第二の核酸を含んでなる、ワクチン。

【請求項9】

ワクチンベクターと、融合タンパク質をコードする少なくとも一つの第一の核酸配列とを含んでなるワクチンであって、

該融合タンパク質が、

(a)(i) 配列番号1によってコードされるポリペプチド、

(ii) 配列番号1に由来する少なくとも38個の連続するヌクレオチドを含んでなる核酸配列によってコードされるポリペプチド、

(iii) 配列番号1によってコードされるポリペプチドとアミノ酸配列において少なくとも75%の同一性を有するポリペプチド、

(iv) 配列が配列番号2で示されるポリペプチド、

(v) 配列番号2に由来する少なくとも12個の連続するアミノ酸を含んでなる免疫原性断片、および

(vi) (i)~(iv)で定義されるポリペプチド、または免疫原性を失わずに改変された、(v)で定義される免疫原性断片であって、対応する(i)~(iv)のポリペプチドまたは対応する(v)の断片とアミノ酸配列において少なくとも75%の同一性を有する、改変ポリペプチドまたは断片のいずれかから選択される第一のポリペプチドと、

(b) 第二のポリペプチドと

を含んでなり、

ここで、各々の第一の核酸は発現可能であり、

所望によりこの第一のポリペプチドに対する免疫応答を増強する付加的なポリペプチドをコードし、かつそれを発現し得る第二の核酸を含んでなる、ワクチン。

【請求項10】

第二のポリペプチドが異種シグナルペプチドである、請求項9に記載のワクチン。

【請求項11】

第二のポリペプチドがアジュバント活性を有する、請求項9に記載のワクチン。

【請求項12】

各々の第一の核酸が1種以上の発現制御配列に作動可能に連結された、請求項8~11のいずれか一項に記載のワクチン。

**【請求項13】**

請求項1、2、および4～7のいずれか一項に記載の少なくとも一つの第一の核酸と、ワクチンベクターとを含んでなるワクチンであって、

ここで、各々の第一の核酸はポリペプチドとして発現し、

所望によりこの第一の核酸によって発現されるポリペプチドに対する免疫応答を増強する付加的なポリペプチドをコードする第二の核酸を含んでなる、ワクチン。

**【請求項14】**

第二の核酸が付加的なクラミジアポリペプチドをコードしている、請求項8～13のいずれか一項に記載のワクチン。

**【請求項15】**

請求項1～7のいずれか一項に記載の核酸と、医薬上許容される担体とを含んでなる、医薬組成物。

**【請求項16】**

請求項8～14のいずれか一項に記載のワクチンと、医薬上許容される担体とを含んでなる、医薬組成物。

**【請求項17】**

請求項7に記載の核酸分子で形質転換された、単細胞宿主。

**【請求項18】**

ストリンジェント条件下で、配列番号1の核酸分子と、またはその核酸分子の相補もしくはアンチセンス配列とハイブリダイズする5～100個のヌクレオチドからなる、単離された核酸プローブ。

**【請求項19】**

ストリンジェント条件下で、配列番号1の核酸分子、またはその核酸分子の相補もしくはアンチセンス配列とハイブリダイズする10～40個のヌクレオチドからなる、単離されたプライマー。

**【請求項20】**

請求項1、2、および4～7のいずれか一項に記載の核酸配列によってコードされている、ポリペプチド。

**【請求項 2 1】**

( a ) 配列番号 2、

( b ) ( a ) のポリペプチドに由来する少なくとも 1 2 個の連続するアミノ酸を含んでなる免疫原性断片、および

( c ) 免疫原性を失わずに改変された ( a ) または ( b ) のポリペプチドであって、対応する ( a ) または ( b ) のポリペプチドとアミノ酸配列において少なくとも 7 5 % の同一性を有する、改変ポリペプチド

のいずれかから選択されるアミノ酸配列を含んでなる、ポリペプチド。

**【請求項 2 2】**

請求項 2 0 または 2 1 のポリペプチドと、第二のポリペプチドとを含んでなる、融合タンパク質。

**【請求項 2 3】**

第二のポリペプチドが異種シグナルペプチドである、請求項 2 2 に記載の融合タンパク質。

**【請求項 2 4】**

第二のポリペプチドがアジュバント活性を有する、請求項 2 2 に記載の融合タンパク質。

**【請求項 2 5】**

請求項 2 0 または 2 1 に記載のポリペプチド、または請求項 2 2 ~ 2 4 のいずれか一項に記載の融合タンパク質を生産する方法であって、

請求項 1 7 に記載の単細胞宿主を培養する工程を含んでなる、方法。

**【請求項 2 6】**

請求項 2 0 または 2 1 に記載のポリペプチド、または請求項 2 2 ~ 2 4 のいずれか一項に記載の融合タンパク質に対する、抗体。

**【請求項 2 7】**

( i ) 配列番号 1 によってコードされるポリペプチド、

( ii ) 配列番号 1 に由来する少なくとも 3 8 個の連続するヌクレオチドを含んでなる核酸配列によってコードされるポリペプチド、

( iii ) 配列番号 1 によってコードされるポリペプチドとアミノ酸配列におい

て少なくとも75%の同一性を有するポリペプチド、

(iv) その配列が配列番号2で示されるポリペプチド、

(v) 配列番号2に由来する少なくとも12個の連続するアミノ酸を含んでなる免疫原性断片、および

(vi) (i)~(iv)で定義されるポリペプチド、または免疫原性を失わずに改変された、(v)で定義される免疫原性断片であって、対応する(i)~(iv)のポリペプチドまたは対応する(v)の断片とアミノ酸配列において少なくとも75%の同一性を有する、改変ポリペプチドまたは断片

のいずれかから選択される少なくとも一つ第一のポリペプチドを含んでなるワクチンであって、

所望によりこの第一のポリペプチドに対する免疫応答を増強する付加的なポリペプチドを含んでなる、ワクチン。

【請求項28】

少なくとも一つの融合タンパク質を含んでなるワクチンであって、

該融合タンパク質が、

(a) (i) 配列番号1によってコードされるポリペプチド、

(ii) 配列番号1に由来する少なくとも38個の連続するヌクレオチドを含んでなる核酸配列によってコードされるポリペプチド、

(iii) 配列番号1によってコードされるポリペプチドとアミノ酸配列において少なくとも75%の同一性を有するポリペプチド、

(iv) 配列が配列番号2で示されるポリペプチド、

(v) 配列番号2に由来する少なくとも12個の連続するアミノ酸を含んでなる免疫原性断片、および

(vi) (i)~(iv)で定義されるポリペプチド、または免疫原性を失わずに改変された、(v)で定義される免疫原性断片であって、対応する(i)~(iv)のポリペプチドまたは対応する(v)の断片とアミノ酸配列において少なくとも75%の同一性を有する、改変ポリペプチドまたは断片

のいずれかから選択される第一のポリペプチドと、

(b) 第二のポリペプチドと

を含んでなり、

所望によりこの第一のポリペプチドに対する免疫応答を増強する付加的なポリペプチドを含んでなる、ワクチン。

【請求項29】

第二のポリペプチドが異種シグナルペプチドである、請求項28に記載のワクチン。

【請求項30】

第二のポリペプチドがアジュバント活性を有する、請求項28に記載のワクチン。

【請求項31】

請求項20～24のいずれか一項に記載の少なくとも一つの第一のポリペプチドと、所望によりこの第一のポリペプチドに対する免疫応答を増強する付加的なポリペプチドとを含んでなる、ワクチン。

【請求項32】

付加的なポリペプチドがクラミジアポリペプチドを含んでなる、請求項27～31のいずれか一項に記載のワクチン。

【請求項33】

請求項20～24のいずれか一項に記載のポリペプチドと、医薬上許容される担体とを含んでなる、医薬組成物。

【請求項34】

請求項27～32のいずれか一項に記載のワクチンと、医薬上許容される担体とを含んでなる、医薬組成物。

【請求項35】

請求項26に記載の抗体と、医薬上許容される担体とを含んでなる、医薬組成物。

【請求項36】

- (a) 請求項1～7のいずれか一項に記載の核酸、
- (b) 請求項8～14および27～32のいずれか一項に記載のワクチン、
- (c) 請求項15、16および33～35のいずれか一項に記載の医薬組成物

、  
(d) 請求項20もしくは21に記載のポリペプチド、または請求項22～24のいずれか一項に記載の融合タンパク質、または

(e) 請求項26に記載の抗体を用いて、クラミジア感染症を予防または治療する方法。

【請求項37】

(a) 請求項1～7のいずれか一項に記載の核酸、

(b) 請求項20もしくは21に記載のポリペプチド、または請求項22～24のいずれか一項に記載の融合タンパク質、および

(c) 請求項26に記載の抗体

のいずれか1つから選択される成分を用いて、試験される哺乳類の体液をアッセイする工程を含んでなる、クラミジア感染症の検出方法。

【請求項38】

使用説明書と、

(a) 請求項1～7のいずれか一項に記載の核酸、

(b) 請求項20もしくは21に記載のポリペプチド、または請求項22～24のいずれか一項に記載の融合タンパク質、および

(c) 請求項26に記載の抗体

のいずれか1つから選択される成分と

を含んでなる、診断キット。

【請求項39】

予めポリペプチドで免疫化した哺乳類におけるクラミジア感染を予防またはその重篤度を軽減するのに有効な免疫応答を誘導する、請求項20または21に記載のポリペプチド、または請求項22～24のいずれか一項に記載の融合タンパク質を同定する方法であって、

(a) マウスをそのポリペプチドまたは融合タンパク質で免疫化し、さらに

(b) 免疫化したマウスにクラミジアを接種し、

ここで、免疫化されていない対照マウスに比べて、免疫化したマウスで、クラミジア感染の感受性が予防されたまたはその重篤度が軽減したポリペプチドまたは

融合タンパク質を同定することを含んでなる、方法。

【請求項40】

図3で示される、発現プラスミドpCAMG002。

【請求項41】

配列番号3または4の、核酸分子。

【請求項42】

クラミジア由来の約62kDaの、単離された外膜タンパク質。

【請求項43】

肺炎クラミジア由来の約62kDaの、単離された外膜タンパク質。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

## 【発明の背景】

## 発明の分野

本発明はヒトなどの哺乳類におけるクラミジア感染症の予防および治療に使用できるクラミジア(*Chlamydia*)OMP (外膜タンパク質(outer membrane protein))抗原および対応するDNA分子に関する。

## 【0002】

## 背景技術

クラミジアは原核生物である。それらは、リポ多糖および大腸菌(*E coli*)で見られるタンパク質と構造的および機能的に類似するいくつかの膜タンパク質を含む三層の外膜をはじめ、グラム陰性菌との形態的および構造的類似性を示す。それらは、代謝上不活性であるが感染力のある細胞外段階と、複製はするが感染力のない細胞内段階からなる独自の二相性生活環を有する偏性細胞内寄生体である。生活環の複製段階は感染した宿主細胞の細胞質からこの細菌を隔離する膜に結合した封入体内で起こる。

## 【0003】

肺炎クラミジア(*C.pneumonia*)は一般的なヒト病原体で、初めにオウム病クラミジア(*Chlamydia psittaci*)のTWAR株として記載されていたが、その後は新種であると認識されている。肺炎クラミジアは他のクラミジア種(トラコーマクラミジア(*C. trachomatis*)、*C.ペコラム*(*C. pecorum*)およびオウム病クラミジアとは抗原的、遺伝的および形態的に異なっている。それはトラコーマクラミジアまたはオウム病クラミジアといずれかとDNA配列において10%以下の相同性しか示さない。

## 【0004】

*C.ニューモニア*はコミュニティ獲得性の肺炎の一般的な原因であり、肺炎球菌(*Streptococcus pneumoniae*)および肺炎マイコプラズマ(*Mycoplasma pneumoniae*)よりもわずかに低い頻度である(Grayston et al. (1995) *Journal of Infectious Diseases* 168:1231; Campos et al. (1995) *Investigation of Ophthalmolo*

gy and Visual Science 36:1477)。それはまた気管支炎および副鼻腔炎をはじめとする上気道症状および疾患を引き起こす(Grayston et al. (1990) Journal of Infectious Diseases 168:1231; Grayston et al (1990) Journal of Infectious Diseases 161:618; Marrie (1993) Clinical Infectious Diseases, 18:501; Wang et al (1986) Chlamydial infectious, Cambridge University Press, Cambridge, p.329)。大部分の成人集団(60%を超える)は肺炎クラミジアに対する抗体を持っており(Wang et al (1986) Chlamydial infection, Cambridge University Press, Cambridge, p.329)、これはまだ認識されていないか、または無症候性である過去の感染を示している。

#### 【0005】

肺炎クラミジア感染は通常には急性呼吸器系疾患(すなわち、咳、咽頭炎、嘔声、および発熱;聴診での異常な胸部音)として示される。ほとんどの患者では咳が2~6週間持続し、回復が遅い。このようなケースの約10%で、上気道感染の後に気管支炎または肺炎が起こる。さらに肺炎クラミジア流行の際には、次にこれらの肺炎患者の約半数、特に虚弱者や高齢者で肺炎球菌の同時感染が認められた。上記で示されたように、肺炎クラミジア感染が呼吸器系感染以外の疾患にも関連するさらに多くの証拠がある。

#### 【0006】

この生物の貯蔵庫はおそらくヒトである。オウム病クラミジアとは対照的に、鳥類または動物の貯蔵庫は知られていない。伝染については明らかには定義されていない。それは分泌物との直接的な接触、媒介物、または風媒拡散によると考えられる。長い潜伏期間があり、それは何ヶ月も持続する。流行の分析に基づけば、感染者はその生物の効率の悪い媒介者であるので、肺炎クラミジアはある集団にゆっくり拡散すると考えられる(患者から患者の間隔は平均30日)。肺炎クラミジア罹病率は普遍的である。小児期に最初に感染した後、成人期に再感染が起こる。肺炎クラミジアは、2~3年持続する高い発病率(流行病)間隔を重ね合わせると著しくは世界中の伝染病であると考えられる。トラコーマクラミジア感染は肺炎クラミジアに対する交差免疫を付与しない。感染症は経口抗生物質テトラサイクリンまたはエリスロマイシン(2g/d、少なくとも10~14日

間)で容易に治療される。最近開発された薬剤アジスロマイジンはクラミジア感染症に対して単回投与として極めて有効である。

#### 【0007】

ほとんどの場合、肺炎クラミジア感染は軽いことが多く、合併症もなく、感染症の90%までは亜急性であるか、認識されない。工業国の小児の間では感染は5才まではまれであると考えられていたが、最近の研究(E Normann et al, *Chlamydia pneumoniae in children with acute respiratory tract infections, Acta Paediatrica*, 1998, Vol 87, Iss 1, pp 23-27)では、この世代の子供の多くは血清反応陰性であるにもかかわらず感染のPCR証拠を示し、2~4才の17~19%有病率と見積もられることが報告されている。発展途上国では、幼児の間の肺炎クラミジア抗体の血清有病率は上昇し、肺炎クラミジアは急性下気道疾患、ならびに世界の熱帯地方の幼児および小児の死亡率の重要な原因であり得ると疑われる。

#### 【0008】

血清有病率の研究および地方の流行病の研究によれば、肺炎クラミジアの一次感染は通常、5才から20才の間で起こる。米国では例えば、肺炎クラミジアによって引き起こされる毎年の小児肺炎の30,000症例であると見積もられる。感染は小児または若年(例えば、学生や徴兵)群の中で集団発生する。

#### 【0009】

肺炎クラミジアはコミュニティ獲得性の下気道感染症の10~25%を起こす(スウェーデン、イタリア、フィンランドおよび米国から報告)。流行中、肺炎クラミジアは感染は肺炎の症例の50~60%にのぼると考えられる。このような期間にはまた、さらに肺炎球菌による混合感染があることが報告されている。

#### 【0010】

成人期の再感染もよくあり、臨床徴候はより軽い傾向にある。集団血清有病率の研究に基づけば、年齢とともに曝露が増す傾向にあり、これは特にヒトにおいて明らかである。何人かの研究者が、持続性、無症候性の肺炎クラミジア感染状態がよくあることであると推測している。

#### 【0011】

中年または高年者では、肺炎クラミジア感染は慢性気管支炎および副鼻腔炎へと進行する可能性がある。米国での研究は、60才より若い人において肺炎クラミジアによって引き起こされた発病率は年間1,000人につき1症例であるが、若年層では発病率は3倍に上昇していたことを明らかにした。肺炎クラミジア感染は病床中にある患者を除いては入院につながることはまれである。

#### 【0012】

極めて重要なのは、アテローム性動脈硬化症と肺炎クラミジア感染との関連である。従来の肺炎クラミジア感染と心臓発作、冠動脈疾患および頸動脈疾患との関係を示すいくつかの疫学研究がある(Saikku et al. (1988) *Lancet*; ii:983; Thom et al. (1992) *JAMA* 268:68; Linnanmaki et al. (1993), *Circulation* 87:1030; Saikku et al. (1992) *Annals Internal Medicine* 116:273; Melnick et al (1993) *American Journal of Medicine* 95:499)。さらに、この微生物は冠動脈、頸動脈、末梢動脈および大動脈のアテロームおよび脂肪索で検出されている(Shor et al. (1992) *South African Medical Journal* 82:158; Kuo et al. (1993) *Journal of Infectious Diseases* 167:841; Kuo et al. (1993) *Arteriosclerosis and Thrombosis* 13:1500; Campbell et al (1995) *Journal of Infectious Diseases* 172:585; Chiu et al. *Circulation*, 1997 (In Press))。種々の肺炎クラミジアは冠動脈および頸動脈から回収されている(Ramirez et al (1996) *Annals of Internal Medicine* 125:979; Jackson et al. Abst. K121, p272, 36<sup>th</sup> ICAAC, 15-18 Sept. 1996, New Orleans)。さらに肺炎クラミジアはウサギモデルにおけるアテローム性動脈硬化症の変化を誘導することが示されている(Fong et al (1997) *Journal of Clinical Microbiology* 35:48)。考え併せるとこれらの結果は、クラミジア性のアテローム性動脈硬化症の疫学的重要性は依然証明されてはいないが、肺炎クラミジアがヒトにおいてアテローム性動脈硬化症を引き起こし得るという高い可能性があることを示している。

#### 【0013】

いくつかの最近の研究はまた、肺炎クラミジア感染と喘息との間の関連も示している。感染は喘鳴性の喘息性気管支炎、成人発症喘息および成人における喘息の急性再燃に結びつけられており、小規模研究では何人かで長期抗生物質治療が

効果的にゆっくりと疾病の重篤度を軽減することが示されている(Hahn DL, et al. Evidence for Chlamydia pneumoniae infection in steroid-dependent asthma. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 1998 Jan; 80(1): 45-49; Hahn DL, et al. Association of Chlamydia pneumoniae IgA antibodies with recently symptomatic asthma. *Epidemiol Infect.* 1996 Dec; 117(3): 513-517; Bjornsson E, et al. Serology of chlamydia in relation to asthma and bronchial hyperresponsiveness. *Scand J Infect Dis.* 1996; 28(1): 63-69; Hahn DL. Treatment of Chlamydia pneumoniae infection in adult asthma: a before-after trial. *J Fam Pract.* 1995 Oct; 41(4): 345-351; Allegra L, et al. Acute exacerbations of asthma in adults: role of Chlamydia pneumoniae infection. *Eur Respir J.* 1994 Dec; 7(12): 2165-2168; Hahn DL, et al. Association of Chlamydia pneumoniae (strain TWAR) infection with wheezing, asthmatic bronchitis, and adult-onset asthma. *JAMA.* 1991 Jul 10; 266(2): 225-230)。

#### 【0014】

これらの結果に照らして、肺炎クラミジア感染に対する防御ワクチンが極めて重要であると考えられる。いずれのヒトクラミジア感染にも有用なワクチンはまだない。有効なワクチンは物理的または化学的に不活化したクラミジアを用いて開発できると考えられる。しかしながらかかるワクチンは高い安全域がない。一般に、安全なワクチンはその微生物の遺伝子操作のよって弱毒化するか、または組換えによって作出される。従って、ヒトクラミジア感染に対する有効かつ安全なワクチンを作成する主な障壁は、クラミジア、特に肺炎クラミジアに関する遺伝情報が不十分であることであった。

#### 【0015】

肺炎クラミジアおよびオウム病クラミジアを用いた研究では、クラミジアに対する安全かつ有効なワクチンが達成可能な目標であることを示している。例えば、トラコーマクラミジアの肺感染から回復したマウスはその後の膣攻撃によって誘導される不妊症から保護される(Pal et al. (1996) *Infection and Immunity.* 64:5341)。同様に、不活化したオウム病クラミジアで免疫化したヒツジはその

後のクラミジア誘発性の流産および死産から保護された(Jones et al. (1995) *Vaccine* 13:715)。クラミジア感染症からの保護はTh1免疫応答、特にINFg (CD4 + T細胞を産生する)の誘導と関連づけられている(Igietsemes et al. (1993) *Immunology* 5:317)。CD4 + 細胞系統またはクローンの、ヌードマウスまたはSCIDマウスへの養子移入は攻撃または明らかな慢性疾患からの防御を付与し(Igietseme et al (1993) *Regional Immunology* 5:317; Magee et al (1993) *Regional Immunology* 5: 305)、またCD4 + T細胞のin vivo涸渇は攻撃後の疾病を悪化させた(Lander et al. (1991) *Infection & Immunity* 59:3774; Magee et al (1995) *Infection & Immunity* 63:516)。しかしながら、粘膜表面の十分高力価の中和抗体の存在も保護作用を発揮し得る(Cotter et al. (1995) *Infection and Immunity* 63:4704)。

#### 【0016】

肺炎クラミジア種内の抗原のバリエーションは遺伝情報が不十分であるために十分記載されていないが、バリエーションはトラコーマクラミジアに基づいて存在しているものと予測される。トラコーマクラミジアの血清学的亜型は主要外膜タンパク質(MOMP)における抗原バリエーションに基づいて定義されているが、公表されている肺炎クラミジアMOMP遺伝子配列はこの微生物のいくつかの異なる単離物の間ではダリエーションを示していない(Campbell et al (1990) *Infection and Immunity* 58:93; McCafferty et al (1995) *Infection and Immunity* 63:2387-9; Gaydos et al. *Infection and Immunity*. (1992) 60(12):5319-5323)。76kDaの抗原をコードする遺伝子は肺炎クラミジアのただ単一株からクローニングされたものであり、その配列は公開されている(Perez Melgosa et al., *Infect. Immun.* 1994. 62:880)。9kDaおよび60kDaのシステイン(cysteine)豊富な外膜タンパク質遺伝子を含むオペロンが記載されている(Watson et al., *Nucleic Acids Res* (1990) 18:5299; Watson et al., *Microbiology* (1995) 141:2489)。肺炎クラミジアに対する免疫血清によって認識される多くの抗原は総てのクラミジア間で保存されているが、98kDa、76kDaおよび他のいくつかのタンパク質は肺炎クラミジア特異的である可能性がある(Perz Melgosa et al., *Infect. Immun.* 1994. 62:880; Melgosa et al., *FEMS Mic*

robiol Lett (1993) 112:119; Campbell et al., J Clin Microbiol (1994) 32: 583)。肺炎クラミジア血清型の数および相対頻度の評価、ならびに抗原の定義はまだ可能ではない。肺炎クラミジアCWL - 029株の全ゲノム配列はすでに知られており(<http://chlamydia-www.berkeley.edu:4231/>)、さらなる配列が入手できるので、抗原バリエーションのよりよい理解が得られる。

#### 【0017】

肺炎クラミジアに対して血清を免疫化することによって認識される多くの抗原は総てのクラミジアにわたって保存されているが、98 kDa、76 kDaおよび54 kDaタンパク質は肺炎クラミジア特異的であると思われる(Campos et al. (1995) Investigation of Ophthalmology and Visual Science 36: 1477; Marrie (1993) Clinical Infectious Diseases, 18:501; Wiedmann-Al-Ahmad M, et al. Reactions of polyclonal and neutralizing anti-p54 monoclonal antibodies with an isolated, species-specific 54-kilodalton protein of Chlamydia pneumoniae, Clin Diagn Lab Immunol. 1997 Nov; 4(6): 700-704)。患者由来の血清による単離物の免疫プロットは、単離物間でプロットパターンにバリエーションがあることを示し、血清型肺炎クラミジアが存在し得ること示している(Grayston et al. (1995) Journal of Infectious Diseases 168:1231; Ramirez et al. (1996) Annals of Internal Medicine 125:979)。しかしながらこの結果は、患者の血清の免疫プロットプロファイルが感染後経時的に変化するので、患者の感染状態によって混乱しているかもしれない。血清型の数および相対頻度の評価、ならびに抗原の定義は依然として可能ではない。

#### 【0018】

従って、クラミジア感染を予防および治療するのに用いられる治療する肺炎クラミジアのポリヌクレオチド配列を同定および単離する必要がある。

#### 【0019】

##### 【発明の概要】

本発明は、クラミジア感染を予防、治療または診断する方法に使用できる、クラミジアポリペプチドOMP（外膜タンパク質）(配列番号1)をコードする精製および単離されたポリヌクレオチド分子を提供する。本発明の一つの形態では、

ポリヌクレオチド分子は配列番号2のポリペプチドをコードするDNAである。

【0020】

本発明のもう一つの形態は単離されたDNA分子に対応するポリペプチドを提供する。対応するコードペプチドのアミノ酸配列は配列番号2で示されている。

【0021】

当業者ならば、クラミジアOMP（外膜タンパク質）タンパク質をコードするポリヌクレオチド配列を提供する限り、本発明はまたかかるポリペプチドに由来する断片をコードするポリヌクレオチドを提供することが分かるであろう。さらに、本発明は、本明細書に記載の非必須アミノ酸の付加、欠失または置換によって生じるかかるペプチドおよびそれらに由来する断片の変異体および誘導体、ならびにを提供するものと理解される。当業者ならば、本発明はクラミジアポリペプチドをコードするポリヌクレオチド配列が提供される限り、さらにかかるポリペプチドと特異的に結合する単一特異性抗体を提供することが容易に分かるであろう。

【0022】

本発明は広い応用を有し、発現カセット、ベクターおよび本発明のポリヌクレオチドで形質転換またはトランスフェクトされた細胞を含む。従って、本発明はさらに（i）組換え宿主系において本発明のポリペプチドを製造する方法、ならびに関連の発現カセット、ベクター、および形質転換またはトランスフェクト細胞；（ii）希釈剤または担体と組み合わせた、本発明のポリヌクレオチドを含有するワクチン、またはポックスウイルス、ネズミチフス菌(*Salmonella typhimurium*)またはコレラ菌(*Vibrio cholerae*)ベクターなどの生ワクチン（かかるワクチンおよびワクチンベクターは、例えばクラミジア感染を予防および治療するのに有用である）、ならびに関連の医薬組成物および関連の治療および/または予防方法；（iii）裸の形態もしくは送達ビヒクルと配合した本発明のRNAまたはDNA分子、本発明のポリペプチドもしくはポリペプチドの組合せ、または単一特異性抗体、ならびに関連の医薬組成物の治療的および/または予防的使用；（iv）DNAまたはRNA分子、単一特異性抗体、または本発明のポリペプチドの使用を含み得る、生物学的サンプルにおけるクラミジアの存在の診断方法；

および(v)抗体に基づくアフィニティークロマトグラフィーによる本発明のポリペプチドの精製方法を提供する。

#### 【0023】

##### 【発明の具体的説明】

肺炎クラミジアゲノムからクラミジアOMP(外膜タンパク質)をコードするオープンリーディングフレーム(ORF)が同定されている。このタンパク質をコードする遺伝子は発現プラスミドに挿入されているが、これはクラミジア感染に対する免疫防御を与えることが分かっている。従ってこのOMP(外膜タンパク質)および関連のポリペプチドを用いてクラミジア感染を予防および治療することができる。

#### 【0024】

本発明の第一の態様によれば、クラミジアポリペプチドをコードする単離ポリヌクレオチドが提供され、そのアミノ酸配列は配列番号2に示されている。

#### 【0025】

「単離されたポリヌクレオチド」とは、天然に存在する環境から取り出されたポリヌクレオチドと定義される。例えば生細菌のゲノム中、または遺伝子バンクの一部として存在する天然DNA分子は単離されないが、細菌ゲノムの残存部分から同分子は分離される、例えばクローニング(増幅)の結果として単離される。典型的には単離されたDNA分子は天然に存在するゲノムの5'または3'末端にすぐ隣接するDNA領域(例えばコドン領域)から遊離している。かかる単離ポリヌクレオチドはベクターまたは組成物の一部であってよいが、かかるベクターまたは組成物がかかるポリヌクレオチドの自然環境の一部ではないということから「単離された」と定義される。

#### 【0026】

本発明のポリヌクレオチドはRNAまたはDNA(cDNA、ゲノムDNAまたは合成DNA)のいずれか、またはその改変体、変異体、相同体もしくは断片である。DNAは二本鎖または一本鎖のいずれかであり、一本鎖であれば、コード鎖または非コード(アンチセンス)鎖のいずれかである。配列番号1で示される本発明のポリペプチドをコードする配列のいずれか1つが、(a)コード配列、(

b) (a)の転写により誘導されるリボヌクレオチド配列、または(c)遺伝子コードの重複または縮重により同じポリペプチドをコードするコード配列である。「ポリペプチド」または「タンパク質」とは、長さまたは翻訳後修飾(例えばグリコシル化またはリン酸化)にかかわらず、いずれのアミノ酸鎖をも意味する。本願では両用語を相互に使用してもよい。

#### 【0027】

本発明の第一の態様によれば、配列番号2と相同なアミノ酸配列が提供される。本明細書において使用される「相同アミノ酸配列」とは、臨界融解温度( $T_m$ )を超えない25~35において、配列番号1の核酸配列のいずれの部分ともハイブリダイズする核酸配列によって総てまたは一部がコードされるいずれかのポリペプチドである。相同アミノ酸配列は配列番号2で示されるアミノ酸配列と1つ以上の保存的アミノ酸置換に関して異なるものである。またかかる配列は血清型変異体(下記)ならびに免疫原性などのポリペプチド本来の特徴を維持する、欠失または挿入を含む配列も包含する。かかる配列は配列番号2と好ましくは少なくとも75%、さらに好ましくは80%、および最も好ましくは90%同一である。

#### 【0028】

相同アミノ酸配列には配列番号2と同一または実質的に同一の配列が挙げられる。「実質的に同一のアミノ酸配列」とは、参照アミノ酸配列と少なくとも90%、好ましくは95%、さらに好ましくは97%、および最も好ましくは99%同一であり、かつ好ましくは参照配列と大部分の保存的アミノ酸置換に関して異なる配列を意味する。

#### 【0029】

保存的アミノ酸置換は同種類のアミノ酸間の置換である。これらの種類には、例えばアスパラギン、グルタミン、セリン、トレオニン、およびチロシンのような非荷電極性側鎖を有するアミノ酸；リジン、アルギニン、およびヒスチジンのような塩基性側鎖を有するアミノ酸；アスパラギン酸、およびグルタミン酸のような酸性側鎖を有するアミノ酸；およびグリシン、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、プロリン、フェニルアラニン、メチオニン、トリプトファン、

およびシステインのような非極性側鎖を有するアミノ酸が挙げられる。

【0030】

相同性は、Genetics Computer Group, University of Wisconsin Biotechnology Center, 1710 University Avenue, Madison, WI 53705のSequence Analysis Software Packageのような配列解析ソフトウェアを用いて求められる。アミノ酸配列を同一性が最大となるように配列する。配列に人為的にギャップを挿入し適当な配列を得てもよい。ひと度最適なアライメントが設定されれば、全位置数に対し、両配列のアミノ酸が一致する位置を総て記録することにより相同性の程度が確認される。

【0031】

同様に相同ポリヌクレオチド配列も定義される。相同配列はコード配列配列番号1と好ましくは少なくとも45%、さらに好ましくは60%、および最も好ましくは85%同一のものである。

【0032】

本発明の第一の態様によれば、配列番号2と相同な配列を有するポリペプチドには、天然に存在する対立遺伝子変異体、ならびに配列番号2のポリペプチド本来の特徴を維持する変異体または天然には存在しないいずれの他の変異体も包含される。

【0033】

当技術分野では公知であるように、対立遺伝子変異体はポリペプチドの生物学的機能を変更しない、1つ以上のアミノ酸の置換、欠失または付加を有することを特徴とするポリペプチドのもう一つの形態である。「生物学的機能」とは、たとえその機能が細胞の増殖または生存に必要でなくとも、それが天然に存在する細胞におけるポリペプチドの機能を意味する。例えばポーリンの生物学的機能は細胞外媒質に存在する化合物を細胞へ侵入させることである。生物学的機能は抗原性特性とは性質が異なる。ポリペプチドは1以上の生物学的機能を有し得る。

【0034】

対立遺伝子変異体は本来極めて一般的なものである。例えば肺炎クラミジアなどの細菌種は通常対立遺伝子の小さな変化に関し互いに異なる種々の株で表され

る。実際、異なる株において同じ生物学的機能を果たすポリペプチドはそれぞれの株で同一でないアミノ酸配列（およびポリヌクレオチド配列）を有していてもよい。この変動にかかわらず、一般に多くの対立遺伝子変異体に対して向けられた免疫応答が実証されている。クラミジアMOMP抗原の研究では、株間のMOMPのアミノ酸配列の変化にかかわらず、雑種株抗体結合が起こるとともに感染力の中和がなされ、免疫原として用いた際に、MOMPがアミノ酸変化を許容することが示される。

#### 【0035】

相同ポリペプチドまたは対立遺伝子変異体をコードするポリヌクレオチドは、常法により抽出されたゲノム細菌DNAのポリメラーゼ鎖反応（PCR）増幅法によって回収される。これにはコードドメインの5'および3'末端の上流および下流に適合する合成オリゴヌクレオチドプライマーの使用が含まれる。好適なプライマーは配列番号1で提供されるヌクレオチド配列情報により設計される。その工程は次の通りである：10～40個、好ましくは15～25個のヌクレオチドからなるプライマーを選択する。効率的なハイブリダイゼーションを確実にするのに十分な比率でCおよびGを含有する、すなわちCおよびGヌクレオチド量が全ヌクレオチド含量の少なくとも40%、好ましくは50%である、プライマーを選択することが有利である。標準的なPCR反応は典型的には100 $\mu$ Lにつき0.5～5単位のTaqDNAポリメラーゼ、各20～200 $\mu$ Mのデオキシヌクレオチド（好ましくは同濃度）、全デオキシヌクレオチド濃度にわたって0.5～2.5mM、 $10^5$ ～ $10^6$ の標的分子、および約20Pmolの各プライマーを含む。PCRサイクル約25～50回を行い、アニーリング温度をプライマーの真のT<sub>m</sub>より15～5低い温度とする。よりストリンジェントなアニーリング温度にすると誤ってアニーリングしたプライマーの識別が向上し、プライマーの3'末端への誤ったヌクレオチドの組み込みが少なくなる。変性温度は95～97が典型であるが、G+C豊富な標的の変性についてはより高い温度が適当であろう。実施するサイクル数は最初の標的分子の濃度にもよるが、典型的には特異的でないバックグラウンド産物が集積する傾向にあるので、40サイクルを超えない方がよい。

## 【0036】

相同ポリペプチドまたは対立遺伝子変異体をコードするポリヌクレオチドを回収する別法としては、DNAまたはRNAライブラリーのハイブリダイゼーションスクリーニングによるものがある。ハイブリダイゼーション手順は当技術分野では十分に知られており、Ausubel et al., (Ausubel et al., Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley & Sons Inc., 1994), Silhavy et al. (Silhavy et al. Experiments with Gene Fusions, Cold Spring harbor Laboratory Press, 1994)、およびDavis et al. (Davis et al. A Manual for Genetic Engineering: Advanced Bacterial Genetics, Cold Spring harbor Laboratory Press, 1980)に記載されている。ハイブリダイゼーション条件を至適化する重要なパラメーターは、その温度を超えると2本の相補DNA鎖が互いに分離する臨界融解温度を得るのに用いる式で表される(Casey & Davidson, Nucl. Acid Res. (1977) 4:1539)。約600個以上のヌクレオチドでなるポリヌクレオチドの場合、この式は次の通りである：

$T_m = 81.5 + 0.41x(\%G+C) + 16.6\log(\text{陽イオン濃度}) - 0.63x(\% \text{ホルムアミド}) - 600 / \text{塩基数}$ 。

## 【0037】

好適なストリンジェント条件下では、ハイブリダイゼーション温度( $T_h$ )は約20～40、20～25、または好ましくは計算値 $T_m$ を超えない30～40である。最適温度および塩条件が容易に求め得ることは当業者には明らかであろう。

## 【0038】

本発明のポリヌクレオチドに関しては(i)42で4～16時間以内、6×50%ホルムアミド含有SSCにおける、または(ii)65で4～16時間以内、6×SSC水溶液(1M NaCl、0.1Mクエン酸ナトリウム(pH7.0))における、プレハイブリダイゼーションおよびハイブリダイズインキュベーション双方の間にストリンジェント条件に達する。

## 【0039】

典型的には、ハイブリダイゼーション実験は60～68、例えば65で行

われる。このような温度では、ストリンジェントなハイブリダイゼーション条件は $6 \times SSC$ 、好ましくは $2 \times SSC$ または $1 \times SSC$ 、より好ましくは $0.5 \times SSC$ 、 $0.3 \times SSC$ または $0.1 \times SSC$ （ホルムアミドの不在下）行うことができる。 $1 \times SSC$ は $0.15 M NaCl$ および $0.015 M$ クエン酸ナトリウムを含む。

#### 【0040】

天然には存在しない有用な相同体およびその断片は、アミノ酸配列変化および/または欠失を許容すると思われる抗原の領域を同定する公知の方法を用いて設計される。例として、異なる種由来の相同ポリペプチドを比較し、保存された配列を同定することを挙げる。さらに分岐した配列が最も配列変化を許容すると考えられる。配列間の相同性は例えばAltschul et al., *Nucleic Acids Res.*;25:3389-3402 (1997)のBLAST相同性検索アルゴリズムを用いて解析すればよい。あるいは、コンピューターによって支援される可能性のあるTまたはB細胞エピトープの解析に基づいて配列がTおよび/またはB細胞とより高い反応性を有するように改変する。さらにもう1つの別法では、*in vitro*においてポリペプチド内のある特定のアミノ酸残基または配列を変異させ、次いでその変異ポリペプチドを、以下に概略を記した方法によりクラミジア感染症を予防または治療する能力についてスクリーニングする。

#### 【0041】

当業者ならば、本発明のスクリーニングプロセスに従うことによって配列番号2のある特定の相同体がクラミジア感染症の予防または治療に有用であるかを過度な実験を行うことなく求められることが容易に理解されるであろう。

#### 【0042】

スクリーニング手順は、  
動物、好ましくはマウスを試験相同体または断片により免疫化し、  
免疫化した動物にクラミジアを接種し、さらに  
クラミジアに対する感染防御を付与するそれらの相同体または断片を選択する  
工程を含んでなる。

#### 【0043】

「感染防御を付与する」とは、試験相同体または断片で免疫化していない対照動物と比べた場合に、クラミジア感染症のいずれかの影響の重篤度の軽減されることを意味する。

【0044】

本発明の第一の態様によれば、配列番号2の部分配列、配列番号2と相同なポリペプチド配列の部分配列、内部欠失により全長ポリペプチドから誘導されたポリペプチド、および融合タンパク質であるポリペプチド誘導体が提供される。

【0045】

タンパク質に対する免疫応答を誘導するのに必要とされるものは総てタンパク質の小さな(例えば8~10個のアミノ酸)免疫原性領域であるため、ワクチンとしてタンパク質免疫原の断片および変異体を使用することは免疫学の分野では一般に認められた慣例である。クラミジア以外の病原体の表面に曝された抗原に対応する種々の短い合成ペプチドがそれぞれの病原体、例えばネズミ乳癌ウイルスの11残基ペプチド(Casey & Davidson, Nucl. Acid Res. (1977) 4:1539)、セムリキ森林ウイルスの16残基ペプチド(Snijders et al., 1991. J.Gen.Virol. 72:557-565)、およびイヌパルボウイルス由来の15残基各々の2つの重複ペプチド(Langeveld et al., Vaccine 12(15):1473-1480,1994)に対する有効なワクチン抗原であることが分かっている。

【0046】

従って本記載により、配列番号2の部分配列またはその相同アミノ酸配列が全長配列固有のものであり、本発明により教示されることは当業者には容易に理解されるであろう。かかるポリペプチド断片の長さは少なくとも12個のアミノ酸であることが好ましい。それらの長さが少なくとも20個のアミノ酸、好ましくは少なくとも50個のアミノ酸、さらに好ましくは少なくとも75個のアミノ酸、およびさらに好ましくは少なくとも100個のアミノ酸であることが有利である。

【0047】

配列番号2と相同な配列の部分配列をコードする30~600個のヌクレオチドからなるポリヌクレオチドは、以下に概略を記したパラメーターを用い、かつ

増幅される断片の5'および3'末端の上流および下流の配列に適合するプライマーを使用するPCR増幅法により回収される。かかる増幅物の鋳型ポリヌクレオチドは配列番号1と相同な全長ポリヌクレオチド、またはDNAまたはRNAライブラリーなどのポリヌクレオチド混合物に含まれるポリヌクレオチドのいずれかである。部分配列を回収する別法としては、上記の条件下においてT<sub>m</sub>の計算式を用いてスクリーニングハイブリダイゼーションを行う。30~600個のヌクレオチドからなる断片を回収する場合、計算値T<sub>m</sub>を減法(600/塩基対のポリヌクレオチドサイズ)により補正し、ストリンジェント条件をT<sub>m</sub>を超えない5~10°Cであるハイブリダイゼーション温度で定義する。20~30塩基より短いオリゴヌクレオチドを得る場合、T<sub>m</sub>の計算式は次の通りである:  $T_m = 4 \times (G + C) + 2 \times (A + T)$ 。例えば、50% C + Gの18個のヌクレオチド断片は約54°CのT<sub>m</sub>を有するであろう。配列番号2の断片またはその相同配列である短いペプチドは化学合成(E. Gross and H. J. Meinhofer, 4 The Peptides: Analysis, Synthesis, Biology; Modern Techniques of Peptide Synthesis, John Wiley & Sons (1981)、およびM. Bodanzki, Principles of Peptide Synthesis, Springer-Verlag (1984))により直接得られる。

#### 【0048】

有用なポリペプチド誘導体、例えばポリペプチド断片をアミノ酸配列のコンピューター支援解析を用いて設計する。これにより表面に曝された有望な抗原性領域が同定されよう(Hughs et al., 1992. Infect. Immun. 60(9):3497)。プログラムSEQSEE(Wishart DS, et al., "SEQSEE: タンパク質配列解析に適した総合プログラム" Comput Appl Biosci. 1994 Apr; 10 (2): 121-32)を使用する、産物の順応性および疎水性に基づく配列番号2にある6個のアミノ酸配列の解析では、有用な免疫原性断片および変異体を選択する基準として使用してもよい、可能性あるBおよびT細胞エピトープが明らかとなり得る。この解析では抗体により認識されると考えられる外面特徴の適当な組合せを使用する。HLA-A0201 MHCサブクラスの有望なT細胞エピトープがNIHで開発されたアプローチとエミュレートする、アルゴリズムにより明らかにすることができる(Parker KC, et al. "Peptide binding to MHC class I molecules: implicatio

ns for antigenic peptide prediction." Immunol Res 1995; 14 (1) 34-57)。

【0049】

感染防御T細胞依存性免疫応答を誘導するエピトープは、ポリペプチドの長さの範囲全体に存在する。しかしながら、いくつかのエピトープはポリペプチドの2次および3次構造によりマスクされる。かかるマスクされたエピトープを明らかにするため、大きな内部欠失を引き起こし、それによってもとのタンパク質構造の大部分を取り除いてマスクされたエピトープを露出させる。かかる内部欠失は時に株間の高変異性の免疫優性領域を取り去るといった付加的な利点をもたらす。

【0050】

ポリペプチド断片をコードするポリヌクレオチドおよび大きな内部欠失を有するおよびポリペプチドを常法により構築する(Ausubel et al., Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley & Sons Inc., 1994)。かかる方法には標準PCR、逆PCR、クローニングしたDNA分子の制限酵素処理、またはKunkel et al.(Kunkel et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1985) 82:448)の方法が挙げられる。これらの方法の成分およびその使用説明書はStratageneなどの様々な販売元から容易に入手可能である。ひと度欠失変異体を構築すれば、それらを上記のようにクラミジア感染症を予防または治療する能力について調べる。

【0051】

本明細書において使用される「融合ポリペプチド」は、他のいずれかのポリペプチドとNまたはC末端で融合した本発明のポリペプチドまたはポリペプチド誘導体を含むものである(以後ペプチドテールと記す)。かかる融合ペプチドを得る簡便な方法はポリヌクレオチド配列のインフレーム融合物、すなわちハイブリッド遺伝子の翻訳による。融合ポリペプチドをコードするハイブリッド遺伝子を発現ベクターに挿入し、それを用いて宿主細胞を形質転換またはトランスフェクトする。そうでなければ、ポリペプチドまたはポリペプチド誘導体をコードするポリヌクレオチド配列を、ペプチドテールをコードするポリヌクレオチドが既に存在する発現ベクターに挿入する。かかるベクターおよびその使用説明書は商業的に入手可能である、例えばペプチドテールがマルトース結合タンパク質

である、New England BiolabsのpMa1 - c2またはpMa1 - p2系、Pharmaciaのグルタチオン - S - トランスフェラーゼ系、またはNovagenから入手可能なHis - Tag系。これらおよび他の発現系により本発明のポリペプチドおよび誘導体のさらなる単離のための便宜な手段が提供される。

#### 【0052】

融合ポリペプチドの有利な例としては、本発明のポリペプチドまたは相同体もしくは断片と、コレラ毒素または大腸菌(E. coli)易熱性毒素のいずれかのサブユニットBのようなアジュバント活性を有するポリペプチドとを融合したものである。もう一つの有利な融合物はポリペプチド、相同体または断片と、強力なT細胞エピトープまたはB細胞エピトープとを融合したものである。かかるエピトープは当技術分野で公知のもの(例えば、B型肝炎コア抗原、D. R. Millich et al., "Antibody production to the nucleocapsid and envelope of the Hepatitis B virus primed by a single synthetic T cell site", Nature. 1987. 329: 547-549)、または、可能性のあるTまたはB細胞のコンピュータ補助分析に基づく本発明のもう一つのポリペプチドにおいて同定されたものであってよい。本発明のこの態様に従い、融合ポリペプチドは配列番号2、またはその相同体もしくは断片由来のTまたはB細胞エピトープを含んでなる(ここで、エピトープはそのポリペプチドまたは相同体もしくは断片の多様な変異体から誘導され、各々のエピトープはそのエピトープのポリペプチド内の位置および配列において他とは異なっている)。かかる融合物は全ポリペプチド、相同体または断片に対するTまたはB細胞応答を最適にするため、それはクラミジア感染症の予防および治療に有効である。

#### 【0053】

融合を達成するために、本発明のポリペプチドと、アジュバント活性を有するポリペプチドのN、または好ましくはC末端、またはTもしくはB細胞エピトープとを融合する。そうでなければ、本発明のポリペプチド断片をアジュバント活性を有するポリペプチドのアミノ酸配列内に挿入する。またTまたはB細胞エピトープを本発明のポリペプチドのアミノ酸配列内に挿入してもよい。

#### 【0054】

第一の態様によれば、本発明のポリヌクレオチドは異種シグナルペプチドを含む、本発明のポリペプチドへと成熟するハイブリッド前駆体ポリペプチドもコードする。「異種シグナルペプチド」とは、本発明のポリペプチドの天然に存在する前駆体には見られないシグナルペプチドを意味する。

#### 【0055】

RNA、DNA、または改変体もしくはその組合せを包含する本発明のポリヌクレオチド分子は多方面に適用される。DNA分子は例えば(i)組換え宿主系においてコードされたポリペプチドを生産するプロセスにおいて、(ii)クラミジア感染症を予防および/または治療する方法および組成物においてさらに用いられる、ポックスウイルスなどのワクチンベクターの構築において、(iii)裸の形態で、または送達ビヒクルと配合したワクチン薬剤として(RNA分子と同様)、および(iv)本発明のポリヌクレオチドを過剰発現できる、またはそれを無毒性、変異型で発現する弱毒クラミジア株の構築において用いられる。

#### 【0056】

従って、本発明の第二の態様は、(i)発現に必要なエレメントの制御下、特に適当なプロモーターの制御下に置かれた本発明のDNA分子を含有する発現カセット；(ii)本発明の発現カセットを含有する発現ベクター；(iii)本発明の発現カセットおよび/またはベクターで形質転換またはトランスフェクトした原核生物または真核生物細胞、ならびに(iv)本発明のDNA分子の発現を可能にする条件下において、本発明の発現カセットおよび/またはベクターで形質転換またはトランスフェクトした原核生物または真核生物細胞を培養し、細胞培養物からコードされたポリペプチドまたはポリペプチド誘導体を回収することを含む、本発明のポリヌクレオチドによりコードされるポリペプチドまたはポリペプチド誘導体を生産する方法を含む。

#### 【0057】

組換え発現系は原核生物および真核生物宿主から選択される。真核生物宿主には、酵母細胞(例えばサッカロミセス・セレビスイエ(*Saccharomyces cerevisiae*))またはピキア・パストリス(*Pichia pastoris*)、哺乳類細胞(例えばCOSI、NIH3T3、またはJEG3細胞)、節足動物細胞(例えばスポドプテラ・

フルギペルダ(*Spodoptera frugiperda*) (SF9細胞)、および植物細胞が挙げられる。好ましい発現系としては大腸菌のような原核生物宿主がある。当業者には細菌および真核生物細胞は商業的供給者をはじめいくつかの異なる供給者、例えばAmerican Type Culture Collection (ATCC; Rockville, Maryland)から入手可能である。組換えタンパク質発現に用いる細胞の商業的供給者は細胞の使用説明書も提供する。

#### 【0058】

発現系の選択は発現されるポリペプチドに望まれる特徴によって異なる。例えば、特定の脂質化形態(lipidated form)または他のいずれかの形で本発明のポリヌクレオチドを生産するのが有用であると考えられる。

#### 【0059】

総てのベクターおよび発現制御配列ならびに宿主が本発明のポリヌクレオチドを等しく十分に発現するとは考えられないことは当業者には容易に理解されるであろう。しかしながら、下記の指針により、過度な実験を行うことなく、かつ本発明の範囲を逸脱することなく、ベクター、発現制御配列および宿主が選択できよう。

#### 【0060】

ベクターを選択する場合、そこに存在し、かつ可能な限り複製し得るベクターと適合する宿主を選択する必要がある。ベクターコピー数、コピー数を調節する能力、抗生物質耐性などの他のタンパク質の発現が考慮される。発現制御配列を選択する場合、いくつかの変数が考慮される。重要な変数には配列の相対強度(例えば、種々の条件下において発現を駆動する能力)、配列の機能を調節する能力、発現されるポリヌクレオチドと制御配列間の適合性(例えば二次構造は効率的な転写を妨げるヘアピン構造を回避すると考えられる)がある。宿主を選択する場合、所望のコンホメーションで産物を発現でき、スケールアップが容易で、さらにそれが最終産物の精製を容易にすることが望むならば、選択されたベクターと適合し、発現産物のいずれかの起こりうる有毒作用に耐性であり、発現産物を効率的に分泌できる単細胞宿主を選択する。

#### 【0061】

発現カセットの選択は発現されるポリペプチドに望まれる特徴だけでなく選択される宿主系にもよっても異なる。典型的には発現カセットは選択された宿主系において機能し得るものであり、かつ構成的または誘導性であり得るプロモーター；リボソーム結合部位；要すれば開始コドン（ATG）；シグナルペプチド、例えば脂質化(lipidation)シグナルペプチドをコードする領域；本発明のDNA分子；停止コドン；および所望により3'末端領域（翻訳および/または転写ターミネーター）を含む。シグナルペプチドコード領域は本発明のポリヌクレオチドに隣接し、適当なリーディングフレームに存在する。シグナルペプチドコード領域は成熟ポリペプチドをコードするDNA分子と相同または異種であり、発現に用いられる宿主の分泌機構と適合する。本発明のDNA分子により単独またはシグナルペプチドとともに構成されるリーディングフレームは転写および翻訳が宿主系において起こるようにプロモーターの制御下に置かれる。プロモーターおよびシグナルペプチドコード領域は広く知られており、当業者ならば入手可能である。例えばアラビノースにより誘導可能であり（プロモーター *araB*）かつ大腸菌などのグラム陰性菌において機能し得る、ネズミチフス菌(*Salmonella typhimurium*)（および誘導体）のプロモーター（米国特許第5,028,530号およびCagnon et al., (Cagnon et al., Protein Engineering (1991) 4(7):843)に記載）；T7ポリメラーゼを発現する数多くの大腸菌株において機能し得る、RNAポリメラーゼをコードするバクテリオファージT7遺伝子のプロモーター（米国特許第4,952,496号に記載）；OspA脂質化シグナルペプチド；およびRlpB脂質化シグナルペプチド(Takase et al., J. Bact. (1987) 169:5692)が挙げられる。

#### 【0062】

典型的には発現カセットは選択された発現系で複製する能力が選択される発現ベクターの一部である。発現ベクター（例えばプラスミドまたはウイルスベクター）は、例えばPouwels et al. (Cloning Vectors: A Laboratory Manual 1985, Supp. 1987)に記載されるものから選択することができる。好適な発現ベクターは商業的供給者から購入することができる。

#### 【0063】

宿主細胞を発現ベクターで形質転換/トランスフェクトする方法は当技術分野では十分に公知であり、Ausubel et al., (Ausubel et al., Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley & Sons Inc., 1994)に記載されるように選択した宿主系によって異なる。

#### 【0064】

発現の際、本発明の組換えポリペプチド(またはポリペプチド誘導体)は生産され細胞内コンパートメントに留まり、細胞外媒質または原形質膜空間に分泌/放出されるか、または細胞膜に埋め込まれる。ポリペプチドは組換え細胞培養物の遠心分離後の細胞抽出物からまたは上清から実質的に精製された形で回収される。典型的には組換えポリペプチドは抗体に基づくアフィニティー精製により、またはポリペプチドまたはその誘導体をコードするポリヌクレオチドとアフィニティー結合小ドメインとの融合などの当業者によって容易に適合できる十分に公知な他の方法により精製する。本発明のポリペプチドを免疫アフィニティーにより精製するのに有用な抗体は下記のようにして得られる。

#### 【0065】

本発明のポリヌクレオチドはまたワクチンとしても有用である。遺伝子送達ビヒクル(生ワクチンベクター)としてウイルスまたは細菌宿主を用いるか、または遺伝子を遊離型で、例えばプラスミドに挿入して投与するかの2つの主要な経路がある。本発明のポリヌクレオチドの治療または予防効力は下記のようにして評価される。

#### 【0066】

従って、本発明の第三の態様によれば、(i)発現に必要なエレメントの制御下に置かれた本発明のDNA分子を含有するポックスウイルスなどのワクチンベクター；(ii)本発明のワクチンベクターとともに希釈剤または担体を含んでなる材料の組成物；とりわけ(iii)治療または予防上有効な量の本発明のワクチンベクターを含有する医薬組成物；(iv)哺乳類に免疫原性上有効な量の本発明のワクチンベクターを投与してクラミジアに対する感染防御または治療免疫応答を誘導することを含む、哺乳類(例えばヒト)のクラミジアに対する免疫応答を誘導する方法；またこの方法は動物(例えばネコまたは鳥)のクラミジア感染症

を治療または予防する獣医学的適用に用いることができる；さらに詳しくは（v）感染した個体に予防または治療量の本発明のワクチンベクターを投与することを含む、クラミジア（例えばC. トラチヨマチス(*C. trachomatis*)、C. プシタチ(*C. psittaci*)、肺炎クラミジア、C. ペコラム(*C. pecorum*)) 感染症を予防および/または治療する方法が提供される。さらに本発明の第三の態様によれば、クラミジア感染症を予防および/または治療する医薬の製造における本発明のワクチンベクターの使用が含まれる。

#### 【0067】

本明細書において、ワクチンベクターは本発明の1つまたはいくつかのポリペプチドまたは誘導体を発現する。ワクチンベクターはさらに免疫応答を増大する（アジュバント効果）インターロイキン-2（IL-2）またはインターロイキン-12（IL-12）などのサイトカインを発現すると考えられる。発現される各成分が哺乳類細胞における発現に必要なエレメントの制御下に置かれていることは明らかである。

#### 【0068】

本発明の第三の態様によれば、組成物はそれぞれが本発明のポリペプチドまたは誘導体を発現し得るいくつかのワクチンベクターを含んでなる。組成物はまた付加的なクラミジア抗原、またはそのサブユニット、断片、相同体、変異体もしくは誘導体；または必要に応じてIL-2もしくはIL-12などのサイトカインと共に、または該サイトカインをを発現し得るワクチンベクターを含んでなってもよい。

#### 【0069】

哺乳類における感染症を治療または予防する予防接種方法は、いずれかの一般的な経路により、特に粘膜（例えば目、鼻腔内、口腔、胃、肺、腸、直腸、膣、または尿管）表面にまたは非経口（例えば皮下、皮内、筋肉内、静脈内、または腹膜内）経路により投与される本発明のワクチンベクターの使用を含んでなる。好ましい経路はワクチンベクターの選択による。1回の投与で治療を果たしてもよいし、または間隔をおいて反復してもよい。好適な用量は当業者に理解されている、ワクチンベクター自体、投与経路または予防接種する哺乳類の条件（重量

、年齢など)といった種々のパラメーターによって異なる。

#### 【0070】

当技術分野で入手可能な生ワクチンベクターには、アデノウイルスおよびポックスウイルスなどのウイルスベクター、ならびに細菌ベクター(例えば赤痢菌属(*Shigella*)、サルモネラ菌(*Salmonella*)、コレラ菌(*Vibrio cholerae*)、乳酸桿菌(*Lactobacillus*)、カルメットーグラン菌(*Bacille bilie de Calmette-Guerin*)(BCG)、および連鎖球菌(*Streptococcus*))が挙げられる。

#### 【0071】

アデノウイルスベクター例、ならびに本発明のDNA分子を発現し得るアデノウイルスベクターの構築方法が米国特許第4,920,209号に記載されている。ポックスウイルスベクターにはワクシニアおよびカナリヤポックスウイルスがあり、それぞれ米国特許第4,722,848号および米国特許第5,364,773号に記載されている。例えばワクシニアウイルスベクターの記載はTartaglia et al., *Virology* (1992) 188:217、カナリヤポックスの参照文献はTaylor et al. *Vaccine* (1995) 13:539も参照。哺乳類細胞における発現に好適な条件下で本発明のポリヌクレオチドをウイルスゲノムに挿入するために、本発明のポリヌクレオチドを発現し得るポックスウイルスベクターをKieny et al., *Nature* (1984) 312:163に記載される相同組換えにより得る。一般に治療または予防に使用するワクチンウイルスベクターの用量はキログラム当たりのプラーク形成単位が、約 $1 \times 10^4$  ~ 約 $1 \times 10^{11}$ 、有利には約 $1 \times 10^7$  ~ 約 $1 \times 10^{10}$ 、好ましくは約 $1 \times 10^7$  ~ 約 $1 \times 10^9$ であってよい。好ましくは、ウイルスベクターを、例えば4週間おきに3回で、非経口投与する。本発明のウイルスベクターを含有する組成物に化学アジュバントを加えることを避け、それによってウイルスベクター自身に対する免疫応答を最小にすることが好ましい。

#### 【0072】

経口生ワクチンとして有用な無毒性コレラ菌変異株が知られている。Mekalanos et al., *Nature* (1983) 306:551および米国特許第4,882,278号では、機能し得るコレラ毒素が生産されないように欠失させた、2つのctxA対立遺伝子それぞれの実在する量のコード配列を有する株が記載されている。W092/11354では、

変異（この変異を単一株においてc t x A変異と組み合わせてもよい）によりi r g A遺伝子座を不活性化した株が記載されている。W094/01533では、機能し得るc t x Aおよびa t t R S 1 DNA配列を欠いた欠失変異体が記載されている。W094/19482に記載されるように、これらの変異株を遺伝子操作して非対応抗原を発現させる。本発明のDNA分子によりコードされるポリペプチドまたはポリペプチド誘導体を発現し得るコレラ菌株の有効なワクチン用量は、選択された投与経路に適した用量中の生存細菌数、約 $1 \times 10^5$  ~ 約 $1 \times 10^9$ 、好ましくは約 $1 \times 10^6$  ~ 約 $1 \times 10^8$ を含有する。好ましい投与経路としてはあらゆる粘膜経路が挙げられ、最も好ましくはこれらのベクターは鼻腔内または経口投与される。

#### 【0073】

非対応抗原の組換え発現用に遺伝子操作した、またはしない弱毒ネズミチフス菌株、および経口ワクチンとしてのそれらの使用は、Nakayama et al. (Bio/Technology (1988) 6:693)およびW092/11361に記載されている。好ましい投与経路としてはあらゆる粘膜経路が挙げられ、最も好ましくはこれらのベクターは鼻腔内または経口投与される。

#### 【0074】

本発明においてワクチンベクターとして用いられる他の細菌株は、High et al., EMBO (1992) 11:1991およびSizemore et al., Science (1995) 270:299 (フレクスナー赤痢菌(*Shigella flexneri*)); Medaglini et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1995) 92:6868 (ストレプトコッカス・ゴルドニー(*Streptococcus gordonii*))、Flynn J. L., Cell. Mol. Biol. (1994) 40 (suppl. 1): 31 (Bacille Calmette Guerin)、W088/06626、W090/00594、W091/13157、W092/01796、およびW092/21376 (カルメットーゲラン菌)に記載されている。

#### 【0075】

細菌ベクターでは本発明のポリヌクレオチドを細菌ゲノムに挿入するか、または遊離状態でプラスミドの一部として残す。

#### 【0076】

本発明のワクチン細菌ベクターを含んでなる組成物はアジュバントをさらに含

有してもよい。いくつかのアジュバントが当業者に公知である。好ましいアジュバントは以下に挙げるように選択される。

【0077】

従って、本発明の第四の態様によれば、(i)本発明のポリヌクレオチドとともに希釈剤または担体を含んでなる材料の組成物；(ii)治療または予防上有効な量の本発明のポリヌクレオチドを含有する医薬組成物；(iii)免疫原性上有効な量の本発明のポリヌクレオチドを投与してクラミジアに対する感染防御免疫応答を誘導することにより哺乳類のクラミジアに対する免疫応答を誘導する方法；さらに詳しくは(iv)感染した個体に予防または治療量の本発明のポリヌクレオチドを投与することにより、クラミジア（例えばC．トラチヨマチス、C．プシタチ、肺炎クラミジア、またはC．ペコラム）感染症を予防および／または治療する方法が提供される。さらに本発明の第四の態様によれば、クラミジア感染症を予防および／または治療する医薬の製造における本発明のポリヌクレオチドの使用が含まれる。好ましい使用には哺乳類細胞における、特に哺乳類細胞において複製できず、かつ哺乳類ゲノムに実質的に組み込むことのできないプラスミドにおける発現の条件下に置かれたDNA分子の使用が挙げられる。

【0078】

本発明のポリヌクレオチドの使用には、治療または予防目的での哺乳類へのワクチンとしての投与が挙げられる。かかるポリヌクレオチドは哺乳類細胞において複製できず、かつ哺乳類ゲノムに組み込むことのできないプラスミドの一部としてDNAの形で用いられる。典型的には、かかるDNA分子は哺乳類細胞の発現に好適なプロモーターの制御下に置かれる。プロモーターは遍在して、または組織特異的のいずれかで機能する。非組織特異的プロモーターの例としては、初期サイトメガロウイルス(CMV)プロモーター(米国特許第4,168,062号に記載される)およびラウス肉腫ウイルスプロモーター(Norton & Coffin, Molec. Cell Biol. (1985) 5:281に記載される)が挙げられる。組織特異的プロモーターの例としては、筋肉細胞における発現を駆動するデスミンプロモーター(Li et al., Gene (1989) 78:243、Li & Paulin, J. Biol. Chem. (1991) 266:6562およびLi & Paulin, J. Biol. Chem. (1993) 268:10403に記載される)である。プ

ロモーターの使用については当業者は十分に公知である。有用なベクターは多くの公報、特にW094/21797およびMartikka et al., Human Gene Therapy (1996) 7 : 1205で記載されている。

#### 【0079】

ワクチンとして用いられる本発明のポリヌクレオチドは対応するポリペプチドの前駆体または成熟型のいずれかをコードする。前駆体型ではシグナルペプチドは相同または異種のいずれかである。後者の場合、組織型プラスミノゲン因子 ( t P A ) のリーダー配列などの真核生物リーダー配列が好ましい。

#### 【0080】

本明細書において、本発明の組成物は1つまたはいくつかのポリヌクレオチドとともに所望によりウレアーゼサブユニットA、Bもしくはその両方などの別のクラミジア抗原、またはその断片、誘導体、変異体もしくは類似体をコードする少なくとも一つの付加的なポリヌクレオチドを含有する。また組成物は免疫応答を増強するためにインターロイキン-2 ( I L - 2 ) またはインターロイキン-12 ( I L - 1 2 ) などのサイトカインをコードする付加的なポリヌクレオチドを含有してもよい。これらの付加的なポリヌクレオチドは発現に好適な制御下に置かれている。同じ組成物に含まれる本発明のDNA分子および/または付加的なDNA分子は同じプラスミドに存在することが有利である。

#### 【0081】

本発明のポリヌクレオチド治療薬の製造に分子生物学におけるポリヌクレオチドの調製および精製標準手法を用いる。ワクチンとして用いるための本発明のポリヌクレオチドは以下に概略を記した種々の方法により処方される。

#### 【0082】

一つの方法ではポリヌクレオチドはいずれの送達ビヒクルも用いない裸の形態で使用される。かかるポリヌクレオチドは単に滅菌生理食塩水または滅菌緩衝溶液などの生理学上許容される溶液に、担体を用いてまたは用いずに希釈する。担体が存在する場合には、担体が等張性、低張性、または弱高張性であることが好ましく、スクロース溶液、例えば20%スクロース含有溶液により得られるような比較的低いイオン強度を有する。

## 【0083】

別法では細胞の取り込みを助ける薬剤と結合したポリヌクレオチドを使用する。かかる薬剤の例は ( i ) ブピバカインなどの細胞透過性を改変する化学物質 ( 例えばW094/16737参照 )、 ( ii ) ポリヌクレオチドをカプセル封入するリポソーム、または ( iii ) それ自身がポリヌクレオチドと結合する陽イオン脂質またはシリカ、金、もしくはタングステン微粒子である。

## 【0084】

陰イオンおよび中性リポソームは当技術分野では十分に公知であり ( 例えばリポソーム作製方法の詳細な説明に関する、Liposomes: A Practical Approach, Rpc New Ed, IRL press (1990)参照 )、ポリヌクレオチドをはじめとする広範囲の産物を送達するのに有用である。

## 【0085】

陽イオン脂質もまた当技術分野では公知であり、遺伝子送達には常用されている。かかる脂質には、DOTMA ( N - [ 1 - ( 2 , 3 - ジオレイルオキシ ) プロピル ] - N , N , N - トリメチルアンモニウムクロリド ) としても知られるリポフェクチン ( 商標 )、DOTAP ( 1 , 2 - ビス ( オレイルオキシ ) - 3 - ( トリメチルアンモニオ ) プロパン )、DDAB ( ジメチルジオクタデシルアンモニウムブロミド )、DOGS ( ジオクタデシルアミドログリシルスペルミン ) および DC - Chol ( 3 - ( N - ( N' , N' - ジメチルアミノメタン ) - カルバモイル ) コレステロール ) などのコレステロール誘導体が挙げられる。これらの陽イオン脂質の記載はEP187,702、W090/11092、米国特許第5,283,185号、W091/15501、W095/26356、および米国特許第5,527,928号に見出すことができる。遺伝子送達用の陽イオン脂質は、例えばW090/11092に記載されるようにDOPE ( ジオレイルホスファチジルエタノールアミン ) のような中性脂質と結合させて用いることが好ましい。

## 【0086】

陽イオンリポソームを含有する製剤は所望により他のトランスフェクション促進化合物を含有してもよい。それらの多くはW093/18759、W093/19768、W094/25608、およびW095/2397に記載されている。それらには核膜を通るDNAの輸送を

促進するのに有用なスペルミン誘導体（例えばW093/18759参照）およびGALA、グラミシジンS、ならびに陽イオン胆汁酸塩などの膜透過性化合物（例えばW093/19768参照）が挙げられる。

#### 【0087】

金またはタングステン微粒子はW091/00359、W093/17706、およびTang et al. (Nature (1992) 356:152)に記載されるように遺伝子送達に用いられる。米国特許第4,945,050号、米国特許第5,015,580号、およびW094/24263に記載されるもののように、微粒子で被覆したポリヌクレオチドを無針注入装置（「遺伝子銃」）を用いて皮内または表皮内経路で注入する。

#### 【0088】

ワクチン受容者に用いるDNA量は、例えばDNA構築に用いるプロモーターの強さ、発現遺伝子産物の免疫原性、投与をしようとする哺乳類の条件（例えば哺乳類の体重、年齢、および全身の健康状態）、投与様式、および剤型による。一般に、治療または予防上有効な量、約1 $\mu$ g～約1mg、好ましくは約10 $\mu$ g～約800 $\mu$ g、およびさらに好ましくは約25 $\mu$ g～約250 $\mu$ gをヒト成人に投与してもよい。1回の投与で投与を果たしてもよいし、または間隔をおいて反復してもよい。

#### 【0089】

投与経路はワクチン分野で用いるいずれの便宜な経路であってもよい。一般的な指針として、本発明のポリヌクレオチドは粘膜表面、例えば目、鼻腔内、肺、口腔、腸、直腸、膣、および尿管表面により；または非経口経路、例えば静脈内、皮下、腹膜内、皮内、表皮内、または筋肉内経路により投与する。投与経路の選択は選択される製剤による。ブピバカインと結合させて処方したポリヌクレオチドは筋肉投与が有利である。中性もしくは陰イオンリポソームまたはDOTMAまたはDC-Cholなどの陽イオン脂質を用いる場合、製剤は静脈内、鼻腔内（エアゾル化）、筋肉内、皮内、および皮下経路により注入することが有利であろう。裸の形態のポリヌクレオチドは筋肉内、皮内、または皮下経路により投与することが有利であろう。

#### 【0090】

必ずしも必要ではないが、かかる組成物はアジュバントを含有していてもよい。もしそうであれば、アジュバント作用を示すために同時投与する必要のない浸透性アジュバント、例えば米国特許第5,057,546号に記載されるQS21などが好ましい。

#### 【0091】

本願で提供される配列情報により診断目的で用いる特異的なヌクレオチドプローブおよびプライマーの設計が可能になる。従って、本発明の第五の態様によれば、配列番号1に示される配列の遺伝子コードの縮重で見られる、または縮重により誘導された配列を有するヌクレオチドプローブまたはプライマーが提供される。

#### 【0092】

本願において使用される「プローブ」とは、上記のように、ストリンジェント条件下で、配列番号1を有する核酸分子と、または配列番号1と相同な配列と、またはその相補もしくはアンチセンス配列とハイブリダイズするDNA（好ましくは一本鎖）またはRNA分子（または改変体もしくはその組合せ）をいう。一般に、プローブは全長配列よりかなり短い。かかるプローブは約5～約100個、好ましくは約10～約80個のヌクレオチドを含有する。特にプローブは配列番号1の一部と少なくとも75%、好ましくは少なくとも85%、さらに好ましくは95%相同である、またはかかる配列と相補的である配列を有する。プローブはイノシン、メチル-5-デオキシシチジン、デオキシウリジン、ジメチルアミノ-5-デオキシウリジン、またはジアミノ-2,6-プリンなどの改変塩基を含有してもよい。糖またはリン酸残基も改変または置換してもよい。例えばデオキシリボース残基をポリアミドで置き換えてもよく(Nielsen et al., Science (1991) 254:1497)、リン酸残基をジホスフェート、アルキル、アリアルホスホネートおよびホスホロチオエートエステルなどのエステル基で置き換えてもよい。さらにリボヌクレオチドの2'-ヒドロキシ基をアルキル基のような官能基などで改変してもよい。

#### 【0093】

本発明のプローブは捕捉または検出プローブとして診断試験に用いられる。便

宜にはかかる捕捉プローブは共有結合手段によりまたは受動的吸着により固相支持体に直接的または間接的に固定する。検出プローブは放射性同位元素、ペルオキシダーゼ、アルカリ性ホスファターゼ、ならびに発色性、蛍光性、または発光性基質を加水分解し得る酵素、発色性、蛍光性、または発光性化合物、ヌクレオチド塩基類似体、およびビオチンから選択される検出マーカーで標識する。

#### 【0094】

本発明のプローブをドットプロット法(Maniatis et al., Molecular Cloning: A Laboratory Manual (1982) Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York)、サザンプロット法(Southern, J. Mol. Biol. (1975) 98:503)、ノーザンプロット法(RNAを標的として用いることを除いて、サザンプロットと同じ)、またはサンドイッチ手法(Dunn et al., Cell (1977) 12:23)などのいずれの通常のハイブリダイゼーション手法にも用いてよい。後の手法では互いに少なくとも部分的に異なるヌクレオチド配列を有する特異的な捕捉プローブおよび/または特異的な検出プローブの使用が含まれる。

#### 【0095】

プライマーは増幅プロセス(例えばPCR)、伸長プロセス、または逆転写法における酵素的DNA重合を開始するのに用いる、通常約10~約40個のヌクレオチドのプローブである。PCRをはじめとする診断法に用いるプライマーを当技術分野で公知な方法で標識する。

#### 【0096】

本明細書において記載されるように、本発明はまた(i)生物学的材料においてクラミジアの存在を検出および/または同定する本発明のプローブを含んでなる試薬;(ii)(a)該生物学的材料からサンプルを採取または誘導し、(b)該材料からDNAまたはRNAを抽出して変性させ、さらに(c)ストリンジェントハイブリダイゼーション条件下で、ハイブリダイゼーションが検出されるように本発明のプローブ、例えば捕捉、検出プローブもしくはその両方に曝す、生物学的材料においてクラミジアの存在を検出および/または同定する方法;および(iii)(a)該生物学的材料からサンプルを採取または誘導し、(b)そこからDNAを抽出し、(c)抽出したDNAに少なくとも1つ、および好ましくは2つの本発明の

プライマーを提供してポリメラーゼ鎖反応により増幅し、さらに(d)増幅したDNA断片を生産する、生物学的材料においてクラミジアの存在を検出および/または同定する方法も包含する。

【0097】

配列番号1ポリヌクレオチド配列、その相同体、および各々の部分配列の開示によりそれらの対応するアミノ酸配列が使用可能になることは明らかである。従って本発明の第六の態様によれば、本発明のポリヌクレオチドによりコードされるアミノ酸配列を有する、実質的に精製されたポリペプチドまたはポリペプチド誘導体が提供される。

【0098】

本明細書において使用される「実質的に精製されたポリペプチド」はそれが天然に存在する環境から選別されたポリヌクレオチド、および/またはそれが合成される環境に存在する多数のポリヌクレオチドから遊離したポリペプチドと定義される。例えば、実質的に精製されたポリペプチドは細胞質ポリペプチドから遊離したものである。本発明のポリペプチドが天然源、すなわちクラミジア株から精製され得る、または組換え手段により生産され得ることは当業者には容易に理解されよう。

【0099】

本発明の第六の態様によれば、ポリペプチド、相同体または断片がクラミジアに対する感染防御をすると考えられる標的動物において、その免疫原性を向上させるために改変されたまたは処理されたポリペプチド、相同体または断片が提供される。かかる改変または処理には：3-メチルヒスチジン、4-ヒドロキシプロリン、5-ヒドロキシリジンなどのアミノ酸誘導体によるアミノ酸置換、アミノ酸の遊離アミノ、カルボキシルまたはヒドロキシル側基の改変などのポリペプチド、相同体または断片の調整後に行われる改変または欠失が挙げられる。

【0100】

特異的抗原性を有する本発明のポリヌクレオチドによりコードされる相同ポリペプチドまたはポリペプチド誘導体の同定は、配列番号1のアミノ酸配列を有する参照ポリペプチドに対して作製した抗血清との交差反応性によるスクリーニン

グにより達成される。の手順は次の通りである：単一特異性高度免疫抗血清を、精製参照ポリペプチド、融合ポリペプチド（例えばMBP、GST、またはHis-tag系の発現産物、その使用に関する記載および説明についてはpcDNA3.1/Myc-His(+)-A、BおよびCに関する、またXpress(商標)系タンパク質精製に関するInvitrogen製品マニュアルに含まれている）、または抗原性であると推測される合成ペプチドに対して作製する。抗血清を融合ポリペプチドに対して作製する場合、2つの異なる融合系を使用する。特異性抗原性は以下のようにウエスタンブロット法(Towbin et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1979) 76:4350)、ドットブロット法、およびELISA法などのいくつかの方法により求めることができる。

#### 【0101】

ウエスタンブロットアッセイでは、スクリーニングする産物を精製調製物または大腸菌全抽出物のいずれかとして、Laemmli(Nature (1970) 227:680)により記載されたSDS-PAGE電気泳動法に付す。ニトロセルロース膜に移した後、この材料を約1:5~約1:5000、好ましくは約1:100~約1:500の希釈範囲で、希釈した単一特異性高度免疫抗血清とともにさらにインキュベートする。その産物に対応する一つのバンドが上記の希釈範囲のいずれかで反応性を呈すれば、特異的抗原性が示される。

#### 【0102】

ELISA法では、スクリーニングする産物を被覆抗原として用いることが好ましい。全細胞抽出物を用いてもよいが、精製調製物が好ましい。要するに、約10µgタンパク質/mlの調製物約100µlを96-ウェルポリカーボネートELISAプレートに分注する。このプレートを37で2時間、次いで4で一晩インキュベートする。プレートを0.05%Tween20含有リン酸緩衝生理食塩水(PBS)(PBS/Tweenバッファー)で洗浄する。ウェルを1%ウシ血清アルブミン(BSA)含有PBS250µlで飽和させ、非特異的抗体結合を妨げる。37で1時間インキュベーションした後、プレートをPBS/Tweenバッファーで洗浄する。抗血清は0.5%BSA含有PBS/Tweenバッファーで連続的に希釈する。各ウェルに希釈物100µlを加える。

プレートを37℃で90分間インキュベートし、洗浄して標準法により評価する。例えば、特異的抗体をウサギで生産した場合、ヤギ抗ウサギペルオキシダーゼ複合体をウェルに加える。インキュベーションを37℃で90分間で行い、プレートを洗浄する。適当な基質により反応物を顕出させ、この反応物を比色定量（分光光度計により測定された吸光度）により測定する。上記の試験条件下で、O.D.値が非免疫対照血清より大きい場合に陽性反応を示す。

#### 【0103】

ドットプロット法でも、全細胞抽出物を用いてもよいが、精製産物が好ましい。要するに、約100 µg/mlの産物の溶液を50 mM Tris-HCl (pH 7.5)で連続的に2倍希釈する。各希釈物100 µlを96-ウェルドットプロット装置(Biorad)にセットしたニトロセルロース膜0.45 µmに塗布する。系を減圧してバッファーを除去する。50 mM Tris-HCl (pH7.5)を加えてウェルを洗浄し、膜を風乾する。膜をブロッキングバッファー（50 mM Tris-HCl (pH7.5)、0.15 M NaCl、10 g/L脱脂乳）で飽和させ、約1:50～約1:5000、好ましくは約1:500の抗血清希釈物とともにインキュベートする。反応物を標準手順により調べる。例えば、ウサギ抗体を用いる場合、ヤギ抗ウサギペルオキシダーゼ複合体をウェルに加える。インキュベーションを37℃で90分間で行い、プロットを洗浄する。適当な基質により反応物を顕出させて停止させる。この反応物を発色スポットの様子から、例えば比色定量により視覚的に測定する。上記の試験条件下で、発色スポットが少なくとも約1:5、好ましくは少なくとも約1:500の希釈物と結合する場合に陽性反応を示す。

#### 【0104】

本発明のポリペプチドまたは誘導体の治療または予防効力は下記のように評価できる。本発明の第七の態様によれば、(i)本発明のポリペプチドとともに希釈剤または担体を含んでなる材料の組成物；とりわけ(ii)治療または予防上有効な量の本発明のポリペプチドを含有する医薬組成物；(iii)免疫上有効な量の本発明のポリペプチドを哺乳類に投与してクラミジアに対する感染防御免疫応答を誘導することにより哺乳類のクラミジアに対する免疫応答を誘導する方法；

さらに詳しくは(iv)感染した個体に予防または治療量の本発明のポリペプチドを投与することにより、クラミジア(例えばC.トラチョマチス、C.プシタチ、肺炎クラミジア、またはC.ペコラム)感染症を予防および/または治療する方法が提供される。さらに本発明の第七の態様によれば、クラミジア感染症を予防および/または治療する医薬の製造における本発明のポリペプチドの使用が含まれる。

#### 【0105】

本明細書において、本発明の免疫原性組成物はワクチン分野で知られる便宜な経路、特に粘膜(例えば目、鼻腔内、肺、口腔、胃、腸、直腸、膣、または尿管)表面にまたは非経口(例えば皮下、皮内、筋肉内、静脈内、または腹膜内)経路により投与する。投与経路の選択はポリペプチドと結合したアジュバントなどのいくつかのパラメーターによる。粘膜アジュバントを用いる場合には鼻腔内または口腔経路が好ましい。脂質処方またはアルミニウム化合物を用いる場合には非経口経路が好ましく、皮下または筋肉内経路が最も好ましい。この選択もまたワクチン薬剤の性質による。例えば、CTBまたはLTBと融合した本発明のポリペプチドは粘膜表面に投与することが最もよい。

#### 【0106】

本明細書において、本発明の組成物は1つまたはいくつかの本発明のポリペプチドまたは誘導体を含有する。所望により組成物は少なくとも一つの付加的なクラミジア抗原、またはそのサブユニット、断片、相同体、変異体もしくは誘導体を含有してもよい。

#### 【0107】

本発明の組成物における使用では、ポリペプチドまたはその誘導体をリポソーム、好ましくは中性または陰イオンリポソーム、ミクロスフェア、ISCOMS、またはウイルス様粒子(VLP)中にまたはそれとともに処方して、送達を促進および/または免疫応答を増強する。当業者はこれらの化合物を容易に入手できる;例えばLiposomes: A Practical Approach, RCP New Ed, IRL press(1990)参照。

#### 【0108】

リポソームなど以外のアジュバントも用いられ、当技術分野では公知である。アジュバントは抗原を局所デポジットに封鎖することにより、それを急速な分散から守る、またはそれらは宿主を刺激して免疫系のマクロファージまたは他の成分に対し化学走性である因子を分泌する物質を含有すると考えられる。一般的には当業者によって、例えば以下に記載されるもの（本発明の第11の態様に基づくもの）から適当な選択がなされるであろう。

#### 【0109】

当業者ならば容易に決定できるが、治療は1回の投与で果たしてもよいし、または必要に応じて間隔をおいて反復してもよい。例えば、開始用量の後、週単位または1ヶ月単位の間隔をおいて3回の追加免疫抗原投与を続ける。好適な用量は当業者には容易に決定できるが、受容者（例えば成人または小児）、個々のワクチン抗原、投与経路または頻度、アジュバントの有無またはタイプ、および所望の効果（例えば感染防御および/または治療）を含む種々のパラメーターによって異なる。一般に、本発明のワクチン抗原を粘膜経路によって約10 $\mu$ g～約500mg、好ましくは約1mg～約200mgの量を投与する。投与が非経口経路の場合、通常用量は約1mg、好ましくは約100 $\mu$ gの限度を超えない。

#### 【0110】

ワクチン薬剤として用いる場合、本発明のポリヌクレオチドおよびポリペプチドを多段階免疫化プロセスの要素として連続的に用いてもよい。例えば、まず哺乳類にポックスウイルスなどの本発明のワクチンベクターを、例えば非経口経路により注入し、次いでワクチンベクターによりコードされるポリペプチドで2回、例えば粘膜経路により追加免疫抗原を加える。また別の例では本発明のポリペプチドまたは誘導体と結合したリポソームを開始に用い、粘膜アジュバント（例えばLT）と組み合わせた本発明の可溶性ポリペプチドまたは誘導体を用いて粘膜により追加免疫抗原刺激を行う。

#### 【0111】

本発明の第七の態様によれば、本発明のポリペプチド誘導体はまた、例えば血液サンプルにおいて抗クラミジア抗体の存在を検出する診断試薬として用いられる。かかるポリペプチドの長さは約5～約80個、好ましくは約10～約50個

のアミノ酸である。診断方法により、それらを標識するまたは標識しないのいずれかである。かかる試薬を含む診断方法を以下に記載する。

#### 【0112】

公知の実験室手法を用い、本発明のDNA分子の発現においてポリペプチドまたはポリペプチド誘導体を生産し精製する。以下に記載されるように、ポリペプチドまたはポリペプチド誘導体は精製を促進する融合テールを有した融合タンパク質として生産される。融合産物を用いて小型哺乳類、例えばマウスまたはウサギを免疫化し、ポリペプチドまたはポリペプチド誘導体に対する抗体（単一特異性抗体）を作製する。よって本発明の第八の態様によれば、本発明のポリペプチドまたはポリペプチド誘導体と結合する単一特異性抗体が提供される。

#### 【0113】

「単一特異性抗体」とは特異な天然に存在するクラミジアポリペプチドと反応し得る抗体を意味する。本発明の抗体はポリクローナルまたはモノクローナル抗体のいずれかである。単一特異性抗体は組換え体、例えばキメラ（例えば、ヒト不変部と結合したネズミ由来の可変部により構成された）、ヒト化型（動物、例えばネズミ由来の超可変部とともにあるヒト免疫グロブリン不変主鎖）および/または一本鎖であってよい。ポリクローナルおよび単一特異性抗体は双方とも免疫グロブリン断片、例えばF(a b)'<sub>2</sub>またはF a bフラグメントの形であってよい。本発明の抗体はいずれのイソ型のもの、例えばI g GまたはI g Aであってよいが、ポリクローナル抗体は単一イソ型またはイソ型の混合物ある。

#### 【0114】

本発明のポリペプチド、相同体または断片に対する抗体はそのポリペプチド、相同体または断片を含んでなる組成物による哺乳類の免疫化により産生される。かかる抗体はポリクローナルまたはモノクローナル抗体であってよい。ポリクローナルまたはモノクローナル抗体の産生方法は当技術分野では十分に公知である。例えば、"Antibodies, A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory, Eds. E. Harlow and D. Lane (1988)、およびD. E. Yelton et al., 1981. Ann. Rev. Biochem. 50: 657-680参照。モノクローナル抗体についてはKohl and Milstein (1975) Nature 256:495-497参照。

## 【0115】

本発明のポリペプチドまたはポリペプチド誘導体に対して作製される本発明の抗体を標準免疫学的アッセイ法、例えばウエスタンブロット解析法、ドットブロットアッセイ法、またはELISA法(例えばColigan et al., Current Protocols in Immunology (1994) John Wiley & Sons, Inc., New York, NY参照)を用いて作製して同定する。抗体は生物学的サンプルなどのサンプルにおいてクラミジア抗原の存在を検出する診断法に用いられる。また抗体は本発明のポリペプチドまたはポリペプチド誘導体を精製するアフィニティークロマトグラフィーにも用いられる。以下でさらに考察するように、かかる抗体を予防および治療的受動的免疫化方法に用いてもよい。

## 【0116】

よって本発明の第九の態様によれば、本発明の抗体、ポリペプチド、またはポリペプチド誘導体を含有する生物学的サンプルにおいてクラミジアの存在を検出する試薬；および(ii)免疫複合体が形成されるように生物学的サンプルと本発明の抗体、ポリペプチド、またはポリペプチド誘導体とを接触させて、かかる複合体を検出してサンプルまたはサンプルが誘導される生物体においてクラミジアの存在を示すことにより、生物学的サンプルにおいてクラミジアの存在を検出する方法が提供される。

## 【0117】

いずれを用いるとしても免疫複合体がサンプルの成分と抗体、ポリペプチド、またはポリペプチド誘導体とで形成されること、および結合していない材料がいずれも複合体の検出前に除去されることは当業者には容易に理解されるであろう。ポリペプチド試薬がサンプル、例えば血液サンプルにおいて抗クラミジア抗体の存在を検出するのに有用であり、本発明の抗体が胃抽出物または生検などのサンプルをクラミジアポリペプチドの存在についてスクリーニングするのに有用であることは明らかである。

## 【0118】

診断適用では、試薬(すなわち本発明の抗体、ポリペプチド、またはポリペプチド誘導体)は遊離状態にあるか、またはチューブ、ビーズ、または当分野にお

いて用いられるいずれかの他の通常の支持体などの固相支持体に固定されているかである。固定は直接的または間接的手段によりなし遂げられる。直接的手段としては受動的吸着（非共有結合）または支持体と試薬との共有結合が挙げられる。「間接的手段」とは試薬と相互作用する抗試薬化合物が固相支持体に最初に付着することを意味する。例えば、ポリペプチド試薬を用いる場合に、それが生物学的サンプルにおいて抗体の認識に関係していないエピトープと結合するのであれば、それに結合する抗体が抗試薬として作用し得る。間接的手段にはまた、例えばビタミンなどの分子がポリペプチド試薬に接合され、その対応する受容体が固相に固定されるリガンド - 受容体系も用いられる。これはビオチン - ストレプトアビジン系によって例示される。あるいは、ペプチドテールを化学的にまたは遺伝子操作により試薬に加え、接合または融合された産物をペプチドテールの受動的吸着または共有結合により固定する。

#### 【0119】

使用説明書も含んでなるキットにかかる診断薬が含まれていてもよい。この試薬はそれがその標的と結合した場合に試薬の検出がなされる検出手段によって標識される。検出手段はフルオレセインイソシアネートまたはフルオレセインイソチオシアネートなどの蛍光剤、またはセイヨウワサビペルオキシダーゼもしくはルシフェラーゼ、またはアルカリ性ホスファターゼなどの酵素、または<sup>125</sup>Iまたは<sup>51</sup>Crなどの放射性元素であってよい。

#### 【0120】

従って本発明の第10の態様によれば、生物学的サンプルについて本発明の単一特異性抗体に基づくアフィニティークロマトグラフィーを行うことを含む、生物学的サンプルから、本発明のポリペプチドまたはポリペプチド誘導体を精製する方法が提供される。

#### 【0121】

本発明の精製法における使用に関し、抗体はポリクローナルまたは単一特異性抗体のいずれか、および好ましくはIgG型である。精製IgGは常法により抗血清から調製する(Coligan et al., Current Protocols in Immunology (1994) John Wiley & Sons, Inc., New York, NY.)。一般的なクロマトグラフィー支持

体、ならびに抗体を接合する標準方法については、例えばAntibodies: A Laboratory Manual, D. Lane, E. Harlow, Eds. (1988)に記載されている。以下に概略を記す。

#### 【0122】

要するに、好ましくはバッファー溶液中の肺炎クラミジア抽出物などの生物学的サンプルを、本発明のポリペプチドまたはポリペプチド誘導体（すなわち抗原）をクロマトグラフィー材に吸着させるように、好ましくは生物学的サンプルの希釈に用いるバッファーで平衡化した材料に適用する。本発明の抗体と結合したゲルまたは樹脂などのクロマトグラフィー材はバッチ型またはカラムのいずれかである。結合しない成分を洗い流し、次いで抗原をグリシンバッファー、またはカオトロピック剤、例えばグアニジンHCl、もしくは高塩濃度（例えば、3 M MgCl<sub>2</sub>）を含有するバッファーなどの好適な溶出バッファーで溶出する。溶出画分を回収し、例えば280 nmにおける吸光度を測定することにより抗原の存在を検出する。

#### 【0123】

本発明の第11の態様によれば、(i)本発明の単一特異性抗体とともに希釈剤または担体を含んでなる材料の組成物；(ii)治療または予防上有効な量の本発明の単一特異性抗体を含んでなる医薬組成物；および(iii)感染した個体に治療または予防量の本発明の単一特異性抗体を投与することにより、クラミジア（例えばC.トラチョマチス、C.プシタチ、肺炎クラミジア、またはC.ペコラム）感染症を治療または予防する方法が提供される。さらに本発明の第11の態様によれば、クラミジア感染症を治療または予防する医薬の製造における本発明の単一特異性抗体の使用が含まれる。

#### 【0124】

単一特異性抗体はポリクローナルまたはモノクローナルのいずれか、好ましくはIgAイソ型のもの（優勢）である。受動的免疫化では抗体を重炭酸バッファーの存在下で哺乳類の粘膜表面、例えば胃粘膜に、例えば経口または胃内投与することが有利である。また全身投与は重炭酸バッファーを用いずに行われる。本発明の単一特異性抗体を単一有効成分として、または異なるクラミジアポリペプ

チドに対して特異的な少なくとも一つの単一特異性抗体との混合物として投与する。用いる抗体量および特定の管理方法は当業者により容易に決定される。大部分の目的には、例えば抗体約100～1,000mgを1週間毎日投与、または抗体約100～1,000mgを2または3日間1日当たり3回投与が有効な管理法である。

#### 【0125】

治療または予防効力を当技術分野の常法を用いて、例えば粘膜免疫応答の誘導または感染防御および/または治療的免疫の誘導を、例えば肺炎クラミジアマウスモデルを用いて測定することにより評価する。モデルの肺炎クラミジア株を別のクラミジア株と置き換えてもよいことは当業者に容易に理解されるであろう。例えば、肺炎クラミジア由来のDNA分子およびポリペプチドの効果は、好ましくはマウスモデルにおいて肺炎クラミジア株を用いて評価する。感染防御はクラミジア感染症の程度を対照群のものと比較して求める。感染症が対照群に比べて軽減されている場合に感染防御を示す。本発明のポリヌクレオチド、ワクチンベクター、ポリペプチドおよびその誘導體、ならびに抗体に対してかかる評価がなされる。

#### 【0126】

上記のいずれのワクチン組成物においても有用なアジュバントは以下の通りである。

#### 【0127】

非経口投与用アジュバントには、水酸化アルミニウム、リン酸アルミニウム、およびヒドロキシリン酸アルミニウムなどのアルミニウム化合物が挙げられる。標準プロトコールに従い、抗原をアルミニウム化合物で沈降させる、またはそれに吸着させる。R I B I (ImmunoChem, Hamilton, MT)などの他のアジュバントも非経口投与に用いられる。

#### 【0128】

粘膜投与用アジュバントには細菌毒、例えばコレラ毒(C T)、大腸菌易熱性毒(L T)、クロストリジウム・ディフィシル(*Clostridium difficile*)毒Aおよび百日咳毒(P T)、もしくはその組合せ、サブユニット、変性毒素、または天然

コレラ毒サブユニットB (CTB)の精製製剤などのその変異体が挙げられる。これらの毒素のいずれに対する断片、相同体、誘導体、および融合物もアジュバント活性を保有している場合にはそれらもまた適当である。好ましくは弱毒化した変異体を用いる。好適な変異体は、例えばW095/17211 (Arg-7-Lys CT変異体)、W096/06627 (Arg-192-Gly LT変異体)、およびW095/34323 (Arg-9-LysおよびGlu-129-Gly PT変異体)に記載される。本発明の方法および組成物において用いられるさらなるLT変異体には、例えばSer-63-Lys、Ala-69Gly、Glu-110-Asp、およびGlu-112-Asp変異体が挙げられる。例えば大腸菌、サルモネラ・ミネソタ (*Salmonella minnesota*)、ネズミチフス菌、またはシゲラ・フレクスネリ (*Shigella Flexneri*)の細菌モノホスホリル脂質A (MPLA)；サポニン、またはポリアクチドグリコリド (PLGA)ミクロスフェアなどの他のアジュバントも粘膜投与に用いられる。

#### 【0129】

粘膜および非経口投与の双方に有用なアジュバントには、ポリホスファゼン (W095/02415)、DC-cho1(3b-(N-(N', N'-ジメチルアミノメタン)-カルバモイル)コレステロール；米国特許第5,283,185号およびW096/14831)およびQS-21 (W088/09336)が挙げられる。

#### 【0130】

本発明のポリヌクレオチド、ポリペプチド、ポリペプチド誘導体、または抗体を含有する本発明の医薬組成物は常法で製造される。特に医薬上許容される希釈剤または担体、例えば水またはリン酸緩衝生理食塩水などの生理食塩水とともに処方される。一般に希釈剤または担体は投与形ならびに経路、および医薬上の標準法に基づき選択される。好適な医薬上の担体または希釈剤、ならびに医薬製剤における使用に医薬上必要不可欠なものは、Remington's Pharmaceutical Sciences、当分野における標準的な参照文献およびUSP/NFに記載されている。

#### 【0131】

本発明はまた、本発明のクラミジアポリペプチドおよび粘膜アジュバントと抗生物質、制酸剤、スクラルファート、またはその組合せとを併用した経口投与によりクラミジア感染症を治療する方法も含む。ワクチン抗原およびアジュバント

とともに投与し得るかかかる化合物の例としては、例えばマクロライド、テトラサイクリン、およびその誘導体（用い得る抗生物質の特異例として、アジトロマイシンもしくはドキシサイクリンまたはサイトカインもしくはステロイド類などの免疫調節剤が挙げられる）などの抗生物質がある。さらにも結合した1種を超える上記成分を含有する化合物を用いる。本発明はまたこれらの方法を行うための組成物、すなわち医薬上許容される担体または希釈剤中に本発明のクラミジア抗原（または抗体）、アジュバント、および1種以上の上記の化合物を含有する組成物も含む。

#### 【0132】

最近、60kDaのシステイン豊富な外膜タンパク質は、ヒトにおいて保存されているエピトープ、ネズミ ミオシン重鎖エピトープM7A - と交差反応する配列を含んでいることが示されている(Bachmaier et al., Science (1999) 283:1335)。この交差反応性は心血管疾患の発症の一因であることを示しているの、ワクチンとして使用される場合はそのタンパク質からこのエピトープおよびヒト抗原と交差反応するその他のエピトープのいずれもを除去するのが有効であり得る。従って、本発明のさらなる具体例は、例えばタンパク質をコードするポリヌクレオチドからエピトープをコードするヌクレオチドを欠失させるまたは置換して、ワクチンとしてのタンパク質の有効性と安全性を向上させることでコード配列を改変することを含む。ヒト抗原との望ましくない相同性または交差反応性を持つことがわかっているいずれの防御抗原に対しても同様のアプローチが適当であり得る。

#### 【0133】

本発明の方法および組成物において用いられる上記化合物の量については当業者ならば容易に求められる。治療/免疫化計画についても公知であり、当業者によって容易に計画される。例えば、非ワクチン成分を1～14日目に投与して、ワクチン抗原+アジュバントを7、14、21、および28日目に投与することが可能である。

#### 【0134】

#### 【実施例】

上記の開示は一般に本発明を説明するものである。さらに完全な理解は以下の具体的な例により得られる。これらの例は単に例示のために記載されるものであって、本発明の範囲を限定しようとするものではない。状況が提案されまたは便宜となる限り、形態の変更および同等物との置換も考えられる。ここでは特定の用語が用いられているが、かかる用語は説明を意図したものであって、限定しようとするものではない。

### 【0135】

#### 例1:

この例はOMP（外膜タンパク質）遺伝子を含むプラスミドベクター pC A m g p 0 0 2 の調製を示すものである。

OMP（外膜タンパク質）遺伝子を5'プライマー（5'ATAAGAATGCGGCCGCCACC ATGGGACTATTCCATCTAACTCTC 3'）（配列番号3）および3'プライマー（5'GCGCC GGATCCCCTCCACAATTTTTATGAGTAAGCC 3'）（配列番号4）を用いるポリメラーゼ連鎖反応（PCR）によって、肺炎クラミジア・ゲノムDNAから増幅した。5'プライマーはNot I制限部位、リボゾーム結合部位、開始コドン、およびOMP（外膜タンパク質）コード配列の5'末端配列を含む。3'プライマーはOMP（外膜タンパク質）のC末端配列をコードする配列およびBamHI制限部位を含む。停止コドンを除き、さらなるヌクレオチドを挿入してヒスチジンタグとのフレーム内融合物を得た。

増幅後、QIAquick(商標)PCR精製キット(Qiagen)を用いてPCR断片を精製し、その後Not IおよびBamHIで消化し、ヒトCMVプロモーターの制御下で転写する例2に記載のpCA-My c - Hi s 真核生物発現ベクター（図3）へ挿入した。

### 【0136】

#### 例2:

この例は真核生物発現ベクター pC A / My s - Hi s の調製を示す。

プラスミド p c DNA 3 . 1 (-) My c - Hi s C (Invitrogen) を S p e I および B a m H I で制限処理してCMVプロモーターを除去し、残りのベクター断片を単離した。プラスミド V R - 1 0 1 2 (Vical)由来のCMVプロモーターお

よびイントロンAをSpe I / BamHI断片上に単離した。これらの断片を連結してプラスミドpCA / Myc - Hisを作出した。OMP (外膜タンパク質) 遺伝子を含んだPCR断片をNot I / BamHIで制限処理したものをNot IおよびBamHIで制限処理したプラスミドpCA / Myc - Hisと連結してプラスミドpCAmgp002を作出した(図3)。

#### 【0137】

得られたプラスミドpCAmgp002をエレクトロポレーションによって大腸菌XL-1ブルー(Stratagene)へトランスフェクトし、これを50 µg/mlのカルベニシリンを含むLB培地で増殖させた。プラスミドはエンド・フリー・プラスミド・ギガ・キット(商標)(Qiagen)大スケールDNA精製系によって単離した。DNA濃度は260nmの吸光度で求め、ゲル電気泳動に付して臭化エチジウム染色し、分子量標準と比較してプラスミドを確認した。遺伝子の5'および3'末端はLicorモデル4000LDNAシーケンサーおよびIRD-800標識プライマーを用いた配列決定によって確認した。

#### 【0138】

##### 例3:

この例は肺炎クラミジアの鼻腔攻撃に対する防御を達成するためのマウスの免疫化を示す。

これまでに、マウスが肺炎クラミジアの種々の単離物による鼻腔内感染に感受性があることが示されている(Yang et al., 1993)。AR-39株(Grayston, 1989)は、裸のDNAとして送達されたクラミジア遺伝子産物の致死下の肺炎クラミジアの肺感染に対する防御応答を誘起する能力を調べるための抗原投与感染モデルとしてBal/cマウスにおいて用いた。防御免疫は肺感染の加速化されたクリアランスと定義される。

#### 【0139】

7~9週齢の雄Bal/cマウス群(6~10匹/群)を例1および2に記載の肺炎クラミジアOMP(外膜タンパク質)のコード配列を含むプラスミドDNAで筋肉内(i.m.)および鼻腔内(i.n.)感作させた。対照個体群には生理食塩水またはクラミジア遺伝子の挿入物を欠いたプラスミドベクターを与えた。

## 【0140】

i.m.感作では、0、3および6週の3回、PBS 50  $\mu$ l 中DNA 100  $\mu$ g を左、右の四頭筋に交互に注射した。i.n.感作では、0、3および6週の3回、DNA 50  $\mu$ g を含むPBS 50  $\mu$ l を麻酔したマウスに吸入させた。8週目に、致死下の肺炎クラミジア抗原投与の増殖を制限する能力を試験するために、免疫化したマウスにSPGバッファー100  $\mu$ l 中の肺炎クラミジアAR39株  $5 \times 10^5$  IFUを鼻腔内接種した。

## 【0141】

抗原投与後9日目にマウスから肺を摘出し、直ちにSPGバッファー(7.5%スクロース、5mMグルタミン酸塩、12.5mMリン酸塩 pH7.5)中で本発明ホモジネートした。このホモジネートはアッセイまで-70℃で凍結保存した。ホモジネート希釈物を感受性細胞の単層に接種することで感染性クラミジアの存在に関してアッセイした。この接種物を3000rpmで1時間細胞上へ遠心分離した後、シクロヘキシミド1  $\mu$ g/mlの存在下で35℃にて3日間インキュベートした。単層のインキュベーション後、ホルマリンおよびメタノールで固定し、次ぎに肺炎クラミジアおよびペルオキシダーゼ基質として金属で増強したDABを感染させたウサギからの回復期血清を用いてクラミジア封入体の存在に対して免疫ペルオキシダーゼ染色した。

## 【0142】

図4および表1は、pCAmgp002をi.n.およびi.m.感作させたマウスの肺のクラミジア力価が9日目で6例中5例で41,000未満であり(平均29,783)、一方、生理食塩水有感作させた偽性の対照マウスの値の範囲は9日目で13,600~458,100IFU/肺(平均107,641)であった。別のプラスミドDNA構築物のpCABk917では防御できず、感作マウスの肺の力価は生理食塩水有感作させた対照マウスで得られたものと同等であったので(平均85,350IFU/肺)、DNAの感作自体は認められた防御効果の一因ではなかった。構築物pCABk917は、OMP(外膜タンパク質)をコードするヌクレオチド配列がオープンリーディングフレームをベースとする他の仮性外膜タンパク質をコードする肺炎クラミジアヌクレオチド配列に置換され

ていること以外は、pCAmgp002と同一である。

【0143】

【表1】

マウス	種々のDNA感作構築物で免疫化したBAL/Cマウスの肺 における細菌存在量（封入体形成単位/肺）		
	免疫構築物		
	生理食塩水	pCABK917	pCAmgp002
	9日目	9日目	9日目
1	9000	72400	18100
2	69600	108000	40500
3	136400	24700	92700
4	458100	0	18600
5	166500	83600	5300
6	49500	223400	3500
7	13600		
8	150600		
9	37600		
10	179700		
11	91100		
12	289400		
13	16200		
14	233300		
15	36300		
16	132700		
17	57300		
18	36900		
19	115000		
20	108000		
21	32600		
22	33400		
23	16300		
24	33300		
平均	107641.7	85350	29783.33
SD	104011.6	78364.07	33541.52
Wilcoxon p		0.6223	0.02756

【配列表】

## SEQUENCE LISTING

<110> Aventis Pasteur Limited

5 <120> Chlamydia antigens and corresponding DNA fragments and uses thereof

<130> 77813-26

<140>

10 <141>

<150> US 60/154,652

<151> 1999-09-20

15 <160> 4

<170> PatentIn Ver. 2.0

<210> 1

20 <211> 1907

<212> DNA

<213> Chlamydia pneumoniae

<220>

25 <221> CDS

<222> (101)..(1804)

<400> 1

30 gtggccttgat tttgaaaaag gtccatggat gtgtttataa tgttcaaggt ctccctatcc 60

aaacattgaa ataacttgeta gaggagtga acatcgatct atg gga cta ttc cat 115  
Met Gly Leu Phe His  
1 5

35 cta act ctc ttt gga ctt tta ttg tgt agt ctt ccc att tct ctt gtt 163  
Leu Thr Leu Phe Gly Leu Leu Leu Cys Ser Leu Pro Ile Ser Leu Val  
10 15 20

40 gct aaa ttc cct gag tct gta ggt cat aag atc ctt tat ata agt acg 211  
Ala Lys Phe Pro Glu Ser Val Gly His Lys Ile Leu Tyr Ile Ser Thr  
25 30 35

45 caa tct aca cag cag gcc tta gca aca tat ctg gaa gct cta gat gcc 259  
Gln Ser Thr Gln Gln Ala Leu Ala Thr Tyr Leu Glu Ala Leu Asp Ala  
40 45 50

50 tac ggt gat cat gac ttc ttc gtt tta aga aaa atc gga gaa gac tat 307  
Tyr Gly Asp His Asp Phe Phe Val Leu Arg Lys Ile Gly Glu Asp Tyr  
55 60 65

55 ctc aag caa agc atc cac tcc tca gat ccg caa act aga aaa agc acc 355  
Leu Lys Gln Ser Ile His Ser Ser Asp Pro Gln Thr Arg Lys Ser Thr  
70 75 80 85

60 atc att gga gca ggc ctg gcg gga tct tca gaa gcc ttg gac gtg ctc 403  
Ile Ile Gly Ala Gly Leu Ala Gly Ser Ser Glu Ala Leu Asp Val Leu  
90 95 100

tcc caa gct atg gaa act gca gac ccc ctg cag cag cta ctg gtt tta 451  
Ser Gln Ala Met Glu Thr Ala Asp Pro Leu Gln Gln Leu Leu Val Leu  
105 110 115

	tcg gca gtc toa gga cat ctt ggg aaa acg tct gac gac tta ctg ttt	499
	Ser Ala Val Ser Gly His Leu Gly Lys Thr Ser Asp Asp Leu Leu Phe	
	120 125 130	
5	aaa gct tta gca tct ccc tat cct gtc atc cgc tta gaa gcc gcc tat	547
	Lys Ala Leu Ala Ser Pro Tyr Pro Val Ile Arg Leu Glu Ala Ala Tyr	
	135 140 145	
10	aga ctt gct aat ttg aag aac act aaa gtc att gat cat cta cat tct	595
	Arg Leu Ala Asn Leu Lys Asn Thr Lys Val Ile Asp His Leu His Ser	
	150 155 160	
15	ttc att cat aag ctt ccc gaa gaa atc caa tgc cta tct gcg gca ata	643
	Phe Ile His Lys Leu Pro Glu Glu Ile Gln Cys Leu Ser Ala Ala Ile	
	170 175	
20	ttc cta cgc ttg gag act gaa gaa tct gat gct tat att egg gat ctc	691
	Phe Leu Arg Leu Glu Thr Glu Glu Ser Asp Ala Tyr Ile Arg Asp Leu	
	185 190 195	
25	tta gct gcc aag aaa agc gcg att cgg agt gcc aca gct ttg cag atc	739
	Leu Ala Ala Lys Lys Ser Ala Ile Arg Ser Ala Thr Ala Leu Gln Ile	
	200 205 210	
30	gga gaa tac caa caa aaa cgc ttt ctt ccg aca ctt agg aat ttg cta	787
	Gly Glu Tyr Gln Gln Lys Arg Phe Leu Pro Thr Leu Arg Asn Leu Leu	
	215 220 225	
35	acg agt gcg tct cct caa gat caa gaa gct att ctt tat gct tta ggg	835
	Thr Ser Ala Ser Pro Gln Asp Gln Glu Ala Ile Leu Tyr Ala Leu Gly	
	230 235 240 245	
40	aag ctt aag gat ggt cag agc tac tac aat ata aaa aag caa ttg cag	883
	Lys Leu Lys Asp Gly Gln Ser Tyr Tyr Asn Ile Lys Lys Gln Leu Gln	
	250 255 260	
45	aag cct gat gtg gat gtc act tta gca gca gct caa gct tta att gct	931
	Lys Pro Asp Val Asp Val Thr Leu Ala Ala Gln Ala Leu Ile Ala	
	265 270 275	
50	ttg ggg aaa gaa gag gac gct ctt ccc gtg ata aaa aag caa gca ctt	979
	Leu Gly Lys Glu Glu Asp Ala Leu Pro Val Ile Lys Lys Gln Ala Leu	
	280 285 290	
55	gag gag cgg cct cga gcc ctg tat gcc tta cgg cat cta ccc tct gag	1027
	Glu Glu Arg Pro Arg Ala Leu Tyr Ala Leu Arg His Leu Pro Ser Glu	
	295 300 305	
60	ata ggg att ccg att gcc ctg ccg ata ttc cta aaa act aag aac agc	1075
	Ile Gly Ile Pro Ile Ala Leu Pro Ile Phe Leu Lys Thr Lys Asn Ser	
	310 315 320 325	
65	gaa gcc aag ttg aat gta gct tta gct ctc tta gag tta ggg tgt gac	1123
	Glu Ala Lys Leu Asn Val Ala Leu Ala Leu Leu Glu Leu Gly Cys Asp	
	330 335 340	
70	acc cct aaa cta ctg gaa tac att acc gaa agg ctt gtc caa cca cat	1171
	Thr Pro Lys Leu Leu Glu Tyr Ile Thr Glu Arg Leu Val Gln Pro His	
	345 350 355	

	tat aat gag act cta gcc ttg agt ttc tct aag ggg cgt act tta caa	1219
	Tyr Asn Glu Thr Leu Ala Leu Ser Phe Ser Lys Gly Arg Thr Leu Gln	
	360 365 370	
5	aat tgg aag egg gtg aac atc ata gtc cct caa gat ccc cag gag agg	1267
	Asn Trp Lys Arg Val Asn Ile Ile Val Pro Gln Asp Pro Gln Glu Arg	
	375 380 385	
10	gaa agg ttg ctc tcc aca acc cga ggt ctt gaa gag cag atc ctt acg	1315
	Glu Arg Leu Leu Ser Thr Thr Arg Gly Leu Glu Glu Gln Ile Leu Thr	
	390 395 400 405	
15	ttt ctc ttc cgc cta cct aaa gaa gct tac ctc ccc tgt att tat aag	1363
	Phe Leu Phe Arg Leu Pro Lys Glu Ala Tyr Leu Pro Cys Ile Tyr Lys	
	410 415 420	
20	ctt ttg gcg agt cag aaa act cag ctt gcc act act gcg att tct ttt	1411
	Leu Leu Ala Ser Gln Lys Thr Gln Leu Ala Thr Thr Ala Ile Ser Phe	
	425 430 435	
25	tta agt cac acc tca cat cag gaa gcc tta gat cta ctt ttc caa gct	1459
	Leu Ser His Thr Ser His Gln Glu Ala Leu Asp Leu Leu Phe Gln Ala	
	440 445 450	
30	gcg aag ctt cct gga gaa cct atc atc cgc gcc tat gca gat ctt gct	1507
	Ala Lys Leu Pro Gly Glu Pro Ile Ile Arg Ala Tyr Ala Asp Leu Ala	
	455 460 465	
35	att tat aat ctc acc aaa gat cct gaa aaa aaa cgt tct ctc cat gat	1555
	Ile Tyr Asn Leu Thr Lys Asp Pro Glu Lys Lys Arg Ser Leu His Asp	
	470 475 480 485	
40	tat gca aaa aag cta att cag gaa acc ttg tta ttt gtg gac acg gaa	1603
	Tyr Ala Lys Lys Leu Ile Gln Glu Thr Leu Leu Phe Val Asp Thr Glu	
	490 495 500	
45	aac caa aga ccc cat ccc agc atg ccc tat cta cgt tat cag gtc acc	1651
	Asn Gln Arg Pro His Pro Ser Met Pro Tyr Leu Arg Tyr Gln Val Thr	
	505 510 515	
50	cca gaa agc cgt acg aag ctc atg ttg gat att cta gag aca cta gcc	1699
	Pro Glu Ser Arg Thr Lys Leu Met Leu Asp Ile Leu Glu Thr Leu Ala	
	520 525 530	
55	acc tcg aag tct tcc gaa gat atc cgt tta ttg ata caa ctg atg acg	1747
	Thr Ser Lys Ser Ser Glu Asp Ile Arg Leu Leu Ile Gln Leu Met Thr	
	535 540 545	
60	gaa gga gat gca aaa aat ttc cca gtc ctt gca ggc tta ctc ata aaa	1795
	Glu Gly Asp Ala Lys Asn Phe Pro Val Leu Ala Gly Leu Leu Ile Lys	
	550 555 560 565	
65	att gtg gag taacccccac ctacgtctta tgaaacggtg cttcttattt	1844
	Ile Val Glu	
	ctagcttcct ttgttcttat gggttcctca gctgatgctt tgactcatca agaggtgtg	1904
	aaa	1907

<210> 2  
 <211> 568  
 <212> PRT  
 5 <213> Chlamydia pneumoniae  
  
 <400> 2  
 Met Gly Leu Phe His Leu Thr Leu Phe Gly Leu Leu Leu Cys Ser Leu  
     1                                  5                                  10                                  15  
 10 Pro Ile Ser Leu Val Ala Lys Phe Pro Glu Ser Val Gly His Lys Ile  
                                   20                                  25                                  30  
 15 Leu Tyr Ile Ser Thr Gln Ser Thr Gln Gln Ala Leu Ala Thr Tyr Leu  
                                   35                                  40                                  45  
   Glu Ala Leu Asp Ala Tyr Gly Asp His Asp Phe Phe Val Leu Arg Lys  
                                   50                                  55                                  60  
 20 Ile Gly Glu Asp Tyr Leu Lys Gln Ser Ile His Ser Ser Asp Pro Gln  
                                   65                                  70                                  75                                  80  
   Thr Arg Lys Ser Thr Ile Ile Gly Ala Gly Leu Ala Gly Ser Ser Glu  
                                   85                                  90                                  95  
 25 Ala Leu Asp Val Leu Ser Gln Ala Met Glu Thr Ala Asp Pro Leu Gln  
                                   100                                  105  
 30 Gln Leu Leu Val Leu Ser Ala Val Ser Gly His Leu Gly Lys Thr Ser  
                                   115                                  120                                  125  
   Asp Asp Leu Leu Phe Lys Ala Leu Ala Ser Pro Tyr Pro Val Ile Arg  
                                   130                                  135                                  140  
 35 Leu Glu Ala Ala Tyr Arg Leu Ala Asn Leu Lys Asn Thr Lys Val Ile  
                                   145                                  150                                  155                                  160  
   Asp His Leu His Ser Phe Ile His Lys Leu Pro Glu Glu Ile Gln Cys  
                                   165                                  170                                  175  
 40 Leu Ser Ala Ala Ile Phe Leu Arg Leu Glu Thr Glu Glu Ser Asp Ala  
                                   180                                  185                                  190  
 45 Tyr Ile Arg Asp Leu Leu Ala Ala Lys Lys Ser Ala Ile Arg Ser Ala  
                                   195                                  200                                  205  
   Thr Ala Leu Gln Ile Gly Glu Tyr Gln Gln Lys Arg Phe Leu Pro Thr  
                                   210                                  215                                  220  
 50 Leu Arg Asn Leu Leu Thr Ser Ala Ser Pro Gln Asp Gln Glu Ala Ile  
                                   225                                  230                                  235                                  240  
   Leu Tyr Ala Leu Gly Lys Leu Lys Asp Gly Gln Ser Tyr Tyr Asn Ile  
                                   245                                  250                                  255  
 55 Lys Lys Gln Leu Gln Lys Pro Asp Val Asp Val Thr Leu Ala Ala Ala  
                                   260                                  265                                  270  
 60 Gln Ala Leu Ile Ala Leu Gly Lys Glu Glu Asp Ala Leu Pro Val Ile  
                                   275                                  280                                  285



```

    <210> 3
    <211> 44
    <212> DNA
5   <213> Artificial Sequence
    <220> primer
    <223> 5' PCR primer

10  <400> 3

    ataagaatgc ggccgccaacc atgggactat tccatctaac tetc          44

    <210> 4
15  <211> 36
    <212> DNA
    <213> Artificial Sequence
    <220> primer
    <223> 3' PCR primer

20  <400> 4

    gcgcccgatc ccctccacaa tttttatgag taagcc          36

```

### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

肺炎クラミジア由来のOMP（外膜タンパク質）遺伝子のヌクレオチド配列（配列番号1）およびOMP（外膜タンパク質）の推定アミノ酸配列（配列番号2）を示す。

#### 【図2】

肺炎クラミジアOMP（外膜タンパク質）遺伝子の制限酵素解析を示す。

#### 【図3】

プラスミドpCAmgp002の構成および構成要素を示す。

#### 【図4】

DNA感作後のpCAmgp002による肺炎クラミジア感染に対する防御を示す。

## 【図1】

## 肺炎クラミジアOMP(外膜タンパク質)遺伝子の配列

```

gtggcttgat tttgaaaaag gtccatggat gtgtttataa tgttcaaggt ctcccstatcc 60
aacattgaa atacttgcta gaggagtga acatcgatct atg gga cta ttc cat 115
                                     Met Gly Leu Phe His
                                     1 5
cta act ctc ttt gga ctt tta ttg tgt agt ctt ccc att tct ctt gtt 163
Leu Thr Leu Phe Gly Leu Leu Leu Cys Ser Leu Pro Ile Ser Leu Val
                                     10 15 20
gct aaa ttc cct gag tct gta ggt cat aag atc ctt tat ata agt acg 211
Ala Lys Phe Pro Glu Ser Val Gly His Lys Ile Leu Tyr Ile Ser Thr
                                     25 30 35
caa tct aca cag cag gcc tta gca aca tat ctg gaa gct cta gat gcc 259
Gln Ser Thr Gln Gln Ala Leu Ala Thr Tyr Leu Glu Ala Leu Asp Ala
                                     40 45 50
tac ggt gat cat gac ttc ttc gtt tta aga aaa atc gga gaa gac tat 307
Tyr Gly Asp His Asp Phe Phe Val Leu Arg Lys Ile Gly Glu Asp Tyr
                                     55 60 65
ctc aag caa agc atc cac tcc tca gat ccg caa act aga aaa agc acc 355
Leu Lys Gln Ser Ile His Ser Ser Asp Pro Gln Thr Arg Lys Ser Thr
                                     70 75 80 85
atc att gga gca ggc ctg gcg gga tct tca gaa gcc ttg gac gtg ctc 403
Ile Ile Gly Ala Gly Leu Ala Gly Ser Ser Glu Ala Leu Asp Val Leu
                                     90 95 100
tcc caa gct atg gaa act gca gac ccc ctg cag cag cta ctg gtt tta 451
Ser Gln Ala Met Glu Thr Ala Asp Pro Leu Gln Gln Leu Leu Val Leu
                                     105 110 115
tcg gca gtc tca gga cat ctt ggg aaa act tct gac gac tta ctg ttt 499
Ser Ala Val Ser Gly His Leu Gly Lys Thr Ser Asp Asp Leu Leu Phe
                                     120 125 130
aaa gct tta gca tct ccc tat cct gtc atc cgc tta gaa gcc gcc tat 547
Lys Ala Leu Ala Ser Pro Tyr Pro Val Ile Arg Leu Glu Ala Ala Tyr
                                     135 140 145
aga ctt gct aat ttg aag aac act aaa gtc att gat cat cta cat tct 595
Arg Leu Ala Asn Leu Lys Asn Thr Lys Val Ile Asp His Leu His Ser
                                     150 155 160 165
ttc att cat aag ctt ccc gaa gaa atc caa tgc cta tct gcg gca ata 643
Phe Ile His Lys Leu Pro Glu Glu Ile Gln Cys Leu Ser Ala Ala Ile
                                     170 175 180
ttc cta cgc ttg gag act gaa gaa tct gat gct tat att cgg gat ctc 691
Phe Leu Arg Leu Glu Thr Glu Glu Ser Asp Ala Tyr Ile Arg Asp Leu
                                     185 190 195
tta gct gcc aag aaa agc gcg att cgg agt gcc aca gct ttg cag atc 739
Leu Ala Ala Lys Lys Ser Ala Ile Arg Ser Ala Thr Ala Leu Gln Ile
                                     200 205 210

```

## 【図1-1】

gga gaa tac caa caa aaa cgc ttt ctt ccg aca ctt agg aat ttg cta	787
Gly Glu Tyr Gln Gln Lys Arg Phe Leu Pro Thr Leu Arg Asn Leu Leu	
215 220 225	
acg agt gcg tct cct caa gat caa gaa gct att ctt tat gct tta ggg	835
Thr Ser Ala Ser Pro Gln Asp Gln Glu Ala Ile Leu Tyr Ala Leu Gly	
230 235 240 245	
aag ctt aag gat ggt cag agc tac tac aat ata aaa aag caa ttg cag	883
Lys Leu Lys Asp Gly Gln Ser Tyr Tyr Asn Ile Lys Lys Gln Leu Gln	
250 255 260	
aag cct gat gtg gat gtc act tta gca gca gct caa gct tta att gct	931
Lys Pro Asp Val Asp Val Thr Leu Ala Ala Ala Gln Ala Leu Ile Ala	
265 270 275	
ttg ggg aaa gaa gag gac gct ctt ccc gtg ata aaa aag caa gca ctt	979
Leu Gly Lys Glu Glu Asp Ala Leu Pro Val Ile Lys Lys Gln Ala Leu	
280 285 290	
gag gag cgg cct cga gcc ctg tat gcc tta cgg cat cta ccc tct gag	1027
Glu Glu Arg Pro Arg Ala Leu Tyr Ala Leu Arg His Leu Pro Ser Glu	
295 300 305	
ata ggg att ccg att gcc ctg ccg ata ttc cta aaa act aag aac agc	1075
Ile Gly Ile Pro Ile Ala Leu Pro Ile Phe Leu Lys Thr Lys Asn Ser	
310 315 320 325	
gaa gcc aag ttg aat gta gct tta gct ctc tta gag tta ggg tgt gac	1123
Glu Ala Lys Leu Asn Val Ala Leu Ala Leu Leu Glu Leu Gly Cys Asp	
330 335 340	
acc cct aaa cta ctg gaa tac att acc gaa agg ctt gtc caa cca cat	1171
Thr Pro Lys Leu Leu Glu Tyr Ile Thr Glu Arg Leu Val Gln Pro His	
345 350 355	
tat aat gag act cta gcc ttg agt ttc tct aag ggg cgt act tta caa	1219
Tyr Asn Glu Thr Leu Ala Leu Ser Phe Ser Lys Gly Arg Thr Leu Gln	
360 365 370	
aat tgg aag cgg gtg aac atc ata gtc cct caa gat ccc cag gag agg	1267
Asn Trp Lys Arg Val Asn Ile Ile Val Pro Gln Asp Pro Gln Glu Arg	
375 380 385	
gaa agg ttg ctc tcc aca acc cga ggt ctt gaa gag cag atc ctt acg	1315
Glu Arg Leu Leu Ser Thr Thr Arg Gly Leu Glu Glu Gln Ile Leu Thr	
390 395 400 405	
ttt ctc ttc cgc cta cct aaa gaa gct tac ctc ccc tgt att tat aag	1363
Phe Leu Phe Arg Leu Pro Lys Glu Ala Tyr Leu Pro Cys Ile Tyr Lys	
410 415 420	
ctt ttg gcg agt cag aaa act cag ctt gcc act act gcg att tct ttt	1411
Leu Leu Ala Ser Gln Lys Thr Gln Leu Ala Thr Thr Ala Ile Ser Phe	
425 430 435	
tta agt cac acc tca cat cag gaa gcc tta gat cta ctt ttc caa gct	1459
Leu Ser His Thr Ser His Gln Glu Ala Leu Asp Leu Leu Phe Gln Ala	
440 445 450	

## 【図1-2】

```

gcg aag ctt cct gga gaa cct atc atc cgc gcc tat gca gat ctt gct 1507
Ala Lys Leu Pro Gly Glu Pro Ile Ile Arg Ala Tyr Ala Asp Leu Ala
455 460 465

att tat aat ctc acc aaa gat cct gaa aaa aaa cgt tct ctc cat gat 1555
Ile Tyr Asn Leu Thr Lys Asp Pro Glu Lys Lys Arg Ser Leu His Asp
470 475 480 485

tat gca aaa aag cta att cag gaa acc ttg tta ttt gtg gac acg gaa 1603
Tyr Ala Lys Lys Leu Ile Gln Glu Thr Leu Leu Phe Val Asp Thr Glu
490 495 500

aac caa aga ccc cat ccc agc atg ccc tat cta cgt tat cag gtc acc 1651
Asn Gln Arg Pro His Pro Ser Met Pro Tyr Leu Arg Tyr Gln Val Thr
505 510 515

cca gaa agc cgt acg aag ctc atg ttg gat att cta gag aca cta gcc 1699
Pro Glu Ser Arg Thr Lys Leu Met Leu Asp Ile Leu Glu Thr Leu Ala
520 525 530

acc tcg aag tct tcc gaa gat atc cgt tta ttg ata caa ctg atg acg 1747
Thr Ser Lys Ser Ser Glu Asp Ile Arg Leu Leu Ile Gln Leu Met Thr
535 540 545

gaa gga gat gca aaa aat ttc cca gtc ctt gca ggc tta ctc ata aaa 1795
Glu Gly Asp Ala Lys Asn Phe Pro Val Leu Ala Gly Leu Leu Ile Lys
550 555 560 565

att gtg gag taacccaac ctacgtctta tgaacggtg cttcttattt 1844
Ile Val Glu


ctagcttcct ttgttcttat gggttcctca gctgatgctt tgactcatca agaggctgtg 1904

aaa 1907

```




【図2-1】







【図2-3】




【図2-4】




【図2-5】




【図2-6】




【図2-7】



【図2-8】




【図3】



【図4】

pCAmg002によるDNA免疫化の防御効果



【手続補正書】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書

【提出日】平成13年10月19日(2001.10.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ワクチンにおいて好適に使用できる生理学的に許容される希釈剤または担体と

、

(a) 第一のポリペプチドをコードする、第一の核酸、

(b) 第一のポリペプチド、

(c) 第一のポリペプチドと第二のポリペプチドとを含んでなる、融合タンパク質、または

(d) 融合タンパク質をコードする融合核酸

のいずれか一つと

を含んでなる、免疫防御ワクチンであって、

該第一のポリペプチドが、

(i) 配列番号1によってコードされるポリペプチド、

(ii) 配列番号1に由来する少なくとも38個の連続するヌクレオチドを含んでなる核酸配列によってコードされるポリペプチド、

(iii) 配列が配列番号2で示されるポリペプチド、

(iv) 配列番号2とアミノ酸配列において少なくとも75%の同一性を有するポリペプチド、

(v) 配列番号2に由来する少なくとも12個の連続するアミノ酸を含んでなる免疫原性断片、および

(vi) (i)~(iv)で定義されるポリペプチド、または免疫原性を失わずに改変された、(v)で定義される免疫原性断片であって、対応する(i)~(iv)のポリペプチ

ドまたは対応する(v)の断片とアミノ酸配列において少なくとも75%の同一性を有する、改変ポリペプチドまたは断片からなる群より選択され、

第一の核酸が発現可能なものである、免疫防御ワクチン。

【請求項2】

第一の核酸と、ワクチンベクターとを含んでなる、請求項1に記載の免疫防御ワクチンであって、

該第一の核酸が、

(i) 配列番号1、

(ii) 配列番号1によってコードされるポリペプチドをコードする核酸配列、

(iii) (i)および(ii)の核酸配列のいずれか一つに由来する少なくとも38個の連続するヌクレオチドを含んでなる、核酸配列、

(iv) 配列番号1によってコードされるポリペプチドと、アミノ酸配列において少なくとも75%の同一性を有するポリペプチドをコードする、核酸配列、

(v) 配列番号2で示されるポリペプチドをコードする、核酸配列、

(vi) 配列番号2に由来する少なくとも12個の連続するアミノ酸を含んでなる免疫原性断片をコードする核酸配列、および

(vii) (i)~(v)で定義されるポリペプチド、または免疫原性を失わずに改変された、(vi)で定義される免疫原性断片をコードする核酸配列であって、対応する(i)~(v)のポリペプチドまたは対応する(vi)の断片と、アミノ酸配列において少なくとも75%の同一性を有する、改変ポリペプチドまたは断片からなる群より選択される、免疫防御ワクチン。

【請求項3】

融合核酸と、ワクチンベクターとを含んでなる、請求項1に記載の免疫防御ワクチンであって、

該融合核酸が、

(i) 配列番号1、

(ii) 配列番号1によってコードされるポリペプチドをコードする核酸配列、

(iii) (i)および(ii)の核酸配列のいずれか一つに由来する少なくとも38個

の連続するヌクレオチドを含んでなる、核酸配列、

(iv) 配列番号1によってコードされるポリペプチドと、アミノ酸配列において少なくとも75%の同一性を有するポリペプチドをコードする、核酸配列、

(v) 配列が配列番号2で示されるポリペプチドをコードする、核酸配列、

(vi) 配列番号2に由来する少なくとも12個の連続するアミノ酸を含んでなる免疫原性断片をコードする核酸配列、および

(vii) (i)~(v)で定義されるポリペプチド、または免疫原性を失わずに改変された、(vi)で定義される免疫原性断片をコードする核酸配列であって、対応する(i)~(v)のポリペプチドまたは対応する(vi)の断片と、アミノ酸配列において少なくとも75%の同一性を有する、改変ポリペプチドまたは断片からなる群より選択される、第一の核酸を含んでなる、免疫防御ワクチン。

【請求項4】

第二のポリペプチドが異種シグナルペプチドである、請求項1~3のいずれか一項に記載の免疫防御ワクチン。

【請求項5】

第二のポリペプチドがアジュバント活性を有する、請求項1~3のいずれか一項に記載の免疫防御ワクチン。

【請求項6】

第一の核酸が1種以上の発現制御配列に作動可能に連結されている、請求項1~5のいずれか一項に記載の免疫防御ワクチン。

【請求項7】

第一の核酸がポリペプチドとして発現し、第一の核酸によって発現されるポリペプチドに対する免疫応答を増強する付加的なポリペプチドをコードする第二の核酸を含んでなる、請求項1~6のいずれか一項に記載の免疫防御ワクチン。

【請求項8】

第二の核酸が付加的なクラミジアポリペプチドをコードしている、請求項7に記載の免疫防御ワクチン。

【請求項9】

請求項1~8のいずれか一項に記載の免疫防御ワクチンと、医薬上許容される

担体とを含んでなる、医薬組成物。

【請求項10】

第一のポリペプチドを含んでなる、請求項1に記載の免疫防御ワクチン。

【請求項11】

融合タンパク質を含んでなる、請求項1に記載の免疫防御ワクチン。

【請求項12】

第二のポリペプチドが異種シグナルペプチドである、請求項11に記載の免疫防御ワクチン。

【請求項13】

第二のポリペプチドがアジュバント活性を有する、請求項11に記載の免疫防御ワクチン。

【請求項14】

第一のポリペプチドに対する免疫応答を増強する付加的なポリペプチドをさらに含んでなる、請求項10～13のいずれか一項に記載の免疫防御ワクチン。

【請求項15】

付加的なポリペプチドがクラミジアポリペプチドを含んでなる、請求項14に記載の免疫防御ワクチン。

【請求項16】

請求項10～15のいずれか一項に記載の免疫防御ワクチンと、医薬上許容される担体とを含んでなる、医薬組成物。

【請求項17】

請求項1～8および10～15のいずれか一項に記載の免疫防御ワクチンの有効量の、クラミジア感染症を予防または治療するための使用。

【請求項18】

図3で示される、発現プラスミドpCAMG002。

## 【國際調查報告】

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

 Intern. Appl. No.  
PCT/CA 00/01088

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
IPC 7	C12N15/31 C12N15/62 C12N15/85 C07K14/295 C07K16/12 A61K31/711 A61K39/118 A61K39/40 G01N33/53	
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C12N C07K A61K G01N		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, CHEM ABS Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DATABASE SWALL [Online] EBI; 1 May 1999 (1999-05-01) "Putative OMP" XP002157589 Acc. No. Q9Z9G0	1-34
X	WO 99 27105 A (GENSET SA ;GRIFFAIS REMY (FR)) 3 June 1999 (1999-06-03) abstract	1-15, 17-30
X	WO 98 58953 A (MADSEN ANNA SOFIE ;BIRKELUND SVEND (DK); KNUDSEN KATRINE (DK); MYG) 30 December 1998 (1998-12-30) page 1, paragraph 2 page 3, line 31 -page 4, line 16	33,34
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C.		<input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.
* Special categories of cited documents :		
*A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art *&* document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 17 January 2001		Date of mailing of the international search report 23. 01 2001
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo.nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Mata Vicente, T.

1

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.  
PCT/CA 00/01088**Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)**

This International Search Report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1.  Claims Nos.:  
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:  
see FURTHER INFORMATION sheet PCT/ISA/210
2.  Claims Nos.:  
because they relate to parts of the International Application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful International Search can be carried out, specifically:
3.  Claims Nos.:  
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

**Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)**

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1.  As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this International Search Report covers all searchable claims.
2.  As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.  As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this International Search Report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4.  No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this International Search Report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

**Remark on Protest**

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
- No protest accompanied the payment of additional search fees.

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/ 210

Continuation of Box I.1

Although claim 27 is directed to a method of treatment of the human/animal body, the search has been carried out and based on the alleged effects of the compound/composition.

As far as as "in vivo" method is concerned, claim 28 is directed to a diagnostic method practised on the human/animal body and the search has been carried out and based on the alleged effects of the compound/composition.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

information on patent family members

International Application No

PCT/CA 00/01088

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9927105 A	03-06-1999	AU 1170299 A	15-06-1999
		BR 9814878 A	03-10-2000
		EP 1032674 A	06-09-2000
WO 9858953 A	30-12-1998	AU 8011998 A	04-01-1999
		BR 9810288 A	19-09-2000
		CN 1261403 T	26-07-2000
		EP 1007685 A	14-06-2000

## フロントページの続き

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-マ-コ-ト' (参考)
A 6 1 K	39/395	A 6 1 K 48/00	4 C 0 8 4
	48/00	A 6 1 P 11/00	4 C 0 8 5
A 6 1 P	11/00	31/00	4 C 0 8 7
	31/00	C 0 7 K 14/295	4 H 0 4 5
C 0 7 K	14/295	16/12	
	16/12	19/00	
	19/00	C 1 2 N 1/15	
C 1 2 N	1/15	1/19	
	1/19	1/21	
	1/21	C 1 2 P 21/02	C
	5/10	C 1 2 Q 1/68	A
C 1 2 P	21/02	G 0 1 N 33/15	Z
C 1 2 Q	1/68	33/50	Z
G 0 1 N	33/15	33/53	D
	33/50	33/566	M
	33/53	33/569	F
	33/566	C 1 2 R 1:01	
	33/569	C 1 2 N 15/00	Z N A A
//(C 1 2 P 21/02		5/00	A
C 1 2 R 1:01)		A 6 1 K 37/02	

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW

(72)発明者 ジョー、ワング  
カナダ国オンタリオ州、トロント、アスペンウッド、ドライブ、51

(72)発明者 パメラ、ダン  
カナダ国オンタリオ州、ウッドブリッジ、ローズバリー、レイン、97

F ターム(参考) 2G045 AA29 AA40 CB17 CB21 DA12  
DA13 DA14 DA36 FB02 FB03  
FB07

4B024 AA01 BA31 CA04 CA07 DA06  
EA04 FA02 FA18 GA11 GA14

4B063 QA01 QA19 QQ03 QQ06 QQ43  
QQ79 QQ96 QR42 QR56 QR72  
QR75 QX01

4B064 AF27 AG26 AG31 CA02 CA06  
CA10 CA11 CA19 CA20 DA01  
DA13 DA15

4B065 AA01Y AA26X AA57X AA72X  
AA90X AB01 CA23 CA24  
CA25 CA45 CA46

4C084 AA02 AA07 AA13 BA01 BA08  
BA18 BA19 BA20 BA21 BA22  
BA44 CA03 CA53 NA14 ZA591  
ZA592 ZB321 ZB322

4C085 AA03 AA13 AA14 BA45 BB33  
CC07 CC32 EE01 EE05 EE06  
FF13

4C087 AA02 BC83 NA14 ZA59 ZB32

4H045 AA10 AA11 AA30 BA09 BA41  
BA54 CA11 DA75 DA86 EA20  
EA52 FA73 FA74

专利名称(译)	衣原体抗原和相应的DNA片段及其用途		
公开(公告)号	<a href="#">JP2003510050A</a>	公开(公告)日	2003-03-18
申请号	JP2001525362	申请日	2000-09-15
申请(专利权)人(译)	安万特，巴斯德有限公司		
[标]发明人	アンドリューディーマーディン レイモンドピーオーメン ジョーワング パメラダン		
发明人	アンドリュー、ディー.マーディン レイモンド、ピー.オーメン ジョー、ワング パメラ、ダン		
IPC分类号	G01N33/50 A61K9/127 A61K35/76 A61K38/00 A61K39/00 A61K39/02 A61K39/118 A61K39/395 A61K48/00 A61P11/00 A61P31/00 C07K14/295 C07K16/12 C07K19/00 C12N1/15 C12N1/19 C12N1 /21 C12N5/10 C12N15/09 C12N15/31 C12P21/02 C12Q1/68 C12R1/01 G01N33/15 G01N33/53 G01N33/566 G01N33/569		
CPC分类号	A61K9/127 A61K39/00 A61K39/118 A61K2039/53 A61P11/00 A61P31/00 C07K14/295 C07K2319/00 Y02A50/396 Y02A50/476 Y10S435/975		
FI分类号	A61K35/76 A61K39/00.H A61K39/118 A61K39/395.D A61K39/395.N A61K48/00 A61P11/00 A61P31 /00 C07K14/295 C07K16/12 C07K19/00 C12N1/15 C12N1/19 C12N1/21 C12P21/02.C C12Q1/68.A G01N33/15.Z G01N33/50.Z G01N33/53.D G01N33/53.M G01N33/566 G01N33/569.F C12R1/01 C12N15/00.ZNA.A C12N5/00.A A61K37/02		
F-TERM分类号	2G045/AA29 2G045/AA40 2G045/CB17 2G045/CB21 2G045/DA12 2G045/DA13 2G045/DA14 2G045 /DA36 2G045/FB02 2G045/FB03 2G045/FB07 4B024/AA01 4B024/BA31 4B024/CA04 4B024/CA07 4B024/DA06 4B024/EA04 4B024/FA02 4B024/FA18 4B024/GA11 4B024/GA14 4B063/QA01 4B063 /QA19 4B063/QQ03 4B063/QQ06 4B063/QQ43 4B063/QQ79 4B063/QQ96 4B063/QR42 4B063/QR56 4B063/QR72 4B063/QR75 4B063/QX01 4B064/AF27 4B064/AG26 4B064/AG31 4B064/CA02 4B064 /CA06 4B064/CA10 4B064/CA11 4B064/CA19 4B064/CA20 4B064/DA01 4B064/DA13 4B064/DA15 4B065/AA01Y 4B065/AA26X 4B065/AA57X 4B065/AA72X 4B065/AA90X 4B065/AB01 4B065/CA23 4B065/CA24 4B065/CA25 4B065/CA45 4B065/CA46 4C084/AA02 4C084/AA07 4C084/AA13 4C084 /BA01 4C084/BA08 4C084/BA18 4C084/BA19 4C084/BA20 4C084/BA21 4C084/BA22 4C084/BA44 4C084/CA03 4C084/CA53 4C084/NA14 4C084/ZA591 4C084/ZA592 4C084/ZB321 4C084/ZB322 4C085/AA03 4C085/AA13 4C085/AA14 4C085/BA45 4C085/BB33 4C085/CC07 4C085/CC32 4C085 /EE01 4C085/EE05 4C085/EE06 4C085/FF13 4C087/AA02 4C087/BC83 4C087/NA14 4C087/ZA59 4C087/ZB32 4H045/AA10 4H045/AA11 4H045/AA30 4H045/BA09 4H045/BA41 4H045/BA54 4H045 /CA11 4H045/DA75 4H045/DA86 4H045/EA20 4H045/EA52 4H045/FA73 4H045/FA74		
优先权	60/154652 1999-09-20 US		
其他公开文献	JP4667694B2 JP2003510050A5		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

#### 摘要(译)

本发明是一种使包括人在内的宿主的核酸(包括DNA)对由衣原体,特别是肺炎衣原体菌株感染引起的疾病敏感的方法,所述疾病包括肺炎衣原体菌株的OMP(外膜蛋白)基因。提供了在含有编码核苷酸序列的载体和宿主中使用表参(外膜蛋白)的方法。在本发明的范围内可以进行修改。

マウス	種々のDNA感作構築物で免疫化したBAL/Cマウスの肺 における細菌存在量 (封入体形成単位/肺)		
	生理食塩水 9日目	pCABK917 9日目	pCAmgp002 9日目
1	9000	72400	18100
2	69600	108000	40500
3	136400	24700	92700
4	458100	0	18600
5	166500	83600	5300
6	49500	223400	3500
7	13600		
8	150600		
9	37600		
10	179700		
11	91100		
12	289400		
13	16200		
14	233300		
15	36300		
16	132700		
17	57300		
18	36900		
19	115000		
20	108000		
21	32600		
22	33400		
23	16300		
24	33300		
平均	107641.7	85350	29783.33
SD	104011.6	78364.07	33541.52
Wilcoxon p		0.6223	0.02756