

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

WO2009/072385

発行日 平成23年4月21日 (2011. 4. 21)

(43) 国際公開日 平成21年6月11日 (2009. 6. 11)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
GO 1 N 33/543 (2006.01)	GO 1 N 33/543	5 8 1 A
GO 1 N 33/53 (2006.01)	GO 1 N 33/53	J
GO 1 N 33/545 (2006.01)	GO 1 N 33/545	B
GO 1 N 33/553 (2006.01)	GO 1 N 33/553	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 16 頁)

出願番号	特願2009-544622 (P2009-544622)	(71) 出願人	000231394 アルフレッサファーマ株式会社
(21) 国際出願番号	PCT/JP2008/070830		大阪府大阪市中央区石町2丁目2番9号
(22) 国際出願日	平成20年11月10日 (2008. 11. 10)	(74) 代理人	100104673 弁理士 南條 博道
(31) 優先権主張番号	特願2007-317669 (P2007-317669)	(74) 代理人	100163647 弁理士 進藤 卓也
(32) 優先日	平成19年12月7日 (2007. 12. 7)	(72) 発明者	柳谷 真理 日本国大阪府茨木市庄二丁目24番3号 アルフレッサファーマ株式会社診断薬研究 開発部内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	田中 睦 日本国大阪府茨木市庄二丁目24番3号 アルフレッサファーマ株式会社診断薬研究 開発部内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 微小粒子の凝集反応を用いる検体の免疫学的測定方法および測定用キット

(57) 【要約】

本発明は、免疫学的微小粒子の凝集反応を用いる検体の簡便な測定方法および測定用キットを提供する。本発明では、不溶性担体上に被測定物質または被測定物質の類似体と被測定物質を認識する物質に特異的に結合する物質とを共に結合させた微小粒子を用いて測定をすることにより、特別にハプテンを結合させた競合体を反応系に添加して被測定物質と競合体とを同時に競合させることなく、被測定物質中に特異的結合部位が少ない場合においても、より簡便に測定することを可能にした。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

検体中の被測定物質を測定する方法であって、

(a) 該被測定物質、第 1 の特異的結合物質、および微小粒子を混合する工程であって、該第 1 の特異的結合物質が、該被測定物質に特異的に結合し得る物質であり、該微小粒子が、該被測定物質または該被測定物質の類似体と、第 2 の特異的結合物質とを共に表面上に結合させた不溶性担体であり、そして該第 2 の特異的結合物質が、該第 1 の特異的結合物質に特異的に結合し得る物質である、工程；および

(b) 該工程 (a) で得られた該混合液において、該微小粒子の凝集反応を測定する工程；

10

を含む、方法。

【請求項 2】

前記被測定物質がハプテンであり、そして前記被測定物質の類似体がハプテン結合蛋白質である、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記被測定物質に特異的に結合し得る物質が、該被測定物質に対する抗体である、請求項 1 または 2 に記載の方法。

【請求項 4】

前記第 2 の特異的結合物質が、前記第 1 の特異的結合物質に対するモノクローナル抗体である、請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の方法。

20

【請求項 5】

前記被測定物質の類似体が、前記被測定物質に特異的に結合し得る物質と結合し得る認識部位、該認識部位の構造類似体、あるいは、それらが複数個結合した物質である、請求項 1 から 4 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 6】

前記不溶性担体が、ラテックスまたは金コロイドである、請求項 1 から 5 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 7】

被測定物質に特異的に結合し得る物質である第 1 の特異的結合物質を含む第一試薬；および

30

微小粒子を含む第二試薬であって、該微小粒子が、該被測定物質または該被測定物質の類似体と、第 2 の特異的結合物質とを共に表面上に結合させた不溶性担体であり、そして該第 2 の特異的結合物質が、該第 1 の特異的結合物質に特異的に結合し得る物質である、第二試薬；

を含む、測定用試薬キット。

【請求項 8】

前記被測定物質がハプテンであり、そして前記被測定物質の類似体がハプテン結合蛋白質である、請求項 7 の測定試薬キット。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

40

【0001】

本発明は、物質を結合した微小粒子を用いる免疫学的測定法に関する。特に、主として工業、環境、および臨床検査の分野における、抗原抗体反応を利用した微量成分の免疫学的測定方法ならびに免疫測定試薬キットに関する。

【背景技術】

【0002】

近年、臨床検査などの各種検査では自動化および測定時間の短縮が図られている。その検査の方法として、生体試料中の物質を測定するために免疫反応を利用する測定方法が広く用いられている。免疫学的測定方法としては、RIA法、EIA法、免疫比濁法、ラテックス凝集法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法などの多くの方法がある。その中で

50

も、ラテックス凝集法や金コロイド凝集法は、反応液の分離や洗浄操作を必要としないホモジニアス系での測定が可能のため、測定の自動化や短時間での測定に適している。特に、金コロイド粒子は5 nm～100 nmの大きさであり、これはラテックス粒子より小さいため、より微量物質の測定に利用可能である（特開2005-283250号公報および特開2004-325192号公報）。

これらの測定法における主反応成分は、被測定物質に特異的に反応（例えば、結合）する物質を結合したラテックス粒子や金コロイド粒子などの微小粒子である。微小粒子上に存在する抗体などの特異的結合物質が被測定物質と結合することにより、微小粒子の凝集が生じる。その凝集は被測定物質の量依存的に生じるので、その現象を機械的に測定することで、被測定物質量を算出することができる。

10

しかしながら、被測定物質の分子量が小さい薬剤や化学物質などは、特異的結合物質と被測定物質との結合部位が少なく、凝集反応が生じにくいいため、凝集反応を用いたホモジニアスな測定系を組むことは困難であった。そのため、特別にハプテンを結合させた競合体を反応系に添加することなどの工夫が必要であった（例えば、特開2004-325192号公報および特開2006-38594号公報参照）。

【発明の開示】

【0003】

本発明の目的は、分子中に特異的結合部位が少ない被測定物質についての、免疫学的微小粒子の凝集反応を用いる測定方法および測定用キットを提供することである。

本発明では、被測定物質または被測定物質の類似体と、被測定物質に特異的に結合し得る物質に特異的に結合する物質とを、共に不溶性担体上に結合させた微小粒子を用いて、被測定物質の測定を行うことにより、特別にハプテンを結合させた競合体と被測定物質とを同時に競合させることなく、より簡便に被測定物質を測定することを可能にした。

20

本発明は、検体中の被測定物質を測定する方法を提供し、該方法は、

(a) 該被測定物質、第1の特異的結合物質、および微小粒子を混合する工程であって、該第1の特異的結合物質が、該被測定物質に特異的に結合し得る物質であり、該微小粒子が、該被測定物質または該被測定物質の類似体と、第2の特異的結合物質とを共に表面上に結合させた不溶性担体であり、そして該第2の特異的結合物質が、該第1の特異的結合物質に特異的に結合し得る物質である、工程；および

(b) 該工程(a)で得られた該混合液において、該微小粒子の凝集反応を測定する工程；

30

を含む。

1つの実施態様では、上記被測定物質はハプテンであり、そして上記被測定物質の類似体はハプテン結合蛋白質である。

1つの実施態様では、上記被測定物質に特異的に結合し得る物質は該被測定物質に対する抗体である。

ある実施態様では、上記第2の特異的結合物質は、前記第1の特異的結合物質に対するモノクローナル抗体である。

さらなる実施態様では、上記被測定物質の類似体は上記被測定物質に特異的に結合し得る物質と結合し得る認識部位、または該認識部位の構造類似体である。また、上記認識部位または構造類似体が複数個結合した物質であってもよい。

40

1つの実施態様では、上記不溶性担体は、ラテックスまたは金コロイドである。

本発明はまた、測定用試薬キットを提供し、該キットは、

被測定物質に特異的に結合し得る物質である第1の特異的結合物質を含む第一試薬；および

微小粒子を含む第二試薬であって、該微小粒子が、該被測定物質または該被測定物質の類似体と、第2の特異的結合物質とを共に表面上に結合させた不溶性担体であり、そして該第2の特異的結合物質が、該第1の特異的結合物質に特異的に結合し得る物質である、第二試薬；

を含む。

50

1つの実施態様では、上記被測定物質はハプテンであり、そして上記被測定物質の類似体はハプテン結合蛋白質である。

本発明の方法によれば、ラテックスや金コロイドなどの不溶性担体に、被測定物質または被測定物質の類似体と、被測定物質に特異的に結合し得る物質に特異的に結合し得る物質とを、共に結合させた微小粒子を凝集反応の主成分として使用するの、特別にハプテンを結合させた競合体を反応系に添加して被測定物質と競合体とを同時に競合させることなく、より簡便に凝集反応を用いたホモジニアスな測定系を組むことが可能である。

【図面の簡単な説明】

【0004】

図1は、ジアセチルスペルミン測定におけるジアセチルスペルミン濃度と吸光度変化量との関係を示すグラフである（実施例4）。 10

図2は、ジアセチルスペルミン測定におけるジアセチルスペルミン濃度と吸光度変化量との関係を示すグラフである（実施例6）。

図3は、ブロムペリドールにおけるブロムペリドール濃度と吸光度変化量との関係を示すグラフである（実施例9）。

【発明を実施するための最良の形態】

【0005】

本発明において、測定に供する被測定物質を含む検体としては、血液、血漿、血清、尿、糞便（懸濁液）、髄液、腹水などの生体試料；環境中より得られたサンプルまたはその抽出物などが挙げられる。 20

被測定物質は、該被測定物質に特異的に結合する物質（第1の特異的結合物質）が存在し得るものであれば、特に限定されない。被測定物質としては、例えば、アルブミン、ヘモグロビン、ヘモグロビンA1c、ミオグロビン、トランスフェリン、ラクトフェリン、シスタチンC、フェリチン、 α -フェトプロテイン、癌胎児性抗原、CA19-9、前立腺特異抗原、C反応性蛋白質（CRP）、繊維素分解産物（FDP）、ペプシノーゲンIおよびII、コラーゲンなどの蛋白質；高比重リポ蛋白質、低比重リポ蛋白質、超低比重リポ蛋白質などの脂質蛋白質；デオキシリボ核酸、リボ核酸などの核酸；アルカリ性ホスファターゼ、乳酸脱水素酵素、リパーゼ、アミラーゼなどの酵素；IgG、IgM、IgA、IgD、IgEなどの免疫グロブリン；B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、ヒト免疫不全ウイルス、ヘリコバクターピロリ、これらに対する抗体などの感染症に関する抗原や抗体；スペルミン、スペルミジン、プトレッシン、ジアセチルスペルミンなどのポリアミン、および生理活性物質；ハロペリドール、ブロムペリドールなどの薬物；性ホルモンなどのホルモンなどが挙げられる。 30

被測定物質に特異的に結合する物質（第1の特異的結合物質）としては、免疫反応を利用する免疫学的測定法に使用され得る抗体または抗原が挙げられる。例えば、抗体または抗原、レセプター、レクチン、デオキシリボ核酸（DNA）、リボ核酸（RNA）などの結合親和性を有する物質が挙げられる。被測定物質を特異的に認識できかつ以下で詳述する不溶性担体に結合した第2の特異的結合物質に認識されやすい（すなわち、特異的に結合する）点で、該第1の結合物質に対するポリクローナル抗体またはモノクローナル抗体が好ましい。また、第1の特異的結合物質は、第2の特異的結合物質による認識部位（例えば、タグ）が化学的または分子生物学的手法を用いて付加されていてもよい。このような第1の特異的結合物質は、市販のものであってもよく、あるいは被測定物質に応じて当業者が通常用いる方法によって調製したものであってもよい。 40

被測定物質に特異的に結合する物質（第1の特異的結合物質）に特異的に結合する物質（第2の特異的結合物質）は、不溶性担体の表面上に結合される。第2の特異的結合物質としては、免疫反応を利用した免疫測定法に使用され得る抗体または抗原が挙げられる。あるいは、測定対象に特異的に結合する物質に特異的に結合するものも利用可能である。例えば、抗体または抗原、レセプター、レクチン、デオキシリボ核酸（DNA）、リボ核酸（RNA）などの結合親和性を有する物質が挙げられる。

第2の特異的結合物質は、第1の特異的結合物質に特異的に結合し、その結合部位は、 50

第1の特異的結合物質に存在する任意の領域を認識する。例えば、第1の特異的結合物質が抗体である場合は、抗体のFc領域、V領域、あるいは化学的または分子生物学的手法を用いて付加されたタグ領域などが挙げられる。第2の特異的結合物質は、抗体である場合、ポリクローナル抗体であっても、モノクローナル抗体であってもよい。このような第2の特異的結合物質は、市販のものであってもよく、あるいは第1の特異的結合物質に応じて当業者が通常用いる方法によって調製したものであってもよい。

第2の特異的結合物質と共に不溶性担体に結合される被測定物質または被測定物質の類似体は、第1の特異的結合物質に特異的に結合するものであればよく、被測定物質自体、第1の特異的結合物質により認識される被測定物質の認識部位（すなわち、被測定物質の一部）、またはその構造類似体である。また、それらが複数個結合した物質であってもよい。被測定物質が、免疫原性を欠き反応原性のみを有するハプテン（例えば、分子量数百以下の低分子）である場合は、被測定物質の類似体はハプテン結合蛋白質であることが好ましい。複数の被測定物質（例えば、ハプテン）、その一部、またはその構造類似体を結合させるための蛋白質としては、各種動物由来のアルブミン、ヘモシアニン、サイログロブリン、フィブリノーゲン、酵素などから適宜選択される。本発明においては、ウシ血清アルブミン（BSA）が好ましい。ハプテン結合蛋白質としては、蛋白質1分子当たり、4～40程度の被測定物質（ハプテン）、その一部、またはその構造類似体が結合していることが好ましい。

被測定物質またはその一部とこれらの蛋白質との結合は、当業者が通常用いる方法により行うことができる。このような結合方法は、被測定物質またはその一部に存在するアミノ基、カルボキシル基またはチオール基などの官能基を利用して、被測定物質またはその一部と担体とを直接または結合剤を介して化学結合させるものであり、被測定物質またはその一部の構造に応じて種々のものが知られている（生化学実験法11 エンザイム免疫ノアッセイ、P. T i j s s e n 著、石川栄治編、252頁、1989年、東京化学同人）。化学結合を形成させるための試薬としては、アシル化剤、アルキル化剤などが挙げられる。好ましくは、カルボキシル基を活性化することにより得られるN-ヒドロキシスクシンイミドエステル、弱アルカリ条件下で用いられるマレイミド類などである。

本発明において、被測定物質または被測定物質の類似体と第2の特異的結合物質とを共に結合させるための不溶性担体は、免疫測定試薬に使用され得る微小粒子であればよい。ラテックスおよび金属コロイドが好ましい。金属コロイドの場合、金コロイドが一般的に利用されやすい点で好ましい。金コロイド粒子は、市販されているものを用いてもよく、あるいは当業者が通常用いる方法（例えば、塩化金酸をクエン酸ナトリウムで還元する方法）により調製したものをを用いてもよい。金コロイド粒子の粒径は、通常10nm～100nm、好ましくは30nm～60nmの範囲である。

本発明の方法に用いられる被測定物質または被測定物質の類似体と第2の特異的結合物質とを共に結合した金コロイド粒子（以下、結合金コロイド粒子という場合がある）は、例えば、以下のように調製し得る：金コロイド粒子溶液（540nmにおける吸光度が約2.0）1Lに対して、通常、0.01mg～100mg、好ましくは0.1mg～10mgの被測定物質または被測定物質の類似体（例えば、ウシ血清アルブミン結合被測定物質）と0.01mg～100mg、好ましくは0.1mg～10mgの第2の特異的結合物質（例えば、抗体）を添加し、冷蔵または室温下で5分～24時間攪拌する。次いで、牛血清アルブミン（BSA）などでブロックし、遠心分離を行うことにより、目的の結合金コロイド粒子を得ることができる。得られた微小粒子は、測定に必要な濃度となるように緩衝液に分散させる。緩衝液のpHは5～9が好ましく、濃度は1～100mMが好ましい。緩衝液としては、例えば、リン酸緩衝液、トリス塩酸緩衝液、コハク酸緩衝液、あるいはグリシルグリシン、MES（2-（N-モルホリノ）エタンスルホン酸）、HEPES（2-[4-（2-ヒドロキシエチル）-1-ピペラジニル]エタンスルホン酸）、TES（N-トリス（ヒドロキシメチル）メチル-2-アミノエタンスルホン酸）、MOPS（3-（N-モルホリノ）プロパンスルホン酸）、PIPES（ピペラジニ-1,4-ビス（2-エタンスルホン酸））、Bis-Tris（ビス（2-ヒドロキシエチ

10

20

30

40

50

ル) イミノトリス (ヒドロキシメチル) メタン) などのグッド緩衝液が好適に用いられる。

緩衝液は、必要に応じて、糖および糖アルコール、アジ化ナトリウム、アルブミン、塩化ナトリウムなどの塩類、防腐剤などの添加物を含有してもよい。糖および糖アルコールとしては、グルコース、マンノース、サッカロース、ラクトース、マルトース、マンニトール、ソルビトールなどが挙げられ、その濃度は、0.01~10 w/v%が好ましい。アルブミンとしては、ウシ血清アルブミン (BSA) が好ましく、その濃度は0.001~1 w/v%が好ましい。防腐剤としてはアジ化ナトリウムが好ましく、その濃度は、0.01~0.5 w/v%が好ましい。その他の添加物としては、Tween 20、ポリエチレングリコールラウリルエーテル、5-ブプロモサリチル酸、サリチル酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、ベンゼンスルホン酸ナトリウム、フェノール、チモールなどが挙げられる。

10

被測定物質と第1の特異的結合物質との結合反応、および得られた結合物と第2の特異的結合物質などが結合した不溶性担体との凝集反応において、反応温度、pH、緩衝液の種類、共存する塩の種類や濃度、その他の共存物質などの反応条件は、従来の免疫学的反応と同様である。例えば、一般的に行われているように、反応促進の目的で、ポリエチレングリコール、ポリビニルアルコール、デキストラン、コンドロイチン硫酸ナトリウムなどの水溶性高分子を反応系に添加してもよい。例えば、ポリエチレングリコールの場合、測定系によっても異なるが、1~5 w/v%程度添加される。

本発明において、検体中の被測定物質を測定する方法は、

20

(a) 該被測定物質、第1の特異的結合物質、および微小粒子を混合する工程であって、該第1の特異的結合物質が、該被測定物質に特異的に結合し得る物質であり、該微小粒子が、該被測定物質または該被測定物質の類似体と、第2の特異的結合物質とを共に表面上に結合させた不溶性担体であり、そして該第2の特異的結合物質が、該第1の特異的結合物質に特異的に結合し得る物質である、工程；および

(b) 該工程 (a) で得られた該混合液において、該微小粒子の凝集反応を測定する工程；を含む。

この方法において、被測定物質が、第1の特異的結合物質を複数個結合し得る場合は、例えば、工程 (a) で、まず、被測定物質と該被測定物質に特異的に結合する物質 (第1の特異的結合物質) とを反応させて複合体を形成させ、次いで、被測定物質に特異的に結合する物質を認識する物質 (第2の特異的結合物質) を結合させたラテックスや金コロイドなどの不溶性担体でなる微小粒子と反応させることによって凝集反応を生じさせ、その程度を工程 (b) で機械的に測定する。

30

本発明の方法は、例えば、以下のように行われる：第1の反応として、被測定物質を含む検体または該検体を緩衝液などで適切に希釈したものなどと被測定物質に特異的に結合する第1の特異的結合物質とを混合する。次いで第2の反応として、この混合液に、上記のように得られた不溶性担体でなる微小粒子を添加して混合する。第1の反応で被測定物質と結合していない第1の特異的結合物質は、不溶性担体上の被測定物質または被測定物質類似体と結合する。不溶性担体上の第2の特異的結合物質が、不溶性担体上の被測定物質または被測定物質類似体に結合した第2の特異的結合物質に結合することにより、微小粒子の凝集反応が生じる。この凝集反応は、第2の反応において不溶性担体上の被測定物質に結合する第1の特異的結合物質の量に依存するので、第1の反応で被測定物質と結合していない第1の特異的結合物質の量に依存することになる。すなわち、第1の反応の被測定物質の量に依存して第2の反応の凝集反応が減少する。例えば、不溶性担体として金コロイドを用いる場合は、この凝集反応に起因する所定の波長における吸光度変化を測定する。測定結果を、予め作成しておいた金コロイド凝集反応の吸光度変化と被測定物質の量との関係を表す検量線に当てはめることにより、容易に検体中の被測定物質の量を求めることができる。なお、例えば、吸光度変化が一定値未満であれば陰性、一定値以上であれば陽性と設定して判定を行うことにより、定性および半定量をすることも可能である。

40

50

金コロイドを用いる場合、反応開始後の吸光度変化は、一波長測定であっても二波長測定であってもよい。二波長測定の場合は、測定波長は、第一波長610nm～800nm、好ましくは630nm～750nmと、第二波長360nm～580nm、好ましくは500nm～550nmである。一波長測定の場合は、上記二波長測定の場合の第一波長または第二波長のいずれか一方の波長領域の波長で測定することができる。本発明の方法において吸光度変化とは、以下の2通りの測定により得られた値であり、いずれであってもよい：

(1) 反応開始後に反応液の吸光度を適当な間隔で2回測定し、その差を吸光度変化とする；または

(2) 反応開始後に反応液の吸光度を連続的に測定し、時間当たりの吸光度変化率（その最大変化率を用いる場合もある）を吸光度変化とする。

上記測定には、分光光度計、マイクロプレートリーダー、生化学自動分析装置などが利用できる。特に、本発明の方法を生化学自動分析装置での測定に適用することにより、多数の検体を短時間に測定することが可能である。

本発明によれば、本発明の方法に用いるための測定用試薬キットが提供される。このキットは、被測定物質に特異的に結合し得る物質である第1の特異的結合物質を含む第一試薬；および微小粒子を含む第二試薬であって、該微小粒子が、該被測定物質または該被測定物質の類似体と、第2の特異的結合物質とを共に表面上に結合させた不溶性担体であり、そして該第2の特異的結合物質が、該第1の特異的結合物質に特異的に結合し得る物質である、第二試薬；を含む。

上記の試薬は、どのような形態で提供されてもよく、それぞれ個別に密封包装されて提供されることが好ましい。上記キットは、検量線作成用の被測定物質の標準品、使用時に各物質を溶解して適切な濃度の溶液を調製するための緩衝液、使用説明書など含んでいてもよい。

【実施例】

【0006】

以下、実施例に基づいて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらによって限定されるものではない。

（実施例1：金コロイド液の調製）

95℃の蒸留水1Lに10w/v%塩化金酸溶液2mLを攪拌しながら加え、1分後に2w/v%クエン酸ナトリウム溶液10mLを加え、さらに20分間攪拌した後、30℃に冷却した。冷却後、0.1w/v%炭酸カリウムでpH7.1に調節した。

（実施例2：ジアセチルスベルミンと抗マウスIgGラットモノクローナル抗体とを結合した金コロイド試薬の調製）

ジアセチルスベルミン結合BSA（特開2006-38594号公報参照）を、0.05w/v%アジ化ナトリウムを含む10mMのHEPES（pH7.1）で希釈して0.1mg/mLの濃度のジアセチルスベルミン結合BSA溶液を得た。これとは別に、抗マウスIgGラットモノクローナル抗体（Production of Antibodies, Reagents for Immunology and Services社）を、0.05w/v%アジ化ナトリウムを含む10mMのHEPES（pH7.1）で希釈して、40μg/mLの濃度のモノクローナル抗体溶液を得た。ジアセチルスベルミン結合BSA溶液50mLを上記実施例1で調製した約1Lの金コロイド液に加え10分間室温で攪拌し、続いてモノクローナル抗体溶液を50mL加え、冷蔵下で18時間攪拌した。この液に、5.46w/v%マンニトール、0.5w/v%BSA、および0.05w/v%アジ化ナトリウムを含む10mMのHEPES（pH7.1）を110mL添加し、室温にて1時間攪拌した。8000回転で40分間遠心分離し、上清を除去した。次いで、沈渣に3w/v%マンニトール、0.1w/v%BSA、および0.05w/v%アジ化ナトリウムを含む5mMのHEPES（pH7.5）（A溶液）を約1L加え、抗体結合金コロイドを分散させた後、8000回転で40分間遠心分離し、上清を除去し、A溶液を加えて抗体結合金コロイドを分散させ、全量を70mLとし、ジアセチルスベ

ルミンと抗マウス I g G ラットモノクローナル抗体とを結合した金コロイド溶液を調製した。

次いで、得られたジアセチルスベルミンと抗マウス I g G ラットモノクローナル抗体とを結合した金コロイド溶液 70 mL に、A 溶液を 280 mL 添加し、ジアセチルスベルミンと抗マウス I g G ラットモノクローナル抗体とを結合した金コロイド試薬を調製した。

(実施例 3：ジアセチルスベルミン測定例 1 用第一試薬の調製)

1. 0 w/v % 塩化ナトリウム、0.5 w/v % EDTA、および 0.35 w/v % ポリオキシエチレンラウリルエーテルを含む 0.2 M PIPES (pH 6.5) の溶液 (B 溶液) に、抗ジアセチルスベルミンマウス I g G 抗体 (株式会社トランスジェニック) を 0.5 μg/mL、ならびに反応促進剤としてポリエチレングリコールを 2.0 w/v % 添加して、ジアセチルスベルミン用第一試薬とした。

(実施例 4：ジアセチルスベルミンの測定例 1)

本実施例では、第一試薬として実施例 3 で調製したジアセチルスベルミン測定例 1 用第一試薬を、第二試薬として実施例 2 で調製したジアセチルスベルミンと抗マウス I g G ラットモノクローナル抗体とを結合した金コロイド試薬を用いた。ジアセチルスベルミンを、それぞれ 0、5、10、25、50、75、100 および 200 nM の濃度になるように、試料を調製した。ジアセチルスベルミン含有試料 10 μL に、第一試薬を 160 μL 添加し、37℃ で約 5 分間加温した後、第二試薬を 80 μL 加えて 37℃ にて反応させて、日立 7070 自動分析装置により、波長 546 nm および 660 nm での測光ポイントとして 18 から 31 ポイントにおける吸光度変化量を測定した。図 1 および表 1 にジアセチルスベルミン濃度と吸光度変化量との関係を示す。

【表 1】

表 1

ジアセチルスベルミン (nM)	吸光度変化量
0	0.8245
5	0.8065
10	0.7796
25	0.6899
50	0.5172
75	0.3411
100	0.2296
200	0.0889

図 1 および表 1 に示すように、被測定物質であるジアセチルスベルミンの濃度依存的に、凝集反応による吸光度変化量が変化した。すなわち、ジアセチルスベルミンの濃度が高いほど、吸光度変化量が少なくなった。したがって、検体中の被測定物質であるジアセチルスベルミン量を、凝集反応の吸光度変化量として測定し、検量線と比較することによって定量できることがわかる。

(実施例 5：ジアセチルスベルミン測定例 2 用第二試薬の調製)

1. 0 w/v % 塩化ナトリウム、0.5 w/v % EDTA、および 0.35 w/v % ポリオキシエチレンラウリルエーテルを含む 0.2 M PIPES (pH 6.5) の溶液 (B 溶液) に、抗ジアセチルスベルミンマウス I g G 抗体 (株式会社トランスジェニック) を 0.75 μg/mL、ならびに反応促進剤としてポリエチレングリコールを 2.0 w/v % 添加して、ジアセチルスベルミン測定例 2 用第二試薬とした。

(実施例 6：ジアセチルスベルミンの測定例 2)

本実施例では、第一試薬として実施例 2 で調製したジアセチルスベルミンと抗マウス I

g G ラットモノクローナル抗体とを結合した金コロイド試薬、第二試薬として実施例 5 で調製したジアセチルスベルミン測定例 2 用第二試薬を用いた。ジアセチルスベルミンを、それぞれ 0、200、400、600 および 1000 nM の濃度になるように、試料を調製した。ジアセチルスベルミン含有試料 10 μ L に、第一試薬を 80 μ L 添加し、37 $^{\circ}$ C で約 5 分間加温した後、第二試薬を 160 μ L 加えて 37 $^{\circ}$ C にて反応させて、日立 7070 自動分析装置により、波長 546 nm および 660 nm での測光ポイントとして 18 から 31 ポイントにおける吸光度変化量を測定した。図 2 および表 2 にジアセチルスベルミン濃度と吸光度変化量との関係を示す。

【表 2】

表 2

ジアセチルスベルミン (nM)	吸光度変化量
0	1.3497
200	0.6966
400	0.3265
600	0.2204
1000	0.1486

10

20

図 2 および表 2 に示すように、被測定物質であるジアセチルスベルミンの濃度依存的に、凝集反応による吸光度変化量が変化した。すなわち、ジアセチルスベルミンの濃度が高いほど、吸光度変化量が少なくなった。したがって、検体中の被測定物質であるジアセチルスベルミン量を、凝集反応の吸光度変化量として測定し、検量線と比較することによって定量できることがわかる。

(実施例 7：ブロムペリドールと抗ウサギ Ig G-Fc マウスモノクローナル抗体とを結合した金コロイド試薬の調製)

ブロムペリドール結合 BSA (特開 2004-325192 号公報参照) を、0.05 w/v % アジ化ナトリウムを含む 10 mM の HEPES (pH 7.1) で希釈して 0.1 mg/mL の濃度のブロムペリドール結合 BSA 溶液を得た。これとは別に、抗ウサギ Ig G-Fc マウスモノクローナル抗体 (Biogenesis 社) を、0.05 w/v % アジ化ナトリウムを含む 10 mM の HEPES (pH 7.1) で希釈して 40 μ g/mL の濃度のモノクローナル抗体溶液を得た。ブロムペリドール結合 BSA 溶液 50 mL を上記実施例 1 で調製した約 1 L の金コロイド液に加え 10 分間室温で攪拌し、続いてモノクローナル抗体溶液を 50 mL 加え、冷蔵下で 18 時間攪拌した。この液に、5.46 w/v % マンニトール、0.5 w/v % BSA、および 0.05 w/v % アジ化ナトリウムを含む 10 mM HEPES (pH 7.1) を 110 mL 添加し、室温にて 1 時間攪拌した。8000 回転で 40 分間遠心分離し、上清を除去した。次いで、沈渣に A 溶液を約 1 L 加え、抗体結合金コロイドを分散させた後、8000 回転で 40 分間遠心分離し、上清を除去し、A 溶液でブロムペリドールと抗体結合金コロイドを分散させ、全量を 70 mL とし、ブロムペリドールと抗ウサギ Ig G-Fc マウスモノクローナル抗体とを結合した金コロイド溶液を調製した。

次いで、ブロムペリドールと抗ウサギ Ig G-Fc マウスモノクローナル抗体とを結合した金コロイド溶液 70 mL に、A 溶液を 280 mL 添加し、ブロムペリドールと抗ウサギ Ig G-Fc マウスモノクローナル抗体とを結合した金コロイド試薬を調製した。

(実施例 8：ブロムペリドール測定用第一試薬の調製)

上記実施例 3 に記載の B 溶液に、抗ブロムペリドールウサギポリクローナル抗体 (特開 2004-325192 号公報参照) を 6 μ g/mL、ウサギ Ig G ネガティブコントロール (Dako 社) を 4 μ g/mL、および反応促進剤としてポリエチレングリコール

30

40

50

4. 5 w/v % 添加して、ブロムペリドール測定用第一試薬とした。

(実施例 9 : ブロムペリドールの測定)

本実施例では、第一試薬として実施例 8 で調製したブロムペリドール測定用第一試薬を、第二試薬として実施例 7 で調製したブロムペリドールと抗ウサギ Ig G-Fc マウスモノクローナル抗体とを結合した金コロイド試薬を用いた。ブロムペリドールを、それぞれ 0、10、20、50、および 100 ng/mL の濃度になるように 3 w/v % ウシ血清アルブミン含有 0.05 M HEPES 溶液 (pH 7.4) に溶解したものを試料とした。ブロムペリドール含有試料 20 μ L に、第一試薬を 160 μ L 添加し、37℃ で約 5 分間加温した後、第二試薬を 80 μ L 加えて 37℃ にて反応させて、日立 7070 自動分析装置により、波長 546 nm および 660 nm での測光ポイントとして 18 から 31 ポイントにおける吸光度変化量を測定した。図 3 および表 3 にブロムペリドール濃度と吸光度変化量との関係を示す。

10

【表 3】

表 3

ブロムペリドール (ng/mL)	吸光度変化量
0	0.4142
10	0.3070
20	0.2781
50	0.2393
100	0.2258

20

図 3 および表 3 に示すように、被測定物質であるブロムペリドールの濃度依存的に、凝集反応による吸光度変化量が変化した。すなわち、ブロムペリドールの濃度が高いほど、吸光度変化量が少なくなった。したがって、検体中の被測定物質であるブロムペリドール量を、凝集反応の吸光度変化量として測定し、検量線と比較することによって定量できることがわかる。

30

【産業上の利用可能性】

【0007】


本発明によれば、ラテックスや金コロイドなどの不溶性担体に、被測定物質または被測定物質の類似体と、被測定物質に特異的に結合し得る物質に特異的に結合する物質とを、共に結合させた微小粒子を凝集反応の主成分として使用することにより、特別にハプテンを結合させた競合体を反応系に添加して被測定物質と競合体とを同時に競合させることなく、より簡便に凝集反応を用いたホモジニアスな測定系を組むことが可能になる。

また、B/F 分離を必要としないため、自動化にも非常に適している。したがって、工業、環境、および臨床検査の分野における、抗原抗体反応を利用した微量成分の免疫学的測定方法に好適である。

40


【図 1】

第 1 図




【図 3】

第 3 図



【図 2】

第 2 図



【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2008/070830
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER G01N33/543(2006.01)i, G01N33/545(2006.01)i, G01N33/553(2006.01)i		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G01N33/543, G01N33/545, G01N33/553		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2008 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2008 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2008		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 11-153599 A (Daiichi Pure Chemicals Co., Ltd.), 08 June, 1999 (08.06.99), Full text & EP 918218 A2 & AU 9239498 A & CA 2254151 A & CA 2254151 A1	1-8
A	JP 2002-296281 A (F. Hoffmann-La Roche AG.), 09 October, 2002 (09.10.02), Full text & US 2003/0003602 A1 & EP 1239285 A1	1-8
A	JP 2001-337092 A (Daiichi Pure Chemicals Co., Ltd.), 07 December, 2001 (07.12.01), Full text (Family: none)	1-8
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents:		
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E"	earlier application or patent but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&" document member of the same patent family
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	
Date of the actual completion of the international search 11 December, 2008 (11.12.08)		Date of mailing of the international search report 22 December, 2008 (22.12.08)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2008/070830

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2004-325192 A (Azwell, Inc.), 18 November, 2004 (18.11.04), Full text (Family: none)	1-8
A	JP 2005-508001 A (Reference Diagnostics Inc.), 24 March, 2005 (24.03.05), Full text & US 2003/0082589 A1 & EP 1442299 A & WO 2003/038397 A2	1-8

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 0 8 / 0 7 0 8 3 0	
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. G01N33/543(2006.01)i, G01N33/545(2006.01)i, G01N33/553(2006.01)i			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int.Cl. G01N33/543, G01N33/545, G01N33/553			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2008年 日本国実用新案登録公報 1996-2008年 日本国登録実用新案公報 1994-2008年			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
A	JP 11-153599 A (第一化学薬品株式会社) 1999.06.08, 全文 & EP 918218 A2 & AU 9239498 A & CA 2254151 A & CA 2254151 A1	1-8	
A	JP 2002-296281 A (エフ. ホフマンロー ロシユ アーゲー) 2002.10.09, 全文 & US 2003/0003602 A1 & EP 1239285 A1	1-8	
A	JP 2001-337092 A (第一化学薬品株式会社) 2001.12.07, 全文 (ファミリーなし)	1-8	
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日に後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献	
国際調査を完了した日 11.12.2008		国際調査報告の発送日 22.12.2008	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 三木 隆	2 J 3 3 1 2
		電話番号 03-3581-1101	内線 3252

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2008/070830

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2004-325192 A (株式会社アズウェル) 2004. 11. 18, 全文 (ファミリーなし)	1-8
A	JP 2005-508001 A (リファレンス ディアノスティックス インコーポレーテッド) 2005. 03. 24, 全文 & US 2003/0082589 A1 & EP 1442299 A & WO 2003/038397 A2	1-8

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(72)発明者 小坂 美恵子

日本国大阪府茨木市庄二丁目2 4 番3号 アルフレッサファーマ株式会社診断薬研究開発部内

(72)発明者 榎本 昌泰

日本国大阪府茨木市庄二丁目2 4 番3号 アルフレッサファーマ株式会社診断薬研究開発部内

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	使用微粒凝集反应的样品的免疫学测量方法和用于测量的试剂盒		
公开(公告)号	JPWO2009072385A1	公开(公告)日	2011-04-21
申请号	JP2009544622	申请日	2008-11-10
申请(专利权)人(译)	Alfresa制药社		
[标]发明人	柳谷真理 田中睦 小坂美惠子 榎本昌泰		
发明人	柳谷 真理 田中 睦 小坂 美惠子 榎本 昌泰		
IPC分类号	G01N33/543 G01N33/53 G01N33/545 G01N33/553		
CPC分类号	G01N33/54306 G01N33/54313 G01N33/553		
FI分类号	G01N33/543.581.A G01N33/53.J G01N33/545.B G01N33/553		
代理人(译)	新藤拓也		
优先权	2007317669 2007-12-07 JP		
其他公开文献	JP5586232B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明提供了一种使用免疫微粒的凝集反应和测量试剂盒测量样品的简单方法。在本发明中，通过使用微粒测量，所述微粒将待测物质或待测物质的类似物和特异性结合识别待测物质的物质的物质结合到不溶性载体上，即使在待测物质中几乎没有特异性结合位点的情况下，通过添加半抗原与反应体系特异性结合的竞争物，可以更方便地测量而不与待测物质和竞争物同时竞争。它使它成为可能。

ジアセチルスペルミン (nM)	吸光度変化量
0	0.8245
5	0.8065
10	0.7796
25	0.6899
50	0.5172
75	0.3411
100	0.2296
200	0.0889