

(19)日本国特許庁 ( J P )

(12) **公表特許公報** ( A ) (11)特許出願公表番号

**特表2002 - 542786**

(P2002 - 542786A)

(43)公表日 平成14年12月17日(2002.12.17)

(51) Int.Cl <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-マコード* (参考)
C 1 2 N 15/09	ZNA	A 6 1 K 39/395	D 2 G 0 4 5
A 6 1 K 39/395			N 4 B 0 2 4
		45/00	4 B 0 5 0
45/00		A 6 1 P 3/00	4 B 0 6 3
A 6 1 P 3/00		35/00	4 B 0 6 4
審査請求 未請求 予備審査請求 (全 85数) 最終頁に続く			

(21)出願番号 特願2000 - 614403(P2000 - 614403)

(86)(22)出願日 平成12年4月26日(2000.4.26)

(85)翻訳文提出日 平成13年10月25日(2001.10.25)

(86)国際出願番号 PCT/US00/11665

(87)国際公開番号 W000/65069

(87)国際公開日 平成12年11月2日(2000.11.2)

(31)優先権主張番号 60/131,156

(32)優先日 平成11年4月27日(1999.4.27)

(33)優先権主張国 米国(US)

(31)優先権主張番号 09/564,357

(32)優先日 平成12年4月24日(2000.4.24)

(33)優先権主張国 米国(US)

(71)出願人 セブティア, インコーポレイテッド  
アメリカ合衆国 ワシントン 98021, ボ  
ゼル, 26ティーエイチ アベニュー サウ  
スイースト - 22215

(72)発明者 ルーチェ, ラルフ エム.  
アメリカ合衆国 ワシントン 98155, シ  
アトル, ノーススイースト 196ティーエイ  
チ コート 4028

(72)発明者 ウェイ, ボ  
アメリカ合衆国 ワシントン 98296, ス  
ノオミッシュ, 64ティーエイチ アベニュー  
- サウスイースト 12828

(74)代理人 弁理士 山本 秀策

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 D S P - 5 二重特異性 M A P キナーゼホスファターゼ

(57)【要約】

細胞増殖、細胞分化、および細胞の生存に関する状態の処置のための組成物および方法が、提供される。詳細には、二重特異性ホスファターゼ D S P - 5、および D S P - 5 基質の脱リン酸化を刺激する D S P - 5 のポリペプチド改変体が、提供される。これらのポリペプチドを用いて、例えば、D S P - 5 活性を阻害する抗体および他の薬剤を同定し得る。これらのポリペプチドおよび薬剤を用いて、細胞増殖、細胞分化、および細胞の生存を調節し得る。

**【特許請求の範囲】**

【請求項1】 配列番号3に記載されるDSP-5の配列あるいはその改変体を有する単離されたポリペプチドであって、該改変体は、該ポリペプチドが活性化MAPキナーゼを脱リン酸化する能力を保持するように、配列番号3における残基の50%以下での1つ以上のアミノ酸の欠失、付加、挿入、または置換にて異なる、単離されたポリペプチド。

【請求項2】 配列番号3に対応する配列を有するポリペプチドの少なくとも10個連続するアミノ酸をコードする、単離されたポリヌクレオチド。

【請求項3】 配列番号3に対応する配列を有するポリペプチドの少なくとも15個連続するアミノ酸をコードする、単離されたポリヌクレオチド。

【請求項4】 請求項2または請求項3に記載のポリヌクレオチドを含む、発現ベクター。

【請求項5】 請求項4に記載の発現ベクターを用いて形質転換されたかまたはトランスフェクトされた、宿主細胞。

【請求項6】 請求項1に記載のポリペプチドをコードする、単離されたポリヌクレオチド。

【請求項7】 配列番号1に記載された配列を含む、請求項6に記載のポリヌクレオチド。

【請求項8】 請求項6に記載のポリヌクレオチドを含む、発現ベクター。

【請求項9】 請求項8に記載の発現ベクターを用いて形質転換されたかまたはトランスフェクトされた、宿主細胞。

【請求項10】 請求項6に記載のポリヌクレオチドに相補的な少なくとも15個連続するヌクレオチドを含む、アンチセンスポリヌクレオチド。

【請求項11】 配列番号1に記載される配列の相補体に、50℃にて15分間の0.1×SSCおよび0.1%SDS中での洗浄を含む条件下で、検出可能にハイブリダイズする、単離されたポリヌクレオチド。

【請求項12】 請求項10または請求項11に記載のポリヌクレオチドを含む、発現ベクター。

【請求項13】 請求項12に記載の発現ベクターを用いて形質転換された

かまたはトランスフェクトされた、宿主細胞。

【請求項14】 DSP-5ポリペプチドを産生する方法であって、以下の工程：

(a) 請求項9に記載の宿主細胞を、DSP-5ポリペプチドの発現を可能にする条件下で培養する工程；および

(b) 該宿主細胞培養物から該DSP-5ポリペプチドを単離する工程、を包含する、方法。

【請求項15】 配列番号3の配列を有するDSP-5ポリペプチドに特異的に結合する、単離された抗体またはその抗原結合フラグメント。

【請求項16】 前記抗体がモノクローナル抗体である、請求項15に記載の抗体またはそのフラグメント。

【請求項17】 薬学的組成物であって、生理学的に受容可能なキャリアと組み合わせて請求項15に記載の抗体またはそのフラグメントを含む、薬学的組成物。

【請求項18】 サンプル中のDSP-5発現を検出するための方法であって、以下：

(a) サンプルを、請求項15に記載の抗体またはその抗原結合フラグメントと、抗体/DSP-5複合体を形成させるに十分な条件かつ時間で接触させる工程；および

(b) 抗体/DSP-5複合体のレベルを検出し、そしてそこからサンプル中のDSP-5の存在を検出する工程、を包含する、方法。

【請求項19】 前記抗体が支持物質に連結される、請求項18に記載の方法。

【請求項20】 前記抗体が検出可能なマーカーに連結される、請求項18に記載の方法。

【請求項21】 前記サンプルが患者から得られた生物学的サンプルである、請求項18に記載の方法。

【請求項22】 サンプル中のDSP-5発現を検出するための方法であっ

て、以下：

(a) サンプルを、請求項10または請求項11に記載のアンチセンスポリヌクレオチドと接触させる工程；および

(b) 該サンプルにおいて該アンチセンスポリヌクレオチドにハイブリダイズするDSP-5ポリヌクレオチドの量を検出し、そしてそこから該サンプル中のDSP-5発現を検出する工程、

を包含する、方法。

【請求項23】 前記アンチセンスポリヌクレオチドにハイブリダイズするDSP-5ポリヌクレオチドの量がポリメラーゼ連鎖反応を用いて決定される、請求項22に記載の方法。

【請求項24】 前記アンチセンスポリヌクレオチドにハイブリダイズするDSP-5ポリヌクレオチドの量がハイブリダイゼーションアッセイを用いて決定される、請求項22に記載の方法。

【請求項25】 前記サンプルがRNA調製物またはcDNA調製物を含む、請求項22に記載の方法。

【請求項26】 DSP-5活性を調節する薬剤についてスクリーニングするための方法であって、以下の工程：

(a) 候補薬剤を、請求項1に記載のポリペプチドと、該ポリペプチドと候補薬剤との間での相互作用を可能にするに十分な条件かつ時間で接触させる工程；ならびに

(b) 引き続き、該ポリペプチドがDSP-5基質を脱リン化する能力を、候補薬剤の非存在下で該ポリペプチドが該DSP-5基質を脱リン酸化する予め決定された能力と比較して評価し；そしてそれからDSP-5活性を調節する薬剤を同定する工程、

を包含する、方法。

【請求項27】 前記DSP-5基質がMAPキナーゼである、請求項26に記載の方法。

【請求項28】 前記候補薬剤が低分子である、請求項26に記載の方法。

【請求項29】 前記低分子がコンビナトリアルライブラリー内に存在する

、請求項26に記載の方法。

【請求項30】 DSP-5活性を調節する薬剤についてスクリーニングするための方法であって、以下の工程：

(a) 候補薬剤を、検出可能な転写物またはタンパク質をコードするポリヌクレオチドに作動可能に連結されたDSP-5プロモーターを含む細胞と、該プロモーターと候補薬剤との間での相互作用を可能にするに十分な条件かつ時間で接触させる工程；ならびに

(b) 引き続き、該ポリヌクレオチドの発現を、候補薬剤の非存在下での発現の予め決定されたレベルと比較して評価し；そしてそれからDSP-5活性を調節する薬剤を同定する工程、

を包含する、方法。

【請求項31】 前記ポリヌクレオチドがDSP-5ポリペプチドをコードする、請求項30に記載の方法。

【請求項32】 前記ポリヌクレオチドがレポータータンパク質をコードする、請求項30に記載の方法。

【請求項33】 細胞における増殖応答を調節するための方法であって、細胞を、DSP-5活性を調節する薬剤と接触させる工程を包含する、方法。

【請求項34】 細胞の分化を調節するための方法であって、細胞を、DSP-5活性を調節する薬剤と接触させる工程を包含する、方法。

【請求項35】 細胞の生存を調節するための方法であって、細胞を、DSP-5活性を調節する薬剤と接触させる工程を包含する、方法。

【請求項36】 前記薬剤が遺伝子発現のパターンを調節する、請求項33～35のいずれか1項に記載の方法。

【請求項37】 前記細胞が細胞成長の接触阻害を示す、請求項33～35のいずれか1項に記載の方法。

【請求項38】 前記細胞が足場非依存性増殖を示す、請求項33～35の

いずれか1項に記載の方法。

【請求項39】 前記細胞が変化した細胞間接着特性を示す、請求項33～35のいずれか1項に記載の方法。

【請求項40】 前記薬剤がアポトーシスを調節する、請求項35に記載の方法。

【請求項41】 前記薬剤が細胞周期を調節する、請求項35に記載の方法。

【請求項42】 前記細胞が患者の中に存在する、請求項32に記載の方法。

【請求項43】 DSP-5活性に関連する障害に罹患した患者を処置するための方法であって、

患者に、DSP-5活性を調節する薬剤の治療有効量を投与する工程を包含する、方法。

【請求項44】 前記障害が、癌、対宿主性移植片病、自己免疫疾患、アレルギー、代謝疾患、異常な細胞成長、異常な細胞増殖、および細胞周期の異常からなる群から選択される、請求項43に記載の方法。

【請求項45】 DSP-5基質捕捉変異体ポリペプチドであって、該ポリペプチドが、DSP-5と比較して実質的には減少していない親和性で基質に結合するように、かつ該ポリペプチドが、基質を脱リン酸化する能力がDSP-5と比較して低下しているように、配列番号3に記載される配列と、配列番号3における残基の50%以下での1つ以上のアミノ酸の欠失、付加、挿入または置換にて異なっている、DSP-5基質捕捉変異体ポリペプチド。

【請求項46】 前記ポリペプチドが、配列番号3の84位または115位での置換を含む、請求項45に記載の基質捕捉変異体ポリペプチド。

【請求項47】 DSP-5と相互作用する能力について分子をスクリーニングする方法であって、以下の工程：

(a) 候補分子を請求項1に記載のポリペプチドと、該候補分子とポリペプチドとを相互作用させるに十分な条件かつ時間で接触させる工程；および

(b) 該ポリペプチドへの該候補分子の結合の存在または非存在を検出し、そし

てそこから該候補分子がDSP-5と相互作用するか否かを決定する工程、を包含する、方法。

【請求項48】 前記検出する工程が、アフィニティー精製工程を包含する、請求項47に記載の方法。

【請求項49】 前記検出する工程が、酵母ツーハイブリットスクリーニングまたはファージディスプレイライブラリーのスクリーニングを包含する、請求項47に記載の方法。

【請求項50】 配列番号4に記載されるDSP-5代替形態の配列あるいはその改変体有する単離されたポリペプチドであって、該改変体は、該ポリペプチドが活性化MAPキナーゼを脱リン酸化する能力を保持するように、配列番号4における残基の50%以下での1以上のアミノ酸欠失、付加、挿入または置換にて異なる、単離されたポリペプチド。

【請求項51】 配列番号4に対応する配列を有するポリペプチドの少なくとも10個の連続アミノ酸をコードする、単離されたポリヌクレオチド。

【請求項52】 配列番号4に対応する配列を有するポリペプチドの少なくとも15個の連続するアミノ酸をコードする、単離されたポリヌクレオチド。

【請求項53】 請求項51または請求項52に記載のポリヌクレオチドを含む、発現ベクター。

【請求項54】 請求項53に記載の発現ベクターを用いて形質転換されたかまたはトランスフェクトされた、宿主細胞。

【請求項55】 請求項50に記載のポリペプチドをコードする、単離されたポリヌクレオチド。

【請求項56】 配列番号2に記載された配列を含む、請求項55に記載のポリヌクレオチド。

【請求項57】 請求項55に記載のポリヌクレオチドを含む、発現ベクター。

【請求項58】 請求項57に記載の発現ベクターを用いて形質転換されたかまたはトランスフェクトされた、宿主細胞。

【請求項59】 請求項55に記載のポリヌクレオチドに相補的な少なくとも

も15個連続するヌクレオチドを含む、アンチセンスポリヌクレオチド。

【請求項60】 配列番号2に記載される配列の相補体に、60にて15分間の $0.1 \times \text{SSC}$ および $0.1\% \text{SDS}$ 中での洗浄を含む条件下で、検出可能にハイブリダイズする、単離されたポリヌクレオチド。

【請求項61】 請求項59または請求項60に記載のポリヌクレオチドを含む、発現ベクター。

【請求項62】 請求項61に記載の発現ベクターを用いて形質転換されたかまたはトランスフェクトされた、宿主細胞。

【請求項63】 DSP-5代替形態ポリペプチドを産生する方法であって、以下の工程：

(a) 請求項58に記載の宿主細胞を、DSP-5代替形態ポリペプチドの発現を可能にする条件下で培養する工程；および

(b) 該宿主細胞培養物から該DSP-5代替形態ポリペプチドを単離する工程、  
を包含する、方法。

【請求項64】 配列番号4の配列を有するDSP-5代替形態ポリペプチドに特異的に結合する、単離された抗体またはその抗原結合フラグメント。

【請求項65】 前記抗体がモノクローナル抗体である、請求項64に記載の抗体またはそのフラグメント。

【請求項66】 薬学的組成物であって、生理学的に受容可能なキャリアと組み合わせて請求項64に記載の抗体またはそのフラグメントを含む、薬学的組成物。

【請求項67】 サンプル中のDSP-5代替形態発現を検出するための方法であって、以下：

(a) サンプルを、請求項64に記載の抗体またはその抗原結合フラグメントと、抗体/DSP-5代替形態複合体を形成させるに十分な条件かつ時間で接触させる工程；および

(b) 抗体/DSP-5代替形態複合体のレベルを検出し、そしてそこからサンプル中のDSP-5代替形態の存在を検出する工程、

を包含する、方法。

【請求項68】 前記抗体が支持物質に連結される、請求項67に記載の方法。

【請求項69】 前記抗体が検出可能なマーカーに連結される、請求項67に記載の方法。

【請求項70】 前記サンプルが患者から得られた生物学的サンプルである、請求項67に記載の方法。

【請求項71】 サンプル中のDSP-5代替形態発現を検出するための方法であって、以下：

(a) サンプルを、請求項59または請求項60に記載のアンチセンスポリヌクレオチドと接触させる工程；および

(b) 該サンプルにおいて該アンチセンスポリヌクレオチドにハイブリダイズするDSP-5代替形態ポリヌクレオチドの量を検出し、そしてそこから該サンプル中のDSP-5代替形態発現を検出する工程、  
を包含する、方法。

【請求項72】 前記アンチセンスポリヌクレオチドにハイブリダイズするDSP-5代替形態ポリヌクレオチドの量がポリメラーゼ連鎖反応を用いて決定される、請求項71に記載の方法。

【請求項73】 前記アンチセンスポリヌクレオチドにハイブリダイズするDSP-5代替形態ポリヌクレオチドの量がハイブリダイゼーションアッセイを用いて決定される、請求項71に記載の方法。

【請求項74】 前記サンプルがRNA調製物またはcDNA調製物を含む、請求項71に記載の方法。

【請求項75】 DSP-5代替形態活性を調節する薬剤についてスクリーニングするための方法であって、以下の工程：

(a) 候補薬剤を、請求項50に記載のポリペプチドと、該ポリペプチドと候補薬剤との間での相互作用を可能にするに十分な条件かつ時間で接触させる工程；  
ならびに

(b) 引き続いて、該ポリペプチドがDSP-5代替形態基質を脱リン化する能

力を、候補薬剤の非存在下で該ポリペプチドが該DSP-5代替形態基質を脱リン酸化する予め決定された能力と比較して評価し；そしてそれからDSP-5代替形態活性を調節する薬剤を同定する工程、  
を包含する、方法。

【請求項76】 前記DSP-5代替形態基質がMAPキナーゼである、請求項75に記載の方法。

【請求項77】 前記候補薬剤が低分子である、請求項75に記載の方法。

【請求項78】 前記低分子がコンビナトリアルライブラリー内に存在する、請求項75に記載の方法。

【請求項79】 DSP-5代替形態活性を調節する薬剤についてスクリーニングするための方法であって、以下の工程：

(a) 候補薬剤を、検出可能な転写物またはタンパク質をコードするポリヌクレオチドに作動可能に連結されたDSP-5代替形態プロモーターを含む細胞と、該プロモーターと候補薬剤との間での相互作用を可能にするに十分な条件かつ時間で接触させる工程；ならびに

(b) 引き続き、該ポリヌクレオチドの発現を、候補薬剤の非存在下での発現の予め決定されたレベルと比較して評価し；そしてそれからDSP-5代替形態活性を調節する薬剤を同定する工程、  
を包含する、方法。

【請求項80】 前記ポリヌクレオチドがDSP-5代替形態ポリペプチドをコードする、請求項79に記載の方法。

【請求項81】 前記ポリヌクレオチドがレポータータンパク質をコードする、請求項79に記載の方法。

【請求項82】 細胞における増殖応答を調節するための方法であって、  
細胞を、DSP-5代替形態活性を調節する薬剤と接触させる工程  
を包含する、方法。

【請求項83】 細胞の分化を調節するための方法であって、  
細胞を、DSP-5代替形態活性を調節する薬剤と接触させる工程  
を包含する、方法。

【請求項84】 細胞の生存を調節するための方法であって、細胞を、DSP-5代替形態活性を調節する薬剤と接触させる工程を包含する、方法。

【請求項85】 前記薬剤が遺伝子発現のパターンを調節する、請求項82～84のいずれか1項に記載の方法。

【請求項86】 前記細胞が細胞成長の接触阻害を示す、請求項82～84のいずれか1項に記載の方法。

【請求項87】 前記細胞が足場非依存性増殖を示す、請求項82～84のいずれか1項に記載の方法。

【請求項88】 前記細胞が変化した細胞間接着特性を示す、請求項82～84のいずれか1項に記載の方法。

【請求項89】 前記薬剤がアポトーシスを調節する、請求項84に記載の方法。

【請求項90】 前記薬剤が細胞周期を調節する、請求項84に記載の方法。

【請求項91】 前記細胞が患者の中に存在する、請求項81に記載の方法。

【請求項92】 DSP-5代替形態活性に関連する障害に罹患した患者を処置するための方法であって、

患者に、DSP-5代替形態活性を調節する薬剤の治療有効量を投与する工程を包含する、方法。

【請求項93】 前記障害が、癌、対宿主性移植片病、自己免疫疾患、アレルギー、代謝疾患、異常な細胞成長、異常な細胞増殖、および細胞周期の異常からなる群から選択される、請求項92に記載の方法。

【請求項94】 DSP-5代替形態基質捕捉変異体ポリペプチドであって、該ポリペプチドが、DSP-5代替形態と比較して実質的には減少していない親和性で基質に結合するように、かつ該ポリペプチドが、基質を脱リン酸化する能力がDSP-5代替形態と比較して低下しているように、配列番号4に記載される配列と、配列番号4における残基の50%以下での1つ以上のアミノ酸の欠

失、付加、挿入または置換にて異なっている、DSP-5代替形態基質捕捉変異体ポリペプチド。

【請求項95】 前記ポリペプチドが、配列番号4の84位または115位での置換を含む、請求項94に記載の基質捕捉変異体ポリペプチド。

【請求項96】 DSP-5代替形態と相互作用する能力について分子をスクリーニングする方法であって、以下の工程：

(a) 候補分子を請求項50に記載のポリペプチドと、該候補分子とポリペプチドとを相互作用させるに十分な条件かつ時間で接触させる工程；および

(b) 該ポリペプチドへの該候補分子の結合の存在または非存在を検出し、そしてそこから該候補分子がDSP-5代替形態と相互作用するか否かを決定する工程、

を包含する、方法。

【請求項97】 前記検出する工程が、アフィニティー精製工程を包含する、請求項96に記載の方法。

【請求項98】 前記検出する工程が、酵母ツーハイブリットスクリーニングまたはファージディスプレイライブラリーのスクリーニングを包含する、請求項96に記載の方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

## (技術分野)

本発明は、一般的に、細胞増殖、細胞分化、および/または細胞生存における欠損と関連する状態を処置するために有用な組成物および方法に関する。本発明は、より詳細には、二重特異性プロテインホスファターゼおよびそのポリペプチド改変体に関する。本発明はまた、増殖性応答、細胞分化、および/または細胞生存をもたらすシグナル伝達を調節する抗体および他の薬剤（低分子を含む）の同定のためのそのようなポリペプチドの使用に関する。

## 【0002】

## (発明の背景)

マイトジェン活性化プロテインキナーゼ(MAPキナーゼ)は、種々の保存性のメンバーを有する保存された細胞シグナル伝達経路の構成要素として存在する。MAPキナーゼは、配列Thr-X-Tyrを有する二重リン酸化モチーフにおけるリン酸化(MAPキナーゼキナーゼによる)によって活性化される。ここで、チロシン残基およびスレオニン残基でのリン酸化が活性に必要である。活性化されたMAPキナーゼは、いくつかの伝達標的(transduction target)(転写薬剤を含む)をリン酸化する。MAPキナーゼの不活化は、MAPキナーゼホスファターゼと呼ばれる二重特異性ホスファターゼによる、この部位での脱リン酸化によって媒介される。高等真核生物において、MAPキナーゼシグナル伝達の生理的役割は、増殖、腫瘍形成、発生、および分化のような、細胞内事象と相関していた。従って、これらの経路を介してシグナル伝達を調節する能力は、MAPキナーゼシグナル伝達と関連するヒト疾患(例えば、癌)についての処置および予防療法の開発をもたらし得る。

## 【0003】

二重特異性プロテインチロシンホスファターゼ(二重特異性ホスファターゼ)は、ホスホチロシン残基とホスホスレオニン/セリン残基との両方を脱リン酸化するホスファターゼである(Waltonら、Ann.Rev.Biochem.62:101-120、1993)。MAPキナーゼを不活性化するいくつか

の二重特異性ホスファターゼが同定されており、これらには、MKP - 1 (WO 97/00315 ; KeyseおよびEmslie、Nature 59:644-647、1992)、MKP - 4、MKP - 5、MKP - 7、Hb5 (WO 97/06245)、PAC1 (Wardら、Nature 367:651-654、1994)、HvH2 (GuanおよびButch、J. Biol. Chem. 270:7197-7203、1995)、およびPYST1 (Groomら、EMBO J. 15:3621-3632、1996)が含まれる。特定の二重特異性ホスファターゼの発現は、ストレスまたはマイトジェンによって誘導されるが、他の二重特異性ホスファターゼは、特定の細胞型において構成的に発現されるようである。二重特異性ホスファターゼの発現および活性の調節は、細胞増殖、細胞分化、および細胞生存を含む、MAPキナーゼ媒介性の細胞機能の制御に重要である。例えば、二重特異的ホスファターゼは、細胞増殖のネガティブレギュレーターとして機能し得る。細胞の型または活性化に関して種々の特異性を有する、多くのこのような二重特異性ホスファターゼが存在する可能性がある。しかし、二重特異性ホスファターゼの調節は、理解が乏しいままであり、そして比較的少ない数の二重特異性ホスファターゼのみしか同定されていない。

#### 【0004】

従って、当該分野において、MAPキナーゼシグナル伝達カスケードにおける、MAPシグナル伝達、および二重特異性ホスファターゼの調節の理解の改善についての必要性が存在する。二重特異性ホスファターゼ調節の理解の増加は、MAPキナーゼカスケードに関与するタンパク質の活性を調節するための方法の開発、およびこのようなカスケードと関連する状態を処置するための方法の開発を容易にし得る。本発明は、これらの必要性を満足し、そしてさらに、他の関連する利点を提供する。

#### 【0005】

##### (発明の要旨)

手短に述べれば、本発明は、細胞増殖応答を調節し得る薬剤を同定するための組成物および方法を提供する。1つの局面において、本発明は、配列番号2に列

拳されるDSP-5の配列またはその改変体を有する単離されたDSP-5ポリペプチドを提供し、この改変体は、そのポリペプチドが活性化MAPキナーゼを脱リン酸化する能力を保持しているように、配列番号2の残基の50%以下での1以上アミノ酸の欠失、付加、挿入、または置換にて異なる。

【0006】

さらなる局面において、本発明は、配列番号2に対応する配列を有するポリペプチドの少なくとも10個連続するアミノ酸をコードする単離されたポリヌクレオチドを提供する。特定の実施形態において、本発明は、配列番号2に対応する配列を有するポリペプチドの少なくとも15個連続するアミノ酸をコードする単離されたポリヌクレオチドを提供する。特定のこのようなポリヌクレオチドは、DSP-5ポリペプチドをコードする。なおさらに、ポリヌクレオチドは、DSP-5ポリヌクレオチドの一部に相補的である少なくとも15個連続するヌクレオチドを含み、かつ/または $0.1 \times SSC$ および $0.1\%$  SDS中で、50

で、少なくとも15分間の洗浄を含む条件下で、配列番号1に列挙される配列の相補体に検出可能にハイブリダイズする、アンチセンスポリヌクレオチドであり得る。前述のポリヌクレオチドのいずれかを含む発現ベクター、およびそのような発現ベクターで形質転換またはトランスフェクトされた宿主細胞もまた、提供される。

【0007】

本発明はさらに、他の局面において、以下の工程：(a) DSP-5ポリペプチドの発現を可能にする条件下で、上記のような宿主細胞を培養する工程；および(b)上記宿主細胞培養物からDSP-5ポリペプチドを単離する工程、を包含する、DSP-5ポリペプチドを産生するための方法を提供する。

【0008】

DSP-5ポリペプチド（例えば、配列番号2の配列を有するポリペプチド）に特異的に結合する、単離された抗体およびその抗原結合フラグメントもまた、本発明によって提供される。

【0009】

本発明はさらに、他の局面において、上記のようなポリペプチド、ポリヌクレ

オチド、抗体またはそのフラグメントを、生理学的に受容可能なキャリアと合わせて含む、薬学的組成物を提供する。

【0010】

さらなる局面において、本発明は、サンプル中のDSP-5発現を検出するための方法を提供し、この方法は、(a)抗体/DSP-5複合体の形成を可能にするのに十分な条件下かつ時間の間、サンプルを、上記のような抗体またはその抗原結合フラグメントと接触させる工程；および(b)抗体/DSP-5複合体のレベルを検出する工程、を包含する。

【0011】

なお他の局面において、本発明は、サンプル中のDSP-5発現を検出するための方法を提供し、この方法は、(a)サンプルを、上記のようなアンチセンスポリヌクレオチドと接触させる工程；および(b)そのアンチセンスポリヌクレオチドとハイブリダイズするDSP-5ポリヌクレオチドの量を、そのサンプル中で検出する工程、を包含する。例えば、ポリメラーゼ連鎖反応またはハイブリダイゼーションアッセイを用いて、そのアンチセンスポリヌクレオチドとハイブリダイズするDSP-5ポリヌクレオチドの量が決定され得る。

【0012】

本発明はまた、酵素活性および/または基質結合のモジュレーターについてのスクリーニングアッセイにおいて有用なDSP-5ポリペプチドを提供する。他の局面において、DSP-5活性を調節する薬剤についてスクリーニングするための方法もまた提供され、この方法は以下の工程を包含する：(a)候補薬剤を上記のようなDSP-5ポリペプチドと、そのポリペプチドと候補薬剤との間の相互作用を可能にするのに十分な条件下かつ時間の間、接触させる工程；および(b)続いて、候補薬剤の非存在下で、そのポリペプチドがDSP-5基質を脱リン酸化する予め決定した能力と比較して、DSP-5基質を脱リン酸化するそのポリペプチドの能力を評価する工程。このような方法は、インビトロまたは細胞環境中(例えば、インタクトな細胞中)で実施され得る。

【0013】

さらなる局面において、DSP-5活性を調節する薬剤についてスクリーニン

グするための方法が提供され、この方法は、以下の工程を包含する：(a) 候補薬剤を、検出可能な転写物またはタンパク質をコードするポリヌクレオチドに作動可能に連結されたDSP-5プロモーターを含む細胞と、そのプロモーターと候補薬剤との間の相互作用を可能にするに十分な条件かつ時間で、接触させる工程；ならびに引き続いて(b) 候補薬剤の非存在下での予め決定したレベルの発現と比較して、そのポリヌクレオチドの発現を評価する工程。

【0014】

また、細胞における増殖性応答を調節するための方法も提供され、その方法は、DSP-5活性を調節する薬剤と細胞を接触させる工程を包含する。

【0015】

さらなる局面において、細胞の分化を調節するための方法が提供され、その方法は、DSP-5活性を調節する薬剤と細胞を接触させる工程を包含する。

【0016】

本発明はさらに、細胞の生存を調節するための方法を提供し、その方法は、DSP-5活性を調節する薬剤と細胞を接触させる工程を包含する。

【0017】

関連する局面において、本発明は、DSP-5活性と関連する(かまたは、DSP-5の投与により処置可能な)障害に罹患した患者を処置するための方法を提供し、この方法は、DSP-5活性を調節する薬剤の治療上有効な量を患者に投与する工程を包含する。このような障害としては、癌、対宿主性移植片病、自己免疫疾患、アレルギー、代謝疾患、異常な細胞成長(growth)、異常な細胞増殖(proliferation)および細胞周期異常が、挙げられる。

【0018】

さらなる局面において、DSP-5基質捕捉変異体ポリペプチドが提供される。このようなポリペプチドは、そのポリペプチドが、DSP-5と比較して実質的には減少していない親和性にて基質に結合するように、かつそのポリペプチドが基質を脱リン酸化する能力は、DSP-5と比較して減少しているように、配列番号2中の残基の50%以下での1つ以上のアミノ酸の欠失、付加、挿入または置換にて、配列番号2に記載される配列と異なる。特定の実施形態において、

基質捕捉変異体ポリペプチドは、配列番号2の84位または115位の置換を含む。

#### 【0019】

本発明はさらに、他の局面において、DSP-5と相互作用する能力について分子をスクリーニングするための方法を提供し、この方法は、以下の工程を包含する：(a)候補分子を上記のDSP-5ポリペプチドまたはその改変体と、その候補分子とポリペプチドとが相互作用するのを可能にするに十分な条件かつ時間で、接触させる工程；ならびに(b)そのポリペプチドへのその候補分子の結合の存在または非存在を検出する工程。この検出工程は、例えば、アフィニティ精製工程、酵母ツーハイブリッドスクリーニング、またはファージディスプレイのスクリーニングを含み得る。

#### 【0020】

1つの局面において、本発明は、配列番号4に記載されるDSP-5代替形態の配列またはその改変体を有する単離されたDSP-5ポリペプチドを提供し、この改変体は、配列番号4の残基の50%以下において、1以上のアミノ酸欠失、付加、挿入または置換にて異なり、その結果、このポリペプチドは、活性化MAP-キナーゼを脱リン酸化する能力を保持する。

#### 【0021】

さらなる局面において、本発明は、配列番号4に対応する配列を有するポリペプチドの少なくとも10個の連続アミノ酸をコードする単離されたポリヌクレオチドを提供する。特定の実施形態において、本発明は、配列番号4に対応する配列を有するポリペプチドの少なくとも15個の連続したアミノ酸をコードする単離されたポリヌクレオチドを提供する。特定のこのようなポリヌクレオチドは、DSP-5代替形態ポリペプチドをコードする。なおさらに、ポリヌクレオチドは、DSP-5代替形態のポリペプチドの一部に相補的な少なくとも15個の連続したヌクレオチドを含み、そして/または60での15分間の0.1X SSCおよび0.1% SDS中での洗浄を含む条件下で、配列番号2に記載される配列の相補体に検出可能にハイブリダイズするアンチセンスポリヌクレオチドであり得る。前述のポリヌクレオチドのいずれかを含む発現ベクター、およびこ

のような発現ベクターで形質転換またはトランスフェクトされる宿主細胞がまた、提供される。

【0022】

他の局面において、本発明はさらに、以下の工程：(a) DSP-5代替形態ポリペプチドの発現を可能にする条件下で、上記の宿主細胞を培養する工程；および(b) DSP-5代替形態ポリペプチドを宿主細胞培養物から単離する工程、を包含する DSP-5代替形態ポリペプチドを産生するための方法をさらに提供する。

【0023】

単離された抗体、およびその抗原結合フラグメント（これらは、配列番号4の配列を有するポリペプチドのような DSP-5代替形態のポリペプチドに特異的に結合する）がまた、本発明により提供される。

【0024】

他の局面において、本発明は、さらに、生理学的に受容可能なキャリアと組み合わせ、上記のようなポリペプチド、ポリヌクレオチド、抗体またはそのフラグメントを含む薬学的組成物を提供する。

【0025】

さらなる局面において、本発明は、以下の工程を含む、サンプル中の DSP-5代替形態発現を検出するための方法を提供する：(a) 抗体 / DSP-5代替形態複合体の形成を可能にするのに十分な条件でかつ時間で、上記のような抗体またはその抗原結合フラグメントとサンプルを接触させる工程；および(b) 抗体 / DSP-5代替形態複合体のレベルを検出する工程。

【0026】

なお他の局面において、本発明は、以下の工程を含む、サンプル中の DSP-5代替形態発現を検出するための方法を提供する：(a) 上記のようなアンチセンスポリヌクレオチドとサンプルを接触させる工程；および(b) サンプル中のアンチセンスポリヌクレオチドにハイブリダイズする DSP-5代替形態ポリヌクレオチドの量を検出する工程。アンチセンスポリヌクレオチドにハイブリダイズする DSP-5代替形態ポリヌクレオチドの量を、例えば、ポリメラーゼ連鎖

反応またはハイブリダイゼーションアッセイを用いて検出し得る。

【0027】

本発明はまた、酵素活性および/または基質結合のモジュレーターについてのスクリーニングアッセイに有用なDSP-5代替形態のポリペプチドを提供する。他の局面において、以下の工程を含む、DSP-5代替形態活性を調節する薬剤についてのスクリーニングのための方法がまた、提供される：(a)ポリペプチドと候補薬剤との間の相互作用を可能にするに十分な条件下でかつ時間で、上記のようなポリペプチドと候補薬剤を接触させる工程；および(b)候補薬剤の非存在でDSP-5代替形態基質を脱リン酸化するポリペプチドの予め決定された能力と比較して、DSP-5代替形態基質を脱リン酸化するポリペプチドの能力をその後に評価する工程。このような方法は、インビボまたは細胞環境（例えば、インタクトな細胞内で）実施され得る。

【0028】

さらなる局面において、以下の工程を包含する、DSP-5代替形態活性を調節する薬剤についてスクリーニングするための方法が、提供される：(a)プロモーターと候補薬剤との間の相互作用を可能にするに十分な条件下でかつ時間で、検出可能な転写物またはタンパク質をコードするポリヌクレオチドに操作可能に連結されたDSP-5代替形態プロモーターを含む細胞と候補薬剤を接触させる工程；および(b)候補薬剤の非存在下で発現の予め決定されたレベルと比較して、ポリヌクレオチドの発現をその後に評価する工程。

【0029】

DSP-5代替形態活性を調節する薬剤と細胞を接触させる工程を包含する、細胞における増殖応答を調節するための方法がまた、提供される。

【0030】

さらなる局面において、DSP-5代替形態活性を調節する薬剤と細胞を接触させる工程を包含する、細胞の分化を調節する方法が、提供される。

【0031】

本発明は、さらに、DSP-5代替形態活性を調節する薬剤と細胞を接触させる工程を包含する、細胞生存を調節するための方法を提供する。

## 【0032】

関連した局面において、本発明は、DSP-5代替形態活性に関連する障害（またはDSP-5代替形態の投与によって処置可能な障害）に罹患する患者を処置する方法を提供する。この方法は、DSP-5代替形態活性を調節する治療有効量の薬剤を患者に投与する工程を包含する。このような障害としては、癌、対宿主性移植片病、自己免疫疾患、アレルギー、代謝疾患、異常な細胞成長（growth）、異常な細胞増殖（proliferation）および細胞周期異常が、挙げられる。

## 【0033】

さらなる局面において、変異ポリペプチドを捕捉するDSP-5代替形態基質が提供される。このようなポリペプチドは、配列番号4における残基の50%以下における1以上のアミノ酸欠失、付加、挿入または置換にて配列番号4に記載される配列と異なり、その結果、このポリペプチドは、DSP-5代替形態に比較して実質的に減少されない親和性で基質に結合し、かつ基質を脱リン酸化するこのポリペプチドの能力は、DSP-5代替形態に比較して減少される。特定の特異的实施形態において、基質捕捉変異ポリペプチドは、配列番号4の84位または115位に置換を含む。

## 【0034】

他の局面において、本発明は、さらに、以下の工程を包含する、DSP-5代替形態と相互作用する能力について分子をスクリーニングするための方法を提供する：（a）候補分子およびポリペプチドに相互作用させるに十分な条件下かつ時間で上記のようなDSP-5代替形態ポリペプチドまたはその改変体と候補分子を接触させる工程；および（b）候補分子のポリペプチドへの結合の存在または非存在を検出する工程。検出する工程は、例えば、アフィニティー精製工程、酵母ツーハイブリッドスクリーンまたはファージディスプレイライブラリーのスクリーンを含み得る。

## 【0035】

本発明のこれらの局面および他の局面は、以下の詳細な説明および添付の図面を参照することによって、明らかになる。本明細書中に開示されるすべての参考

文献は、各々が個別に援用されたかのように、その全体が参考として本明細書中に援用される。

【0036】

(発明の詳細な説明)

上記のように、本発明は、一般的に、インビトロおよびインビボでの細胞増殖性応答を調節(すなわち、刺激または阻害)するための、組成物および方法に関する。詳細には、本発明は、二重特異性ホスファターゼDSP-5またはDSP-5代替形態(図1~4;配列番号1~4)、ならびにその改変体、ならびにDSP-5またはDSP-5代替形態に特異的に結合する抗体を提供する。また、本明細書中に提供されるのは、スクリーニング、検出アッセイ、および関連する治療用途のためにこのような化合物を使用するための、方法である。

【0037】

(DSP-5ポリペプチドおよびDSP-5ポリヌクレオチド)

本明細書中で使用される場合、用語「DSP-5ポリペプチド」または「DSP-5代替形態ポリペプチド」とは、本明細書中に提供されるようなDSP-5配列またはそのような配列の改変体を含む、ポリペプチドをいう。このようなポリペプチドは、DSP-5基質中のチロシン残基およびスレオニン/セリン残基の両方を脱リン酸化し得、ネイティブの全長DSP-5またはDSP-5代替形態の活性と比較して、実質的には減少していない活性を有する。DSP-5またはDSP-5代替形態基質は、活性化(すなわち、リン酸化)MAP-キナーゼを含む。他の基質は、本明細書中で記載されるように、基質捕捉変異体を使用して同定され得、そして1つ以上のリン酸化チロシン残基、スレオニン残基および/またはセリン残基を有する、ポリペプチドを含む。

【0038】

本発明の範囲内のDSP-5またはDSP-5代替形態ポリペプチド改変体は、1つ以上の置換、欠失、付加および/または挿入を含み得る。特定のDSP-5またはDSP-5代替形態改変体について、この改変体が、DSP-5基質内のチロシンおよびスレオニン残基を脱リン酸化する能力は、実質的には減少しない。このようなDSP-5改変体が、DSP-5基質内のチロシンおよびスレオ

ニン残基を脱リン酸化する能力は、ネイティブのDSP-5またはDSP-5代替形態と比較して、増強され得るか、または無変化であり得るか、あるいは、ネイティブのDSP-5またはDSP-5代替形態と比較して、50%未満減少され得、そして好ましくは、20%未満減少され得る。このような改変体は、本明細書中で提供される代表的なアッセイを使用して、同定され得る。

### 【0039】

本発明によって、特定の機能が無能力にされているDSP-5またはDSP-5代替形態の改変された形態もまた意図される。例えば、このようなタンパク質は、構成的に活性または不活性であり得るか、あるいは、変更された結合性質または触媒性質を示し得る。このような変更されたタンパク質は、周知技術を使用して生成され得、そして変更された機能は、本明細書中で提供されるようなスクリーニングを使用して確認され得る。特定の改変されたDSP-5またはDSP-5代替形態ポリペプチドは、「基質捕捉変異体」として公知である。このようなポリペプチドは、基質を結合する能力を保持する（すなわち、 $K_m$ が実質的には減少していない）が、基質を脱リン酸化する能力の減少（すなわち、 $k_{cat}$ が、好ましくは、1分当たり1未満まで減少している）を示す。さらに、基質捕捉変異体/基質複合体の安定性は、DSP-5/基質複合体（DSP-5代替形態/基質複合体を含む）の安定性と比較して、実質的に減少していないはずである。複合体安定性は、会合定数（ $K_a$ ）に基づいて評価され得る。 $K_m$ 、 $k_{cat}$ および $K_a$ の決定は、当該分野で公知の標準的な技術（例えば、WO 98/04712; Lehninger, Biochemistry, 1975 Worth Publishers, NYを参照のこと）および本明細書中で提供されるアッセイを使用して、容易に達成され得る。基質捕捉変異体は、例えば、84位または115位でのアミノ酸置換によりDSP-5またはDSP-5代替形態を改変することによって（例えば、84位のアミノ酸アスパラギン酸をアラニン残基で置換することによって、または残基115のシステインをセリンで置換することによって）生成され得る。基質捕捉変異体は、例えば、DSP-5基質を同定するために使用され得る。手短に言えば、改変されたDSP-5またはDSP-5代替形態が、候補基質と接触されて（単独、または細胞抽出物のようなタンパ

ク質の混合物内で)、基質/DSP-5複合体の形成が可能になり得る。次いで、この複合体は、従来技術によって単離され得、基質の単離および特徴付けが可能になり得る。基質捕捉変異体の調製および使用は、例えば、PCT公開番号WO 98/04712に記載される。

#### 【0040】

好ましくは、改変体は、保存的置換を含む。「保存的置換」は、ペプチド化学の当業者が、そのポリペプチドの二次構造および親水疎水度(hydrophathy)が実質的に変化しないことを予期するように、1つのアミノ酸が、類似の性質を有する別のアミノ酸に代わって置換されている、置換である。アミノ酸置換は、一般的に、残基の極性、電荷、溶解度、疎水性、親水性および/または両親媒性性質の類似性に基づいてなされ得る。例えば、負に荷電したアミノ酸としては、アスパラギン酸およびグルタミン酸が挙げられる；正に荷電したアミノ酸としては、リシンおよびアルギニンが挙げられる；ならびに類似の親水性価を有する非荷電の極性ヘッド基(head group)を有するアミノ酸としては、ロイシン、イソロイシンおよびバリン；グリシンおよびアラニン；アスパラギンおよびグルタミン；ならびにセリン、スレオニン、フェニルアラニンおよびチロシンが挙げられる。保存的变化を代表し得るアミノ酸の他のグループとしては以下が挙げられる：(1) ala、pro、gly、glu、asp、gln、asn、ser、thr；(2) cys、ser、tyr、thr；(3) val、ile、leu、met、ala、phe；(4) lys、arg、his；および(5) phe、tyr、trp、his。改変体はまた、あるいは代わりに、非保存的变化を含み得る。

#### 【0041】

一般的に、改変は、重要でない領域において、より容易になされ得、重要でない領域とは、DSP-5またはDSP-5代替形態の活性を実質的には変化しないネイティブ配列の領域である。重要でない領域は、本明細書中に記載されるような、特定の領域におけるDSP-5またはDSP-5代替形態配列の改変、およびホスファターゼアッセイにおける得られた改変体の能力の評価によって同定され得る。好ましい配列改変は、活性部位ドメイン(VHCHAGVSRVA

II、配列番号5)を保持するようになされる。特定の好ましい実施形態において、このような改変は、DSP-5またはDSP-5代替形態と、DSP-5基質以外の細胞成分との間の相互作用に影響を及ぼす。しかし、置換はまた、得られた改変体が、基質脱リン酸化を刺激する能力を実質的に保持するならば、ネイティブタンパク質の重要な領域においてなされ得る。特定の実施形態において、改変体は、50%以下、好ましくは、25%以下のアミノ酸残基の、置換、欠失、付加および/または挿入を含む。

#### 【0042】

改変体はまた(あるいは、代わりに)、例えば、そのポリペプチドの活性に対して最小の影響を有するアミノ酸の欠失または付加によって改変され得る。特に、改変体は、アミノ末端および/またはカルボキシ末端で、さらなるアミノ酸配列を含み得る。このような配列は、例えば、そのポリペプチドの精製または検出を容易にするために使用され得る。

#### 【0043】

DSP-5ポリペプチド(またはDSP-5代替形態ポリペプチド)は、種々の周知技術のうちのいずれかを使用して調製され得る。以下に記載されるようなDNA配列によってコードされる組換えポリペプチドは、当業者に公知の種々の発現ベクターのうちのいずれかを使用して、それらのDNA配列から容易に調製され得る。発現は、組換えポリペプチドをコードするDNA分子を含む発現ベクターで形質転換されたかまたはトランスフェクトされた、任意の適切な宿主細胞において達成され得る。適切な宿主細胞としては、原核生物、酵母および高等真核生物細胞(哺乳動物細胞を含む)が挙げられ、そしてグリコシル化にて異なる形態が、宿主細胞または単離後のプロセッシングを変化させることによって生成され得る。培養培地へ組換えタンパク質またはポリペプチドを分泌する適切な宿主/ベクター系由来の上清は、市販のフィルターを使用して最初に濃縮され得る。濃縮後、その濃縮物は、適切な精製マトリックス(例えば、アフィニティマトリックスまたはイオン交換樹脂)に適用され得る。最終的に、1つ以上の逆相HPLC工程を利用して、組換えポリペプチドがさらに精製され得る。

#### 【0044】

約100個よりも少ないアミノ酸、そして一般的には約50個よりも少ないアミノ酸を有する、部分および他の改変体はまた、当業者に周知の技術を使用して、合成手順によって生成され得る。例えば、このようなポリペプチドは、市販の固相技術(例えば、Merri field固相合成法)のうちのいずれかを使用して、合成され得、ここで、アミノ酸は、連続して、伸長するアミノ酸鎖に付加される。Merri field, J. Am. Chem. Soc. 85: 2149-2146, 1963を参照のこと。ポリペプチドの自動合成のための装置は、Perkin-Elmer, Inc., Applied BioSystems Division (Foster City, CA)のような供給者から市販されており、そして製造業者の使用説明書に従って、操作され得る。

#### 【0045】

「DSP-5ポリヌクレオチド」は、DSP-5またはDSP-5代替形態ポリペプチドまたはその改変体の少なくとも一部分をコードする任意のポリヌクレオチドであるか、あるいはこのようなポリヌクレオチドに相補的である任意のポリヌクレオチドである。好ましいポリヌクレオチドは、DSP-5またはDSP-5代替形態ポリペプチドをコードするかまたはこのような配列に相補的である、少なくとも15個連続したヌクレオチド、好ましくは、少なくとも30個連続したヌクレオチドを含む。特定のポリヌクレオチドは、DSP-5またはDSP-5代替形態ポリペプチドをコードする；他のポリヌクレオチドは、以下に記載されるようなプローブ、プライマーまたはアンチセンスオリゴヌクレオチドとしての使用を見出し得る。ポリヌクレオチドは、一本鎖(コード鎖またはアンチセンス鎖)あるいは二本鎖であり得、そしてDNA(ゲノムDNA、cDNAまたは合成DNA)分子あるいはRNA分子であり得る。さらなるコード配列または非コード配列が、本発明のポリヌクレオチド内に存在し得るが、必ずしもその必要はなく、そしてポリヌクレオチドは、他の分子および/または支持物質に連結され得るが、必ずしもその必要はない。

#### 【0046】

DSP-5ポリヌクレオチドは、ネイティブ配列(すなわち、内因性DSP-5またはDSP-5代替形態配列あるいはその一部分またはスプライス改変体)

を含み得るか、あるいはこのような配列の改変体を含み得る。ポリヌクレオチド改変体は、上記のように、コードされたポリペプチドの活性が、実質的には減少しないように、1つ以上の置換、付加、欠失および/または挿入を含み得る。コードされたポリペプチドの活性に対する効果は、一般的に、本明細書中に記載されるように評価され得る。改変体は、好ましくは、ネイティブのDSP-5またはDSP-5代替形態またはその一部分をコードするポリヌクレオチド配列に、少なくとも約70%の同一性、より好ましくは、少なくとも約80%の同一性および最も好ましくは、少なくとも約90%の同一性を示す。パーセント同一性は、AlignまたはBLASTアルゴリズム(Altschul, J. Mol. Biol. 219:555-565, 1991; HenikoffおよびHenikoff, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89:10915-10919, 1992)のような当業者に周知のコンピュータアルゴリズムを使用して、配列を比較することによって容易に決定され得、このアルゴリズムは、NCBIウェブサイト(<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-bin/BLAST>)で入手可能である。デフォルトパラメータが使用され得る。特定の改変体は、ネイティブの遺伝子に実質的に相同性である。このようなポリヌクレオチド改変体は、中程度にストリンジェントな条件下で、ネイティブのDSP-5またはDSP-5代替形態(または、相補的配列)をコードする天然に存在するDNA配列またはRNA配列とハイブリダイズし得る。適切な中程度にストリンジェントな条件は、例えば、5×SSC、0.5% SDS、1.0mM EDTA(pH 8.0)の溶液中で予め洗浄する工程; 50~68℃、5×SSCで、1~16時間(例えば、一晚)ハイブリダイズする工程; その後、65℃までにて20~40分間で1回または2回、0.05~0.1% SDSを含む2×SSC、0.5×SSCおよび0.2×SSCの各々の1つ以上で、洗浄する工程を包含する。さらなるストリンジェンシーのために、条件は、50~60℃、15~40分間の0.1×SSCおよび0.1% SDSでの洗浄を含み得る。当業者に公知のように、ハイブリダイゼーション条件のストリンジェンシーの変化は、プレハイブリダイゼーション工程、ハイブリダイゼーション工程および洗浄工程のために使用される時間、温度および

／または溶液の濃度を変更することによって達成され得、そして適切な条件はまた、使用されるプローブの特定のヌクレオチド配列、およびプロットされた発端 ( p r o b a n d ) の核酸サンプルの特定のヌクレオチド配列に部分的に依存し得る。従って、適切にストリンジェントな条件は、プローブの所望の選択性が、1つ以上の特定の発端配列にハイブリダイズするが他の特定の発端配列にはハイブリダイズしない能力に基づいて、同定される場合、過度の実験を伴わずに容易に選択され得ることが認識される。

#### 【0047】

遺伝コードの縮重の結果として、本明細書中に記載される通りのポリペプチドをコードする多くのヌクレオチド配列が存在することもまた当業者によって認識される。これらのポリヌクレオチドのうちいくつかは、任意のネイティブな遺伝子のヌクレオチド配列に対して最小の相同性を保有する。それにもかかわらず、コドン使用法の相違に起因して変化するポリヌクレオチドが、本発明によって特に意図される。

#### 【0048】

ポリヌクレオチドは、任意の種々の技術を用いて調製され得る。例えば、ポリヌクレオチドは、適切な細胞または組織型（例えば、ヒトの胸、精巣または胸腺）から調製されたcDNAから増幅され得る。このようなポリヌクレオチドは、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）を介して増幅され得る。このアプローチについては、配列特異的プライマーが、本明細書中に提供される配列に基づいて設計され得、そして購入または合成され得る。

#### 【0049】

増幅された部分を用い、周知の技術を用いて全長の遺伝子が適切なライブラリー（例えば、ヒト脳、精巣、または胸腺のcDNA）から単離され得る。このような技術内で、増幅に適切な1以上のポリヌクレオチドプローブまたはポリヌクレオチドプライマーを用いてライブラリー（cDNAまたはゲノム）がスクリーニングされる。好ましくは、ライブラリーは、より大きな分子を含むように大きさが選択される。ランダムプライムライブラリーもまた、遺伝子の5'領域および上流領域を同定するために好適であり得る。ゲノムライブラリーは、イントロ

ンを得るためおよび5'配列を伸長させるために好適である。

#### 【0050】

ハイブリダイゼーション技術について、部分配列が、周知の技術を用いて（例えば、 $^{32}\text{P}$ を用いるニックトランスレーションまたは末端標識によって）標識され得る。次いで、細菌ライブラリーまたはバクテリオファージライブラリーが、変性した細菌コロニーを含むフィルター（またはファージプラークを含むローン（lawn））を、標識したプローブを用いてハイブリダイズすることによってスクリーニングされ得る（例えば、Sambrookら, Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratories, Cold Spring Harbor, NY, 1989を参照のこと）。ハイブリダイズするコロニーまたはプラークが選択され、そして増殖され、そしてさらなる分析のためにDNAが単離される。クローンを分析して、例えば、部分配列由来のプライマーおよびベクター由来のプライマーを用いるPCRによって、さらなる配列の量が決定され得る。制限地図および部分配列を生成して、オーバーラップする1以上のクローンを同定し得る。周知の技術を用いて適切なフラグメントを連結することによって、全長のcDNA分子を生成し得る。

#### 【0051】

あるいは、部分的cDNA配列から全長のコード配列を得るための多数の増幅技術が存在する。このような技術では、増幅は一般に、PCRを介して行われる。1つのこのような技術は、「cDNA末端の迅速増幅」、すなわち、RACEとして公知である。この技術は、内部プライマーと、ポリA領域またはベクター配列にハイブリダイズする外部プライマーとを使用して、既知の配列の5'側である配列および3'側である配列を同定することを含む。任意の種々の市販のキットを用いて、増幅工程を行い得る。例えば、当該分野で周知のソフトウェアを使用して、プライマーを設計し得る。プライマーは好ましくは、17~32ヌクレオチド長であり、少なくとも40%のGC含量を有し、そして約54~72の温度で標的配列にアニーリングする。増幅された領域は、上記の通りに配列決定され得、そしてオーバーラップする配列は、連続した配列へと集合され得

る。

#### 【0052】

DSP-5をコードするcDNA配列を図1(配列番号1)に提供し、そして推定アミノ酸配列を図3(配列番号3)に提供する。DSP-5代替形態をコードするcDNA配列は、図2(配列番号2)中に提供され、そして推定アミノ酸配列が、図4(配列番号4)に提供される。DSP-5の活性部位VHCHAGVSRVAII(配列番号5)は、配列番号3の位置113~126かつ配列番号4の位置113~126に位置する。この部位にすぐ隣接する配列情報を用い、ヒトの脳、胸腺および精巣のcDNAを用いる5'RACE反応および3'RACE反応を設計して、脳、精巣、および胸腺のRNAが比較的高度に豊富であることを示すmRNAに対応する、1020塩基対cDNAを同定した。このcDNAは、本明細書中で二重特異性ホスファターゼ-5、すなわち、DSP-5と呼ばれる、340アミノ酸のタンパク質をコードする。これらのRACE反応はまた、脳および胸腺に存在するが、精巣に存在しないmRNAに対応する897塩基対cDNAを同定する。このcDNAは、DSP-5代替形態として本明細書中でいわれ、かつ340アミノ酸DSP-5の53カルボキシ末端アミノ酸の、別個の12アミノ酸カルボキシ末端での置換によって340アミノ酸DSP-5と異なる、299アミノ酸のDSP-5代替形態タンパク質をコードする。図5に示す配列比較によって示されるように、DSP-5(またはDSP-5代替形態)は、他のMAPキナーゼホスファターゼに対して有意な相同性を示す。

#### 【0053】

DSP-5(またはDSP-5代替形態)ポリヌクレオチド改変体は一般に、例えば、固相化学合成を含む当該分野で公知の任意の方法によって調製され得る。ポリヌクレオチド配列の改変はまた、オリゴヌクレオチド部位特異的変異誘発(oligonucleotide-directed site-specific mutagenesis)のような標準的な変異誘発技術を用いて導入され得る。あるいは、RNA分子が、DSP-5またはDSP-5代替形態をコードするDNA配列またはその部分のインビトロまたはインビボでの転写によっ

て生成され得、但し、このDNAは、適切なRNAポリメラーゼプロモーター（例えば、T7またはSP6）を有するベクターに組み込まれる。特定のポリヌクレオチドを用いて、本明細書中に記載されるように、コードされるポリペプチドを調製し得る。さらに、あるいは、ポリヌクレオチドは、コードされるポリペプチドがインビボで生成されるように、患者に投与され得る。

#### 【0054】

コード配列の少なくとも一部分に相補的であるポリヌクレオチド（例えば、アンチセンスポリヌクレオチドまたはリボザイム）はまた、プローブまたはプライマーとして使用され得るか、または遺伝子発現を改変するために使用され得る。アンチセンス薬剤としての使用のためのオリゴヌクレオチドおよびリボザイム、ならびにそれらの標的化された送達のための遺伝子をコードするDNAの同定は、当該分野で周知の方法を含む。例えば、このようなオリゴヌクレオチドの所望の特性、長さおよび他の特徴は、周知である。アンチセンスオリゴヌクレオチドは、代表的には、以下のような結合を使用することによって、内因性ヌクレオチド分解酵素による分解に耐えるように設計される：ホスホロチオエート結合、メチルホスホネート結合、スルホン結合、サルフェート結合、ケチル（ketyl）結合、ホスホロジチオエート結合、ホスホロアミダイト結合、リン酸エステル結合、および他のこのような結合（例えば、Agrwalら, *Tetrahedron Lett.* 28:3539-3542 (1987); Millerら, *J. Am. Chem. Soc.* 93:6657-6665 (1971); Stecら, *Tetrahedron Lett.* 26:2191-2194 (1985); Moodyら, *Nucl. Acids Res.* 12:4769-4782 (1989); Uznanskiら, *Nucl. Acids Res.* (1989); Letsingerら, *Tetrahedron* 40:137-143 (1984); Eckstein, *Annu. Rev. Biochem.* 54:367-402 (1985); Eckstein, *Trends Biol. Sci.* 14:97-100 (1989); *Oligodeoxynucleotides. Antisense Inhibitors of Gene Expression*, Cohen, 編, Macmillan Press, Lo

ndon, 頁97-117(1989)中のStein; Jagerら, Biochemistry 27:7237-7246(1988)を参照のこと)。

【0055】

アンチセンスポリヌクレオチドは、配列特異的な様式で、核酸(例えば、mRNAまたはDNA)に結合するオリゴヌクレオチドである。相補的配列を有するmRNAに結合した場合、アンチセンスは、そのmRNAの翻訳を妨げる(例えば、米国特許第5,168,053号、Altmanら;同第5,190,931号、Inouye,同第5,135,917号、Burch;同第5,087,617号、SmithおよびCluselら(1993)Nuc. Acids Res. 21:3405-3411(これは、ダンベル状(dumbbell)アンチセンスオリゴヌクレオチドを記載する)を参照のこと)。3重鎖分子とは、2重鎖DNAを結合して同一順序の(colinear)3重鎖分子を形成し、それによって転写を妨げる、単一のDNA鎖をいう(例えば、米国特許第5,176,996号、Hoganら(これは、2重鎖DNA上の標的部に結合する合成オリゴヌクレオチドを作製するための方法を記載する)を参照のこと)。

【0056】

特に有用なアンチセンスヌクレオチドおよび3重鎖分子は、DSP-5またはDSP-5代替形態ポリペプチドまたは内因性DSP-5(またはDSP-5代替形態)の発現に関する任意の他のプロセスを媒介するタンパク質をコードするDNAまたはmRNAのセンス鎖と、そのDSP-5(またはDSP-5代替形態)ポリペプチドをコードするmRNAの翻訳の阻害をもたらされるように、相補的であるかまたは結合する分子である。アンチセンスRNAへと転写され得るcDNA構築物がまた、アンチセンスRNAの産生を容易にするために、細胞または組織中に導入され得る。アンチセンス技術は、ポリメラーゼ、転写薬剤または他の調節分子の結合の妨害を介して、遺伝子発現を調節するために使用され得る(Huber and Carr, Molecular and Immunologic Approaches, Futura Publishing Co. (Mt. Kisco, NY; 1994)中のGeeらを参照のこと)。あ

るいは、アンチセンス分子は、DSP - 5（またはDSP - 5代替形態）遺伝子の制御領域（例えば、プロモーター、エンハンサーまたは転写開始部位）とハイブリダイズして、そしてこの遺伝子の転写をブロックするようにか；またはリボソームへの転写物の結合を阻害することにより翻訳をブロックするように設計され得る。

#### 【0057】

本発明はまた、DSP - 5 - 特異的リボザイムを意図する。リボザイムは、RNA基質（例えば、mRNA）を特異的に切断するRNA分子であり、細胞性遺伝子発現の特異的な阻害または妨害を生じる。RNA鎖の切断および/または連結に關与する、少なくとも5つの公知のクラスのリボザイムが存在する。リボザイムは、任意のRNA転写物に標的化され得、そしてこのような転写物を触媒作用的に切断し得る（例えば、米国特許第5,272,262号、同第5,144,019号；および同第5,168,053号、同第5,180,818号、同第5,116,742号および同第5,093,246号（Cechら）を参照のこと）。任意のDSP - 5（またはDSP - 5代替形態） mRNA特異的リボザイム、またはこのようなりボザイムをコードする核酸が、DSP - 5（またはDSP - 5代替形態）遺伝子発現の阻害をもたらすために宿主細胞に送達され得る。従って、リボザイムは、真核生物プロモーター（例えば、真核生物ウイルスプロモーター）に連結されたりボザイムをコードするDNAによって宿主細胞に送達され得、その結果、核中への導入の際に、そのリボザイムは直接転写され得る。

#### 【0058】

任意のポリヌクレオチドが、インビボでの安定性を増大するためにさらに改変され得る。可能な改変としては、これらに限定されないが、5'および/または3'末端における隣接配列の付加；骨格におけるホスホジエステル結合以外のホスホロチオエート結合または2' O - メチル結合の使用；ならびに/あるいは非伝統的（nontraditional）塩基（例えば、イノシン、キューオシン（queosine）およびワイプトシン、ならびにアセチル形態、メチル形態、チオ形態、および他の改変された形態の、アデニン、シチジン、グアニン、チ

ミンおよびウリジン)を含むことが挙げられる。

【0059】

本明細書中に記載されるようなヌクレオチド配列は、確立された組換えDNA技術を使用して種々の他のヌクレオチド配列と結合され得る。例えば、ポリヌクレオチドは、種々のクローニングベクターのいずれか(プラスミド、ファージミド、ファージ誘導体およびコスミドを含む)中にクローン化され得る。特定の目的のベクターとしては、発現ベクター、複製ベクター、プローブ生成ベクターおよび配列決定ベクターが挙げられる。一般に、適切なベクターは、少なくとも1つの生物にて機能的な複製起点、都合の良い制限エンドヌクレアーゼ部位および1つ以上の選択可能マーカを含む。他のエレメントは、所望される使用に依存し、そして当業者に明らかである。

【0060】

特定の実施形態において、ポリヌクレオチドは、哺乳動物の細胞中への侵入、およびそこでの発現を可能にするように処方され得る。このような処方は、以下の記載のような治療的目的のために特に有用である。標的細胞においてポリヌクレオチドの発現を達成するための多く方法が存在し、そして任意の適切な方法が利用され得ることを、当業者は理解する。例えば、ポリヌクレオチドは、周知の技術を使用して、ウイルスベクター中に取り込まれ得る。ウイルスベクターは、さらに、選択マーカに関する遺伝子(形質導入された細胞の同定または選択を補助するため)および/または標的化部分に関する遺伝子(例えば、特定の標的細胞におけるレセプターに対するリガンドをコードする遺伝子)を移すかまた組み込んで、そのベクターを標的的特異的にし得る。標的化はまた、当業者に公知の方法により、抗体を用いて達成され得る。

【0061】

治療目的のための他の処方としては、コロイド分散系(例えば、高分子複合体、ナノカプセル(nanocapsule)、ミクロスフェア、ビーズ)、ならびに脂質に基づく系(水中油エマルジョン、ミセル、混合ミセル、およびリポソームを含む)が挙げられる。インビトロおよびインビボでの送達ビヒクルとしての使用のための好ましいコロイド系は、リポソーム(すなわち、人工膜小胞)で

ある。このような系の調製および使用は、当該分野で周知である。

#### 【0062】

他の局面において、DSP-5プロモーターは、標準的技術を使用して単離され得る。本発明は、このようなプロモーター配列またはその1つ以上のシス作用調節エレメントまたはトランス作用調節エレメントを含む、核酸分子を提供する。このような調節エレメントは、DSP-5（またはDSP-5代替形態）の発現を増強し得るかまたは抑制し得る。5'隣接領域は、本明細書中に提供されるゲノム配列に基づいて、標準的技術を使用して生成され得る。必要な場合、さらなる5'配列が、PCRに基づく方法または他の標準的方法を使用して生成され得る。この5'領域は、標準的な方法を使用してサブクローン化され得、そして配列決定され得る。プライマー伸長法および/またはRNアーゼプロテクション分析が使用され、cDNAから推定される転写開始部位が確認され得る。

#### 【0063】

プロモーター領域の境界を規定するために、種々の大きさの、推定上のプロモーターインサートが、プロモーターもエンハンサーも含まない適切なレポーター遺伝子を含む異種発現系にサブクローニングされ得る。適切なレポーター遺伝子としては、ルシフェラーゼをコードする遺伝子、 $\beta$ -ガラクトシダーゼをコードする遺伝子、クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼをコードする遺伝子、分泌アルカリホスファターゼをコードする遺伝子、またはグリーン蛍光タンパク質遺伝子が挙げられ得る。適切な発現系は周知であり、そして周知の技術を用いて調製され得るか、または市販されている。内部欠失構築物が、唯一の内部制限部位を用いるか、または唯一ではない制限部位の部分的な消化により、生成され得る。次いで、構築物は、高レベルのDSP-5（またはDSP-5代替形態）発現を示す細胞にトランスフェクトされ得る。一般に、最小の5'隣接領域がレポーター遺伝子の最も高い発現レベルを示す構築物は、プロモーターと定義される。このようなプロモーター領域は、レポーター遺伝子に連結され得、そして薬剤を、DSP-5転写を調節する能力について評価するために使用され得る。

#### 【0064】

一旦、機能的プロモーターが同定されると、シス作用エレメントおよびトランス作用エレメントが位置決定され得る。シス作用配列は、一般に、先に特徴付けされた転写モチーフに対する相同性に基づいて、同定され得る。次いで、点変異が、同定された配列内に生成されて、このような配列の調節の役割が評価され得る。このような変異は、部位特異的変異誘発技術またはPCRに基づくストラテジーを用いて、生成され得る。次いで、変更されたプロモーターが、上記のように、レポーター遺伝子発現ベクターにクローニングされ、そしてレポーター遺伝子発現に対するこの変異の影響が評価される。

#### 【0065】

本発明はまた、DSP-5（またはDSP-5代替形態）の対立遺伝子改変体ならびに他の生物由来のDSP-5配列の使用を意図する。このような配列は、一般に、本明細書中に提供される配列に対する類似性（例えば、ハイブリダイゼーション技術を用いて）に基づき、そして本明細書中に提供されるアッセイを用いてDSP-5活性の存在に基づいて、同定され得る。

#### 【0066】

一般に、本明細書中に記載されるようなポリペプチドおよびポリヌクレオチドは、単離されている。「単離された」ポリペプチドまたはポリヌクレオチドとは、その元の環境から取り出された、ポリペプチドまたはポリヌクレオチドである。例えば、天然に存在するタンパク質は、天然の系において共存する物質のいくらかまたは全てから分離されている場合に、単離されている。好ましくは、このようなポリペプチドは、少なくとも約90%純粋であり、より好ましくは少なくとも約95%純粋であり、そして最も好ましくは少なくとも約99%純粋である。ポリヌクレオチドは、例えば、天然の環境の一部ではないベクターにクローニングされている場合に、単離されているとみなされる。

#### 【0067】

（DSP-5活性を検出するためのアッセイ）

本発明に従って、DSP-5（またはDSP-5代替形態）の基質は、全長チロシンリン酸化タンパク質およびポリペプチドを含み得、ならびにチロシン残基においてリン酸化され得、かつ特定の好ましい実施形態においては、セリン残基

またはスレオニン残基においてもリン酸化を受け得る、そのフラグメント（例えば、部分）、誘導体またはアナログを含み得る。このようなフラグメント、誘導体およびアナログとしては、例えばDSP-5（またはDSP-5代替形態）と複合体を形成することによって、本明細書中に提供されるようなDSP-5（またはDSP-5代替形態）と相互作用する生物学的機能を少なくとも維持する、任意の天然に存在するDSP-5基質ポリペプチドまたは人工的に操作されたDSP-5基質ポリペプチドが挙げられる。DSP-5基質ポリペプチドのフラグメント、誘導体またはアナログ（融合タンパク質である基質を含む）は、以下のいずれかであり得る：(i) 1つ以上のアミノ酸残基が、保存アミノ酸残基もしくは非保存アミノ酸残基（好ましくは保存アミノ酸残基）で置換されており、そしてこのような置換されたアミノ酸残基は、遺伝コードによりコードされてもコードされなくてもよいアミノ酸残基であるもの、または(ii) 1つ以上のアミノ酸残基が置換基を含むもの、または(iii) 基質ポリペプチドが別の化合物（例えば、そのポリペプチドの半減期を増加させる化合物（例えば、ポリエチレングリコール）、またはレポーター分子のような検出可能部分）と融合されたもの、または(iv) さらなるアミノ酸（基質のポリペプチドまたはプロタンパク質配列の精製のために使用されるアミノ酸を含む）が基質のポリペプチドに融合したもの。このようなフラグメント、誘導体およびアナログは、当業者の範囲内であるとみなされる。好ましい実施形態において、MAPキナーゼポリペプチドは、本明細書中に提供されるような使用のための基質である。

#### 【0068】

DSP-5（またはDSP-5代替形態）ポリペプチド改変体は、MAPキナーゼホスファターゼ活性に適した任意のアッセイを用いて、DSP-5活性について試験され得る。このようなアッセイは、インビトロでか、または細胞に基づくアッセイにおいて、実施され得る。例えば、MAPキナーゼは、本明細書中に提供されるようなDSP-5基質として使用するために、Upstate Biotechnology (Lake Placid, NY; カタログ番号14-206) から不活化形態として得られ得る。MAPキナーゼのリン酸化は、周知の技術（例えば、ZhengおよびGuan、J. Biol. Chem. 268

: 16116 - 16119、1993により記載されるもの)を使用して、MAPキナーゼキナーゼMEK-1 (Upstate Biotechnology ; カタログ番号14-206から入手可能)を用いて、実施され得る。

#### 【0069】

例えば、[<sup>32</sup>P]で放射線標識した基質(例えば、MAPキナーゼ)を、放射線標識された活性化MAPキナーゼを生じるキナーゼ反応のために、使用し得る。次いで、DSP-5(またはDSP-5代替形態)ポリペプチドは、このDSP-5ポリペプチドをMAPキナーゼと適切な条件下(例えば、Tris(pH 7.5)1mM EDTA、1mMジチオトレイトール、1mg/mLウシ血清アルブミン、30 で10分間;またはZhengおよびGuan、J. Biol. Chem. 268:16116-16119、1993により記載されるような)で接触させることにより、活性化MAPキナーゼを脱リン酸する能力について試験され得る。MAPキナーゼの脱リン酸は、種々のアッセイ(例えば、連結キナーゼアッセイ(当該分野において一般的に公知の任意のアッセイを用いて、MAPキナーゼ基質のリン酸化を評価する))のいずれかを用いるか、または直接的に((1)放射性リン酸基の損失(例えば、ゲル電気泳動、続いてオートラジオグラフィーによる);(2)脱リン酸の後の電気泳動移動度のシフト;(3)ホスホチロシンまたはホスホスレオニンに対して特異的な抗体との反応性の損失;あるいは(4)MAPキナーゼのホスホアミノ酸分析に基づく)、検出され得る。特定のアッセイは、一般に、Wardら、Nature 367:651-654、1994、またはAlessiら、Oncogene 8:2015-2020、1993により記載されるように実施され得る。一般に、500pg~50ngのDSP-5ポリペプチドと、100ng~100μgの活性MAPキナーゼとの接触は、MAPキナーゼの検出可能な脱リン酸を、代表的には20~30分以内に生じるべきである。特定の実施形態においては、0.01~10単位/mL(好ましくは約0.1単位/mLであり、ここで単位とは、1分間あたり1nmolの基質を脱リン酸するに十分な量である)のDSP-5ポリペプチドが、0.1~10μM(好ましくは約1μM)の活性MAPキナーゼと接触されて、MAPキナーゼの検出可能な脱リン酸を生じ得る。好ましくは、

DSP-5ポリペプチドは、MAPキナーゼの脱リン酸、または相当する量のネイティブなヒトDSP-5（またはDSP-5代替形態）の存在下で観察される脱リン酸と少なくとも同程度のリン酸化基質（例えば、チロシンリン酸化ペプチドおよび/またはセリンリン酸化ペプチド）を生じる。本明細書中に記載のような変異をトラップする基質を使用して同定される他の基質が、このようなアッセイにおいてMAPキナーゼと置換され得ることが、明らかである。

#### 【0070】

（抗体および抗原結合フラグメント）

DSP-5に特異的に結合する、ペプチド、ポリペプチドおよび他の非ペプチド分子もまた、本発明により意図される。本明細書中で使用される場合、ある分子が検出可能なレベルでDSP-5と反応し、そして関連しない配列または異なるホスファターゼの配列を含むペプチドとは検出可能に反応しない場合に、この分子はDSP-5に「特異的に結合する」といわれる。好ましい結合分子としては抗体が挙げられ、これは、例えば、ポリクローナル、モノクローナル、単鎖、キメラ、抗イディオタイプ、CDR移植免疫グロブリン、またはそのフラグメント（例えば、タンパク分解的に産生されたか、または組換え的に作製された免疫グロブリンF(ab')<sub>2</sub>、Fab、Fv、およびFdフラグメント）であり得る。特定の好ましい抗体は、本明細書中で記載されるようなインビトロアッセイにおいてDSP-5の活性を阻害またはブロックする抗体である。抗体のDSP-5への結合特性は、一般に、免疫検出法（例えば、酵素結合免疫ソルベントアッセイ（ELISA）、免疫沈降、免疫プロットティングなどを含む）を使用して評価され得、これらは当業者により容易に実施され得る。

#### 【0071】

当該分野において周知の方法を使用して、DSP-5に特異的な抗体、ポリクローナル抗血清、またはモノクローナル抗体が産生され得る。抗体はまた、所望の特性を有するように設計された、遺伝的に操作された免疫グロブリン（Ig）またはIgフラグメントとして産生され得る。例えば、例示の目的であって限定ではないが、抗体は、第1の哺乳類種からの少なくとも1つの可変（V）領域ドメインおよび第2の異なる哺乳類種からの少なくとも1つの定常領域ドメインを

有するキメラ融合タンパク質である抗体は組換えIgGを含み得る。最も一般的には、キメラ抗体は、マウス可変領域配列およびヒト定常領域配列を有する。このようなマウス/ヒトキメラ免疫グロブリンは、マウス抗体由来の相補性決定領域(CDR)を移植することによって「ヒト化」され得、これは抗原への、ヒト誘導V領域フレームワーク領域およびヒト誘導定常領域への結合特異性を与える。これらの分子のフラグメントは、タンパク分解性消化によって、または必要に応じて、タンパク分解性消化に続く穏やかなジスルフィド結合の還元およびアルキル化によって産生され得る。あるいは、このようなフラグメントはまた、組換え遺伝操作技術によって産生され得る。

#### 【0072】

本明細書中で使用される場合、抗体が、DSP-5に検出可能なレベルで反応する場合、好ましくは親和性定数 $K_a$ が約 $10^4 M^{-1}$ 以上の場合、より好ましくは約 $10^5 M^{-1}$ 以上の場合、より好ましくは約 $10^6 M^{-1}$ 以上の場合、そしてさらにより好ましくは約 $10^7 M^{-1}$ 以上の場合に、抗体はDSP-5ポリペプチドに「免疫特異的」または「特異的に結合」といわれる。結合パートナーまたは抗体の親和性は、慣習的な技術(例えば、Scatchardら(Ann. N. Y. Acad. Sci. USA 51:660(1949))に記載される方法または表面プラズモンレゾナンス(BIACore, Biosensor, Piscataway, NJ)を使用して容易に決定され得る。例えば、Wolffら、Cancer Res. 53:2560-2565(1993)を参照のこと。

#### 【0073】

抗体は、一般に、当業者に公知の種々の任意の技術によって調製され得る。例えば、Harlowら、Antibodies: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory(1988)を参照のこと。このような技術の1つにおいて、動物は、抗原としてDSP-5を用いて免疫化され、ポリクローナル抗血清を産生する。適切な動物としては、例えば、ウサギ、ヒツジ、ヤギ、ブタ、ウシが挙げられ、そしてより小さな哺乳類種(例えば、マウス、ラット、およびハムスター)または他の種もまた挙げられ得る。

## 【0074】

免疫原は、DSP-5、精製されたかまたは部分的に精製されたDSP-5ポリペプチドまたはその改変体もしくはフラグメント（例えば、ペプチド）、あるいはDSP-5ペプチドを発現する細胞から構成され得る。DSP-5ペプチドは、タンパク分解性切断によって産生され得るか、または化学的に合成され得る。例えば、DSP-5ポリペプチドをコードする核酸配列が本明細書中で提供され、その結果当業者は、免疫原として使用するためのこれらのポリペプチドを日常的に調製し得る。免疫化のための有用なポリペプチドまたはペプチドはまた、宿主動物において免疫原性応答をより作製しそうなアミノ酸配列を決定するために、当業者に公知の方法に従って、DSP-5の1次、2次、および3次構造を分析することによって選択され得る。例えば、Novotny、1991 Mol. Immunol. 28:201-207; Berzofsky、1985 Science 229:932-40を参照のこと。

## 【0075】

動物への注射のための免疫原の調製は、DSP-5ポリペプチド（またはその改変体もしくはフラグメント）の、別の免疫原性タンパク質（例えば、キーホールリンペットヘモシニアン（KLH）またはウシ血清アルブミン（BSA）のようなキャリアタンパク質）への共有結合を含み得る。さらに、免疫原として使用されるDSP-5ペプチド、ポリペプチド、またはDSP-5発現細胞は、アジュバント中で乳濁化され得る。例えば、Harlowら、Antibodies: A Laboratory Manual、Cold Spring Harbor Laboratory（1988）を参照のこと。一般に、最初の注射の後に、動物は、特に抗原、アジュバント（存在する場合）、および/または特定の動物種に従って変化し得る好ましいスケジュールに従って、1つ以上のブースタ免疫化を受ける。免疫応答は、特異的抗体力価を決定するために、動物を定期的に出血させ、集めた血液から血清を分離し、そしてこの血清を免疫アッセイ（例えばELISAまたはオクタロニー拡散アッセイなど）において分析することによってモニターされ得る。一旦、抗体力価が確立されると、動物は、ポリクローナル抗血清を集めるために、定期的に出血され得る。次いで、DSP-5ポ

リペプチドまたはペプチドに特異的に結合するポリクローナル抗体は、このような抗血清から精製（例えば、プロテインAまたは適切な固体支持体に固定されたDSP-5ポリペプチドを用いるアフィニティークロマトグラフィーによって）され得る。

【0076】

DSP-5ポリペプチドまたはそのフラグメントもしくは改変体に特異的に結合するモノクローナル抗体、および所望の結合特異性を有するモノクローナル抗体を産生する不死の真核生物細胞株のハイブリドーマもまた、例えば、KohlerおよびMilstein (Nature, 256: 495-497; 1976 Eur. J. Immunol. 6: 511-519 (1976)) の技術およびその改善方法を使用して調製され得る。動物（例えば、ラット、ハムスター、または好ましくはマウス）は、上記のように調製されたDSP-5免疫原で免疫化される。抗体形成細胞、代表的には脾臓細胞を含むリンパ細胞は、免疫化動物から得られ、そして薬物感作骨髄腫（例えば、プラズマ細胞腫）細胞融合パートナー（好ましくは、免疫化動物と同系、そして必要に応じて他の所望の性質（例えば、内因性Ig遺伝子産物の発現能力を有さない）を有するパートナー）との融合によって不死化され得る。リンパ（例えば、脾臓）細胞および骨髄腫細胞は、膜融合促進剤（例えば、ポリエチレングリコールまたは非イオン性界面活性剤）と数分間結合され得、次いでハイブリド-マ細胞の増殖を支持するが、骨髄腫細胞を融合しない選択培地上で低密度でプレートされ得る。好ましい選択培地は、HAT（ヒポキサンチン、アミノプテリン、チミジン）である。十分な時間（普通約1～2週間）の後に、細胞のコロニーのが観測される。1つのコロニーを単離し、この細胞によって産生される抗体が、DSP-5ポリペプチドまたはその改変体もしくはフラグメントに対する結合活性について試験され得る。高い親和性およびDSP-5抗原に対して特異的であるモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマが好ましい。従って、DSP-5ポリペプチドまたはその改変体もしくはフラグメントに特異的に結合するモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマは、本発明によって意図される。

【0077】

モノクローナル抗体は、ハイブリドーマ培養物の上清から単離され得る。マウスモノクローナル抗体の産生の代替方法は、同系マウス（例えば、このモノクローナル抗体を含む腹水の形成を促進するために処置された（例えば、プリスタン刺激された）マウス）の腹腔にこのハイブリドーマ細胞を注射することである。従来技術（例えば、クロマトグラフィー、ゲル濾過、沈澱、抽出など）によって、引き続き（通常は1～3週間以内）得られた腹水から、汚染物質が除去され得る。例えば、抗体は、このモノクローナル抗体の特定の性質（例えば、重鎖または軽鎖イソタイプ、結合特異性など）に基づいて選択された適切なリガンドを使用するアフィニティークロマトグラフィーによって精製され得る。固体支持体に固定される適切なリガンドの例としては、プロテインA、プロテインG、抗定常領域（軽鎖または重鎖）抗体、抗イディオタイプ抗体およびDSP-5ポリペプチドまたはそのフラグメントもしくは改変体が挙げられる。

【0078】

ヒトモノクローナル抗体は、当業者が精通した多数の技術によって産生され得る。このような方法としては、以下が挙げられるがこれらに限定されない：ヒト抹消血球（例えば、Bリンパ球を含む）のエプSTEIN-バーウイルス（EBV）形質転換、ヒトB細胞のインビトロ免疫化、酵母人工クロモソーム（YAC）によって挿入されたヒト免疫グロブリン遺伝子を保有する免疫化トランスジェニックマウスからの脾臓細胞の融合、ヒト免疫グロブリンV領域ファージライブラリーからの単離、または本明細書中の開示に基づく当該分野で公知の他の手順。

【0079】

例えば、ヒトモノクローナル抗体を産生するための1つの方法としては、EBV形質転換によるヒト抹消血球の不死化が挙げられる。例えば、米国特許第4,464,456号を参照のこと。DSP-5ポリペプチド（またはその改変体もしくはフラグメント）に特異的に結合するモノクローナル抗体を産生する不死化細胞株は、本明細書中で提供されるような免疫検出法（例えば、ELISA）によって同定され、次いで標準的クローニング技術によって単離され得る。ヒトモノクローナル抗体を産生するための別の方法は、ヒト脾臓B細胞を抗原で刺激し、続いて刺激されたB細胞の異種ハイブリッド融合パートナーとの融合を含む、

インビトロ免疫化である。例えば、Boernerら、1991 J. Immunol. 147: 86-95を参照のこと。

【0080】

本発明における使用のためのヒトDSP-5特異的モノクローナル抗体およびポリクローナル抗血清の産生のためのさらに別の方法は、トランスジェニックマウスに関連する。例えば、米国特許第5,877,397号; Bruggemannら、1997 Curr. Opin. Biotechnol. 8: 455-58; Jakobovitsら、1995 Ann. N.Y. Acad. Sci. 764: 525-35を参照のこと。これらのマウスにおいて、ヒト免疫グロブリン重鎖および軽鎖遺伝子は、遺伝操作によって生殖系列配列に人工的に導入され、そして内因性マウス免疫グロブリン遺伝子は不活性化される。例えば、Bruggemannら、1997 Curr. Opin. Biotechnol. 8: 455-58を参照のこと。例えば、ヒト免疫グロブリン導入遺伝子は、ミニ遺伝子構築物であり得るか、または酵母人工クロモソームのトランス遺伝子座であり得、これはマウスリンパ組織におけるB細胞特異的DNA転位および過剰変異を起こす。例えば、Bruggemannら、1997 Curr. Opin. Biotechnol. 8: 455-58を参照のこと。DSP-5に特異的に結合するヒトモノクローナル抗体は、トランスジェニック動物の免疫化、脾臓細胞の骨髄腫での融合、上記のような抗体を産生する細胞の選択およびクローニングによって得られ得る。ヒト抗体を含むポリクローナル血清はまた、免疫化動物の血液から得られる。

【0081】

DSP-5(ヒト化抗体を含む)に特異的なキメラ抗体はまた、本発明に従って産生され得る。キメラ抗体は、第1の哺乳類種由来の少なくとも1つの定常領域ドメインおよび第2の異なる哺乳類種由来の少なくとも1つの可変領域ドメインを有する。例えば、Morrissonら、1984、Proc. Natl. Acad. Sci. USA、81: 6851-55を参照のこと。好ましい実施形態において、キメラ抗体は、マウス、ラット、またはハムスターのモノクローナル抗体由来の可変領域のような非ヒトモノクローナル抗体由来の少なくとも1つ

の可変領域ドメインをコードするポリヌクレオチド配列を、少なくとも1つのヒト定常領域をコードする核酸配列を含むベクターにクローニングすることによって構築され得る。例えば、Shinら、1989 *Methods Enzymol.* 178:459-76; Wallsら、1993 *Nucleic Acids Res.* 21:2921-29を参照のこと。例示目的として、マウスモノクローナル抗体の軽鎖可変領域をコードするポリヌクレオチド配列は、ヒト軽鎖定常領域配列をコードする核酸配列を含むベクターに挿入され得る。別個のベクターにおいて、モノクローナル抗体の重鎖可変領域をコードするポリヌクレオチド配列は、ヒトIgG1定常領域をコードする配列を有するフレームにクローンされ得る。選択された特定のヒト定常領域は、特定の抗体に対して所望されるエフェクター機能に依存し得る（例えば、相補的固定、特定のFcレセプターへの結合など）。キメラ抗体を産生するための、当該分野で公知の別の方法は、相同組換え（例えば、米国特許第5,482,856号）である。好ましくは、ベクターは、キメラ抗体の安定した発現のために、真核生物細胞にトランスフェクトされる。

#### 【0082】

非ヒト/ヒトキメラ抗体は、「ヒト化」抗体を作製するために、さらに遺伝操作され得る。このようなヒト化抗体は、非ヒト哺乳類種の免疫グロブリン由来の複数のCDR、少なくとも1つのヒト可変フレームワーク領域、および少なくとも1つのヒト免疫グロブリン定常領域を含み得る。特定の実施形態におけるヒト化は、例えば、DSP-5結合可変領域が得られる非ヒトモノクローナル抗体、またはこのようなV領域および上記のような少なくとも1つのヒトC領域を有するキメラ抗体のいずれかと比較した場合に、DSP-5に対する減少した結合親和性を有する抗体を提供し得る。従って、ヒト化抗体の設計について有用な計略は、例えば、例示目的であって限定ではないが、キメラ抗体の非ヒトフレームワーク領域に最も相同的なヒト可変フレームワーク領域の同定が挙げられ得る。理論に束縛されることは望まないが、このような計略は、ヒト化抗体がDSP-5に対する特異的結合親和性を保持している可能性を増加し得、いくつかの好ましい実施形態において、これはDSP-5ポリペプチドまたはその改変体もしくは

フラグメントに対して実質的に同じ親和性であり得、そして他の特定の好ましい実施形態において、これはDSP-5に対してより大きな親和性であり得る。例えば、Jonesら、1986 Nature 321:522-25; Reichmannら、1988 Nature 332:323-27を参照のこと。従って、このようなヒト化抗体の設計は、非ヒト可変領域のCDRループ構造および構造決定因子の決定(例えば、コンピュータモデリングによる)、次いでこのCDRループおよび決定因子の、公知のヒトCDRループ構造および決定因子との比較を含み得る。例えば、Padlanら、1995 FASEB 9:133-39; Chothiaら、1989 Nature、342:377-383を参照のこと。コンピュータモデリングはまた、非ヒト可変領域での配列相同性によって選択されたヒト構造テンプレートを比較するために使用され得る。例えば、Bajorathら、1995 Ther. Immunol. 2:95-103; EP-0578515-A3を参照のこと。非ヒトCDRのヒト化が結合親和性の減少を生じる場合、コンピュータモデリングは、親和性を部分的に、完全に、または超えて最適に(すなわち、非ヒト化抗体よりも高いレベルまで増加)回復させるために、部位指向的または他の突然変異誘発技術によって変化され得る特異的アミノ酸残基の同定を援助し得る。当業者はこれらの技術に精通しており、そしてこのような設計計略についての多くの変化および改変を容易に理解する。

### 【0083】

特定の実施形態において、抗体の抗原結合フラグメントの使用が好ましくあり得る。このようなフラグメントには、FabフラグメントまたはF(ab')<sub>2</sub>フラグメントが含まれ、これは、それぞれパインまたはペプシンでのタンパク分解性消化によって調製され得る。抗原結合フラグメントは、例えば、固定化プロテインAまたはプロテインG、あるいは固定化DSP-5ポリペプチド、あるいはその適切な改変体またはフラグメントを使用するアフィニティークロマトグラフィーによってFcフラグメントから分離され得る。当業者は、日常的にかつ過度の実験なしで、例えば、本明細書中で提供される免疫検出法を使用して、得られた親和性精製抗体の特徴に基づく適切な改変体またはフラグメントを決定し

得る。Fabフラグメントを産生するための代替方法としては、 $F(ab')_2$ フラグメントの穏やかな還元続くアルキル化が挙げられる。例えば、Wier、Handbook of Experimental Immunology、1986、Blackwell Scientific、Bostonを参照のこと。

【0084】

特定の実施形態に従って、上記のIg分子の任意の非ヒト、ヒト、またはヒト化重鎖および軽鎖の可変領域は、単鎖Fv(sFv)ポリペプチドフラグメント(単鎖抗体)として構築され得る。例えば、Birdら、1988 Science 242:423-426; Hustonら、1988 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85:5879-5883を参照のこと。多機能性sFv融合タンパク質は、sFvポリペプチドインフレームをコードするポリヌクレオチド配列の、種々の任意の公知のエフェクタータンパク質をコードする少なくとも1つのポリヌクレオチド配列への結合によって産生され得る。これらの方法は、当該分野で公知であり、そして例えばEP-B1-0318554、米国特許第5,132,405号、米国特許第5,091,513号、および米国特許第5,476,786号に開示される。例示の目的として、エフェクタータンパク質は、免疫グロブリン定常領域配列を含み得る。例えば、Hollenbaughら、1995 J. Immunol. Methods 188:1-7を参照のこと。エフェクタータンパク質の他の例は酵素である。非限定的な例として、このような酵素は、治療目的のための生物学的活性を提供し得る(例えば、Simmersら、1977 Bioconjug. Chem. 8:510-19を参照のこと)か、または多くの任意の周知の基質から検出可能な産物への、診断的使用のためのホースラディッシュペルオキシダーゼ触媒変換のような、検出可能な活性を提供し得る。sFv融合タンパク質のさらに他の例としては、Ig-毒素融合、または免疫毒素が挙げられ、ここで、sFvポリペプチドは毒素に結合される。適切な条件下で、細胞に対して毒性であることが同定された広範な種々のポリペプチド配列を、当業者は理解する。本明細書中で使用される場合、免疫グロブリン-毒素融合タンパク質に包含される毒性ポリペプチドは、

例えば、生活機能での直接干渉によってかまたはアポトーシス誘導によって、細胞の生存を損なう様式で細胞内に導入され得る任意のポリペプチドであり得る。従って、毒素は、例えば、*Pseudomonas aeruginosa* 外毒素A、植物ゲロニン (*gelonin*)、*Bryonia dioica* からのブリオジン (*bryodin*) などのようなりボソーム不活性化タンパク質が挙げられ得る。例えば、Thrushら、1996 *Annu. Rev. Immunol.* 14:49-71; Frankelら、1996 *Cancer Res.* 56:926-32を参照のこと。化学治療剤、抗有糸分裂剤、抗体、アポトーシス誘導因子(または「アポトーゲン (*apoptogen*)」)、例えばGreenおよびReed、1998、*Science* 281:1309-1321を参照のこと)などを含む多数の他の毒素は、当業者に公知であり、そして本明細書中に提供される例は、本発明の範囲および精神を限定することのない例示として意図される。

#### 【0085】

特定の実施形態において、sFvは、融合タンパク質と抗原(例えば、DSP-5)との間の特異的結合の検出を可能にするペプチドまたはポリペプチドドメインに融合され得る。例えば、この融合ポリペプチドドメインは、親和性タグポリペプチドであり得る。従って、結合パートナー(例えば、DSP-5)へのsFv融合タンパク質の結合は、当業者が精通する任意の種々の技術によって、アビジン、ストレプトアビジンまたはHis(例えば、ポリヒスチジン)タグのような親和性ポリペプチドまたはペプチドタグを使用して検出され得る。検出技術はまた、例えば、アビジンまたはストレプトアビジン融合タンパク質の、ビオチンまたはビオチン模倣配列への結合(例えば、Luoら、1998 *J. Biotechnol.* 65:225およびそこに列挙される参考文献を参照のこと)、検出可能な部分(例えば、標識部分)を有する融合タンパク質の直接共有結合的改変、特異的標識化レポーター分子への融合タンパク質の非共有結合、酵素活性を有する部分を含む融合タンパク質による検出可能な基質の酵素的改変、または融合タンパク質の固相支持体への固定(共有結合または非共有結合)を含み得る。

## 【0086】

従って、所望の親和性特性を有するエフェクターペプチドのような別のポリペプチドに融合した、DSP-5特異的免疫グロブリン誘導ポリペプチドを含む本発明のsFvタンパク質は、例えば、エフェクターペプチドがグルタチオン-S-トランスフェラーゼのような酵素である融合タンパク質を含み得る。別の例として、sFv融合タンパク質はまた、Staphylococcus aureusプロテインAポリペプチドに融合されたDSP-5特異的Igポリペプチドを含み得；核酸をコードするプロテインAおよび免疫グロブリン定常領域に対して親和性を有する融合タンパク質の構築におけるその用途は、一般に、例えば米国特許第5,100,788号に開示される。sFv融合タンパク質の構築に有用な他の親和性ポリペプチドは、例えばWO89/03422；米国特許第5,489,528号；米国特許第5,672,691号；WO93/24631；米国特許第5,168,049号；米国特許第5,272,254号およびその他の個所に開示されるストレプトアビジン融合タンパク質、ならびにアビジン融合タンパク質（例えば、EP511,747を参照のこと）を含み得る。本明細書中で提供されるように、sFvポリペプチド配列は、全長融合ポリペプチドを含み得そして代替的にその改変体またはフラグメントを含み得るエフェクタータンパク質配列を含む、融合ポリペプチド配列に融合され得る。

## 【0087】

DSP-5ポリペプチドまたはその改変体もしくはフラグメントに特異的に結合する抗体を選択するためのさらなる方法は、ファージディスプレイである。例えば、Winterら、1994 Annul.Rev.Immunol.12:433-55；Burtonら、1994 Adv.Immunol.57:191-280を参照のこと。ヒトまたはマウスの免疫グロブリン可変領域遺伝子コンビナトリアルライブラリーは、DSP-5ポリペプチドまたはその改変体もしくはフラグメントに特異的に結合するIgフラグメント（Fab、Fv、sFvまたはこれらのマルチマー）を選択するためにスクリーニングされ得るファージベクターにおいて作製され得る。例えば、米国特許第5,223,409号；Huseら、1989 Science 246:1275-81；Kang

ら、1991 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88:4363-66; Hoogenboomら、1992 J. Molec. Biol. 227:381-388; Schlebuschら、1997 Hybridoma 16:47-52およびこれらに列挙される参考文献を参照のこと。例えば、Ig可変領域フラグメントをコードする複数のポリヌクレオチド配列を含むライブラリーは、M13またはその改変体のような糸状のバクテリオファージの遺伝子に、M13融合タンパク質を作製するために、例えばM13の遺伝子IIIまたは遺伝子VIIIIのようなファージコートタンパク質をコードする配列を用いて、インフレームで挿入され得る。融合タンパク質は、コートタンパク質と軽鎖可変領域ドメインおよび/または重鎖可変領域ドメインとの融合物であり得る。

#### 【0088】

特定の実施形態に従って、免疫グロブリンFabフラグメントはまた、以下のようにファージ粒子上に提示され得る。Ig定常領域ドメインをコードするポリヌクレオチド配列は、コートタンパク質を用いてインフレームでファージゲノムに挿入され得る。従って、このファージコート融合タンパク質は、Ig軽鎖または重鎖フラグメント(Fd)と融合され得る。例えば、ヒトIgライブラリーから、ヒト定常領域をコードするポリヌクレオチド配列は、少なくとも1つのファージコートタンパク質をコードする配列を用いて、インフレームでベクターに挿入され得る。さらに、または代替的に、ヒトIgG1CH1ドメインをコードするポリヌクレオチド配列は、少なくとも1つの他のファージコートタンパク質をコードする配列を用いて、インフレームで挿入され得る。次いで、可変領域ドメインをコードする複数のポリヌクレオチド配列(例えば、DNAライブラリー由来の)は、バクテリオファージコートタンパク質に融合するFabフラグメントを発現するために、定常領域コートタンパク質融合物を用いて、インフレームでベクターに挿入され得る。

#### 【0089】

DSP-5ポリペプチドに結合するIgフラグメント(例えば、IgV領域またはFab)を表示するファージは、このファージライブラリーをDSP-5

またはその改変体もしくはフラグメントと混合することによって、あるいはこのファージライブラリーを、結合するのに十分な条件下および時間で固体マトリックス上に固定されたDSP-5ポリペプチドに接触させることによって、選択され得る。非結合ファージは、洗浄液によって除去され、この洗浄液は代表的には低濃度の塩（例えば、NaCl）、好ましくは100mM未満のNaCl、より好ましくは50mM未満のNaCl、最も好ましくは10mM未満のNaClを含む緩衝液であり得るか、または塩を含まない緩衝液であり得る。次いで、特異的に結合したファージは、NaCl含有緩衝液で溶出される（例えば、段階的様式で塩濃度を増加させることによって）。代表的には、高親和性でDSP-5に結合するファージは、開放するのにより高い塩濃度を必要とする。溶出されたファージは、適切な細菌性宿主に伝播され得、そして一般に、DSP-5特異的免疫グロブリンを発現するファージの収量を増加させるために、DSP-5結合および溶出の連続的ラウンドが繰り返され得る。コンビナトリアルファージライブラリーはまた、非ヒト可変領域のヒト化のために使用され得る。例えば、Rosokら、1996 J. Biol. Chem. 271:22611-18; Raderら、1998 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95:8910-15を参照のこと。このようにして選択されたファージ中に挿入された免疫グロブリン遺伝子のDNA配列は、標準的技術によって決定され得る。Sambrookら、1989 Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Pressを参照のこと。次いで、親和性選択されたIgコード配列は、Igフラグメントの発現のために別の適切なベクター内にクローニングされ得るか、または必要に応じて、免疫グロブリン全体の鎖の発現のために、Ig定常領域を含むベクターにクローニングされ得る。

#### 【0090】

ファージディスプレイ技術はまた、DSP-5に結合するポリペプチド、ペプチドまたは単鎖抗体を選択するために使用され得る。このようなペプチドまたは抗体をコードする候補核酸分子（例えば、DNA）が挿入され得るマルチクローニング部位を有する適切なベクターの例として、McLaffertyら、G

ene 128:29-36、1993; Scottら、1990 Science 249:386-390; Smithら、1993 Methods Enzymol. 217:228-257; Fischら、1996、Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93:7761-66を参照のこと。挿入されたDNA分子は、ランダムに産生された配列を含み得るか、または本明細書中で提供されるようなDSP-5ポリペプチドまたはその改変体もしくはフラグメントに特異的に結合する公知のペプチドまたはポリペプチドドメインの改変体をコードし得る。一般に、核酸挿入物は、60アミノ酸までのペプチド、より好ましくは3~35アミノ酸のペプチド、そしてさらにより好ましくは6~20アミノ酸のペプチドをコードする。挿入された配列によってコードされるペプチドは、バクテリオファージの表面に表示される。DSP-5ポリペプチドに対する結合ドメインを発現するファージは、上記のような固定されたDSP-5ポリペプチドへの特異的結合に基づいて選択され得る。本明細書中で提供される場合、周知の組換え遺伝技術は、そのフラグメントを含む融合タンパク質を構築するために使用され得る。例えば、産生され得るポリペプチドは、得られた産物のDSP-5に対する結合親和性を最大にするために、2つ以上の同様な、または異なる親和性選択されたDSP-5結合ペプチドドメインのタンデムアレイを含む。

#### 【0091】

他の特定の実施形態において、本発明は、マルチマー抗体フラグメントであるDSP-5特異的抗体を意図する。有用な方法論は、一般に、例えばHaydenら、1997、Curr Opin. Immunol. 9:201-12; Colomaら、1997 Nat. Biotechnol. 15:159-63に記載される。例えば、マルチマー抗体フラグメントは、ミニ抗体(miniantibodies)(米国特許第5,910,573号)またはディアボディ(diabodies)(Holligerら、1997、Cancer Immunol. Immunother. 45:128-130)を形成するためのファージ技術によって作製され得る。DSP-5特異的Fvのマルチマーまたは異なる高原特異性を有する第2のFvに非共有結合的に会合したDSP-5特異

的Fvを含む二特異的抗体であるマルチマーフラグメントが、産生され得る。例えば、Koelemijら、1999 J. Immunother. 22:514-24を参照のこと。別の例として、マルチマー抗体は、2つの単鎖抗体またはFabフラグメントを有する二特異的抗体を含み得る。特定の関連した実施形態に従って、第1のIgフラグメントは、DSP-5ポリペプチド(またはその改変体もしくはフラグメント)上の第1抗原性決定因子に特異的であり得、一方第2Igフラグメントは、DSP-5ポリペプチドの第2抗原性決定因子に特異的であり得る。あるいは、他の特定の関連した実施形態において、第1免疫グロブリンフラグメントは、DSP-5ポリペプチドまたはその改変体もしくはフラグメント上の抗原性決定因子について特異的であり得、そして第2の免疫グロブリンフラグメントは、第2の異なる(すなわち、非DSP-5)分子上の抗原性決定因子について特異的であり得る。DSP-5に特異的に結合する二特異的抗体もまた意図され、ここで少なくとも1つの抗原結合ドメインは、融合タンパク質として存在する。

#### 【0092】

DSP-5結合免疫グロブリン分子へのアミノ酸変異の導入は、DSP-5に対する特異性または親和性を増加するために、あるいはエフェクター機能を変えるために有用であり得る。DSP-5に対する高い親和性を有する免疫グロブリンは、特定の残基の部位指向突然変異によって産生され得る。コンピュータに補助される3次元分子モデリングは、DSP-5ポリペプチドに対する親和性を改善するために、変化されるべきアミノ酸残基を同定するために使用され得る。例えば、Mountainら、1992、Biotechnol. Genet. Eng. 10:1-142を参照のこと。あるいは、CDRのコンビナトリアルライブラリーは、M13ファージにおいて産生され得、そして改善された親和性を有する免疫グロブリンフラグメントについてスクリーニングされる。例えば、Glaserら、1992、J. Immunol. 149:3903-3913; Bardasら、1994 Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91:3809-13; 米国特許第5,792,456号を参照のこと。

#### 【0093】

エフェクター機能はまた、部位指向突然変異によって変化され得る。例えば、Duncanら、1988 *Nature* 332:563-64; Morganら、1995 *Immunology* 86:319-24; Eghtedarzedeht-Kondriら、1997 *Biotechniques* 23:830-34を参照のこと。例えば、免疫グロブリンのFcタンパク質上のグリコシル化部位の突然変異は、免疫グロブリンが相補鎖に固定する能力を変化し得る。例えば、Wrightら、1997 *Trends Biotechnol.* 15:26-32を参照のこと。定常領域ドメインにおける他の突然変異は、免疫グロブリンが相補鎖に固定する能力を変化し得るか、または抗体依存性細胞傷害性の効果を変化し得る。例えば、Duncanら、1988 *Nature* 332:563-64; Morganら、1995 *Immunology* 86:319-24; Senselら、1997 *Mol. Immunol.* 34:1019-29を参照のこと。

#### 【0094】

本明細書中に記載されるDSP-5に特異的に結合する抗体またはそのフラグメントをコードする核酸分子は、核酸切除、連結、形質転換およびトランスフェクションのための任意の種々の周知の手順に従って、伝播されそして発現され得る。従って、特定の実施形態において、抗体フラグメントの発現は、*Escherichia coli*のような原核生物宿主において好ましくあり得る（例えば、Pluckthunら、1989 *Methods Enzymol.* 178:497-515を参照のこと）。他の特定の実施形態において、抗体またはそのフラグメントの発現は、酵母（例えば、*Saccharomyces cerevisiae*、*Schizosaccharomyces pombe*および*Pichia pastoris*）、動物細胞（哺乳動物細胞を含む）または植物細胞を含む真核生物宿主細胞において好ましくあり得る。適切な動物細胞の例としては、限定ではないが、骨髓腫、COS, CHO、またはハイブリドーマ細胞が挙げられる。植物細胞の例としては、タバコ、トウモロコシ、ダイズ、およびイネの細胞が挙げられる。当業者に公知の手法に従って、そして本開示に基づいて、核酸ベクターは、特定の宿主系において外来配列を発現するために設計

され得、次いでDSP-5結合抗体（またはそのフラグメント）をコードするポリヌクレオチド配列が挿入され得る。調節エレメントは、特定の宿主に従って変化する。

#### 【0095】

本明細書中に記載されるDSP-5結合免疫グロブリン（またはそのフラグメント）は、酵素、細胞傷害剤、または他のレポーター分子（色素、放射性核種、発光基、蛍光基、またはビオチンなどを含む）のような検出可能な部位または標識を含み得る。DSP-5特異的免疫グロブリンまたはそのフラグメントは、診断または治療の適用のために、放射標識され得る。抗体の放射標識のための技術は、当該分野で公知である。例えば、Adams 1998 *In Vivo* 12:11-21; Hiltunen 1993 *Acta Oncol.* 32:831-9を参照のこと。治療適用は、以下に詳細に記載され、そして他の治療剤と組合わせてDSP-5結合抗体（またはそのフラグメント）の使用を含み得る。抗体またはフラグメントはまた、当該分野で公知のそして本明細書中で提供される細胞傷害剤（例えば、リボソーム不活性化タンパク質のような毒素、化学治療剤、抗縮腫剤、抗生物質など）と組合わされ得る。

#### 【0096】

本発明はまた、本明細書中で提供されるDSP-5またはその改変体もしくはフラグメントに特異的に結合する抗体（またはその抗原結合フラグメント）を認識する抗イディオタイプ抗体の産生を意図する。抗イディオタイプ抗体は、免疫原として抗DSP-5抗体（またはその抗原結合フラグメント）を使用し本明細書中に記載される方法によって、ポリクローナル抗体として、またはモノクローナル抗体として産生され得る。抗イディオタイプ抗体またはそのフラグメントはまた、上記の任意の組換え遺伝操作法によってか、またはファージディスプレイ選択によって産生され得る。抗イディオタイプ抗体は、抗DSP-5抗体のDSP-5ポリペプチドへの結合が競合的に阻害されるように、抗DSP-5抗体の抗原結合部位と反応し得る。あるいは、本明細書中で提供される抗イディオタイプ抗体は、抗DSP-5抗体のDSP-5ポリペプチドへの結合を競合的に阻害しなくてもよい。

## 【0097】

本明細書中で提供され、そして当該分野で周知の方法論に従って、ポリクローナルおよびモノクローナル抗体は、DSP-5ポリペプチドの親和性単離のために使用され得る。例えば、Hermansonら、Immobilized Affinity Ligand Techniques、Academic Press、Inc. New York、1992を参照のこと。手短に言うと、抗体（またはその抗原結合フラグメント）は、固体支持体材料上に固定化され得、次いで、この支持体材料は目的のポリペプチド（例えば、DSP-5）を含むサンプルと接触される。サンプルの残りからの分離に続いて、次いでこのポリペプチドは、固定化された抗体から放出される。

## 【0098】

（DSP-5発現を検出するための方法）

本発明の特定の局面は、診断およびアッセイの目的のために、DSP-5またはDSP-5代替形態に対して惹起された抗体またはハイブリダイズするポリヌクレオチドを使用する方法を提供する。特定のアッセイは、DSP-5またはDSP-5代替形態、またはそのタンパク質分解フラグメントの存在または非存在を検出するために抗体または他の薬剤を使用することを含む。あるいは、DSP-5またはDSP-5代替形態をコードする核酸は、標準的なハイブリダイゼーションおよび/またはPCR技術を使用して検出され得る。適切なプローブおよびプライマーは、本明細書に提供されるDSP-5 cDNA配列および/またはDSP-5代替形態cDNA配列に基づいて、当業者によって設計され得る。アッセイは、一般的に、真核生物細胞、細菌、ウイルス、このような生物から調製された抽出物および生きている生物において見出される流体のような生物学的供給源から得られる種々のサンプルのいずれかを使用して行われ得る。患者から得られ得る生物学的サンプルには、血液サンプル、生検検体、組織外植片、器官培養物および他の組織または細胞調製物が挙げられる。患者または生物学的供給源は、ヒトまたは非ヒト動物、初代細胞培養物または培養適合細胞株であり得、これには、遺伝的に操作された細胞株（染色体的に組み込まれた組換え核酸配列またはエピソーム組換え核酸配列を含み得る）、不死化または不死化可能細胞株

、体細胞ハイブリッド細胞株、分化した細胞株または分化可能な細胞株、形質転換された細胞株などが挙げられるが、これらに限定されない。特定の好ましい実施形態において、患者または生物学的供給源は、ヒトであり、特に好ましい実施形態において、生物学的供給源は、哺乳動物である非ヒト動物（例えば、ゲッ歯動物（例えば、マウス、ラット、ハムスターなど）、有蹄動物（例えば、ウシ）または非ヒト霊長類）である。本発明の特定の他の好ましい実施形態において、患者は、変化した細胞シグナル伝達と関連した疾患を有すると疑われ得るかまたはその危険があると疑われ得るか、あるいは、疾患のような危険がないかまたはその存在がないことが既知であり得る。

#### 【0099】

DSP - 5またはDSP - 5代替形態タンパク質を検出するために、試薬は代表的には抗体であり、この抗体は、本明細書中に記載されるように調製され得る。サンプル中のポリペプチドを検出するための抗体を使用するための、当業者に公知の種々のアッセイ形式がある。例えば、HarlowおよびLane, *Antibodies: A Laboratory Manual*, Cold Spring Harbor Laboratory, 1988を参照のこと。例えば、このアッセイは、ウェスタンブロット形式で実行され得、この形式において、生物学的サンプルからのタンパク質調製物を、ゲル電気泳動により分離し、適切な膜にトランスファーし、そして抗体と反応させる。次いで、膜上の抗体の存在は、以下に記載されるような適切な検出試薬を用いて検出され得る。

#### 【0100】

別の実施形態において、アッセイは、固体支持体上に固定された抗体を使用し、標的DSP - 5またはDSP - 5代替形態に結合させ、そしてサンプルの残りから取り除くことを包含する。次いで結合されたDSP - 5またはDSP - 5代替形態は、レポーター基を含む第2の抗体または試薬を用いて検出され得る。あるいは、競合アッセイが利用され得る。この競合アッセイにおいて、DSP - 5ポリペプチド（またはDSP - 5代替形態ポリペプチド）を、レポーター基で標識し、そしてサンプルと共に抗体をインキュベートした後に固定化抗体に結合させる。このサンプルの成分が標識化ポリペプチドの抗体への結合を阻害する程度

は、このサンプルの固定化抗体との反応性を示し、そして結果として、サンプル中のDSP-5（またはDSP-5代替形態）のレベルを示す。

#### 【0101】

固体支持体は、抗体が結合され得る、当業者に公知の任意の材料（例えば、マイクロタイタープレートにおける試験ウェル、ニトロセルロースフィルターまたは別の適切な膜）であり得る。あるいは、支持体は、ビーズまたは円板（例えば、ガラス）、ファイバーガラス、ラテックスまたはプラスチック（例えば、ポリスチレンまたはポリビニルクロリド）であり得る。当業者に公知の種々の技術（特許および科学文献に豊富に記載される）を使用して、抗体は、固体支持体上に固定化され得る。

#### 【0102】

特定の実施形態において、サンプル中のDSP-5（またはDSP-5代替形態）の検出のためのアッセイは、2つの抗体のサンドイッチアッセイである。このアッセイは、第1に固体支持体（一般的にはマイクロタイタープレートのウェル）上に固定化された抗体を生物学的サンプルと接触させる工程により実行され得、その結果、サンプル内のDSP-5（またはDSP-5代替形態）は、固定化抗体に結合することが可能になる（室温での30分間のインキュベーション時間が、一般的に充分である）。次いで、結合されないサンプルを、固定化DSP-5 / 抗体複合体から除去し、そしてDSP-5（またはDSP-5代替形態）上の異なる部位に結合し得る第2の抗体（酵素、色素、放射性核種、発光基、蛍光基、またはビオチンのようなレポーター基を含む）を添加する。次いで、固体支持体に結合したままの第2の抗体の量を、特異的レポーター基に適切な方法を用いて決定する。放射性基については、シンチレーション計数またはオートラジオグラフィ法が、一般的に適切である。分光法を使用して、色素、発光基、および蛍光基を検出し得る。ビオチンを、異なるレポーター基（一般的に放射性基もしくは蛍光基または酵素）に結合された、アビジンを使用して検出し得る。酵素レポーター基を、一般的には基質を（一般的に特定の期間）添加し、次いで、反応産物の分光分析または他の分析することにより検出し得る。周知の技術を使用して、サンプル中のDSP-5（またはDSP-5代替形態）のレベルを決定

するために、標準および標準添加物を使用し得る。

#### 【0103】

本発明の関連する局面において、DSP-5（またはDSP-5代替形態）およびDSP-5ホスファターゼ活性を検出するためのキットが提供される。このようなキットは、DSP-5（またはDSP-5代替形態）またはDSP-5（またはDSP-5代替形態）をコードする核酸のレベルを検出するために設計され得るか、または直接ホスファターゼアッセイもしくは結合ホスファターゼアッセイにおいて、DSP-5（またはDSP-5代替形態）のホスファターゼ活性を検出し得る。一般的には、本発明のキットは、アッセイにおいて使用される要素（例えば、試薬または緩衝液）を封入した1つ以上の容器を含む。

#### 【0104】

DSP-5（またはDSP-5代替形態）、またはDSP-5（またはDSP-5代替形態）をコードする核酸のレベルを検出するためのキットは、代表的にはDSP-5（またはDSP-5代替形態）タンパク質、DSP-5（またはDSP-5代替形態）DNAあるいはDSP-5（またはDSP-5代替形態）RNAに結合する試薬を含む。DSP-5（またはDSP-5代替形態）をコードする核酸を検出するために、試薬は、核酸プローブまたはPCRプライマーであり得る。DSP-5（またはDSP-5代替形態）タンパク質を検出するために、試薬は、代表的には抗体である。このようなキットはまた、試薬の直接的または間接的検出に適したレポーター基を含む（すなわち、レポーター基は、この試薬に共有結合で結合され得るか、または第2の分子（例えば、プロテインA、プロテインG、免疫グロブリンまたはレクチン）に結合し得、この第2の分子自身が、試薬に結合し得る）。適切なレポーター基としては、酵素（例えば、セイヨウウサビペルオキシダーゼ）、基質、補因子、インヒビター、色素、放射性核種、発光基、蛍光基およびビオチンが挙げられるが、これらに限定されない。このようなレポーター基は、当業者に公知の標準的な方法を使用して、サンプル成分に対する試薬の結合を直接的または間接的に検出するために使用され得る。

#### 【0105】

DSP-5活性を検出するためのキットは、代表的には適切な緩衝液と組合せ

たDSP-5基質を含む。DSP-5活性は、上記のようなホスファターゼアッセイを行う前に、DSP-5特異的（またはDSP-5代替形態特異的）抗体を用いて免疫沈降工程を実施することにより特異的に検出され得る。基質の脱リン酸化を検出する際の使用のための他の試薬もまた提供され得る。

#### 【0106】

特定の診断アッセイにおいて、変化したDSP-5（またはDSP-5代替形態）の存在または変化したレベルのDSP-5（またはDSP-5代替形態）発現に基づいて、増殖障害は、患者または本明細書中に提供されるような別の生物学的供給源生物において、検出され得る。例えば、抗体は、野生型DSP-5（またはDSP-5代替形態）とアミノ酸配列におけるバリエーションを有する変化したDSP-5（またはDSP-5代替形態）とを識別し得る。このようなバリエーションは、増殖障害の存在、またはこのような障害の感受性を示し得る。ハイブリダイゼーションおよび増幅技術は、同様に改変DSP-5（またはDSP-5代替形態）配列を検出するために使用され得る。

#### 【0107】

（DSP-5活性のモジュレーターを同定するための方法）

本発明の1つの局面において、DSP-5（またはDSP-5代替形態）ポリペプチドは、DSP-5活性を調節する薬剤を同定するために使用され得る。このような薬剤は、MAP-キナーゼカスケードを介するシグナル変換を阻害または増強し、細胞増殖を引き起こし得る。DSP-5（またはDSP-5代替形態）活性を調節する薬剤は、DSP-5の発現および/もしくは安定性、DSP-5タンパク質活性ならびに/または基質を脱リン酸化するDSP-5の能力を変化させ得る。このようなアッセイにおいてスクリーニングされ得る薬剤としては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：抗体およびその抗原結合フラグメント、例えば、触媒部位または二重リン酸化モチーフを提示する競合基質またはペプチド、DSP-5（またはDSP-5代替形態）の転写および/または翻訳を妨害するアンチセンスポリヌクレオチドおよびリボザイム、ならびにDSP-5（またはDSP-5代替形態）に結合し、そしてDSP-5（またはDSP-5代替形態）を不活化する他の天然分子および合成分子（例えば、低分子イン

ヒビター)。

【0108】

本発明に従うDSP-5(またはDSP-5代替形態)のモジュレーターをスクリーニングする方法における使用のための候補薬剤は、「ライブラリー」または化合物、組成物もしくは分子のコレクションとして提供され得る。このような分子は、代表的には、当該分野において「低分子」として知られ、そして $10^5$ ダルトン未満、好ましくは $10^4$ ダルトン未満、そしてなおより好ましくは、 $10^3$ ダルトン未満の分子量を有する化合物を含む。例えば、試験化合物のライブラリーのメンバーは、本明細書中に提供されるような少なくとも1つのDSP-5ポリペプチド(またはDSP-5代替形態ポリペプチド)を各々含む、複数のサンプルに投与され得、次いで基質のDSP-5媒介脱リン酸化または基質へのDSP-5媒介結合を増強または阻害するそれらの能力についてアッセイされる。DSP-5機能(例えば、ホスホチロシンおよび/またはホスホセリン/スレオニン脱リン酸化)に影響を与え得るとしてこのように同定された化合物は、治療目的および/または診断目的のために役立つ。なぜなら、これらは、DSP-5活性に関連する疾患の処置および/または検出を可能にするからである。このような化合物はまた、DSP-5に關与する分子シグナル伝達機構に関する研究、およびさらなる特異性を示す将来のDSP-5化合物の発見および開発における改良に関する研究において役立つ。

【0109】

候補薬剤はさらに、コンビナトリアルライブラリーのメンバーとして提供され得、これは、好ましくは、複数の反応容器中で行われる所定の複数の化学反応に従って調製された合成薬剤を含む。例えば、種々の出発化合物は、1以上の固相合成、記録されたランダム混合手順および記録された反応分割手段を利用して調製され得、これらは、所定の構成が、複数の順列および/または組み合わせの反応条件を帰属可能に受けを可能にする。得られる生成物は、スクリーニングされ得、次いで反復の選択および合成手順をされ得るライブラリー(例えば、ペプチド(例えば、PCT/US91/08694、PCT/US91/04666(これらは、本明細書中でその全体を参考として援用される))を参照のこと

)または本明細書中で提供されるような低分子を含み得る他の組成物(例えば、PCT/US94/08542、EP 0774464、米国特許第5,798,035号、米国特許第5,789,172号、米国特許第5,751,629号(これらは、本明細書中でその全体を参考として援用される)を参照のこと)の合成コンビナトリアルライブラリー)を構成する。このようなライブラリーの多様な分類は、確立された手順に従って調製され得、そして本開示に従うDSP-5を用いて試験され得ることを、当業者は理解する。

#### 【0110】

特定の実施形態においては、調節薬剤は、候補薬剤を、DSP-5(またはDSP-5代替形態)ポリペプチドまたはこのようなポリペプチドをコードするDSP-5(またはDSP-5代替形態)ポリヌクレオチドと、インビトロまたはインビボで組み合わせ、そして候補薬剤のDSP-5ホスファターゼ活性に対する効果を、例えば、本明細書中に記載される代表的なアッセイを用いて評価することによって同定され得る。ホスファターゼ活性における増加または減少は、候補薬剤の存在下および非存在下で、本明細書中に提供される代表的なアッセイを行うことによって測定され得る。手短には、候補薬剤は、活性DSP-5(またはDSP-5代替形態)ポリペプチドと基質(例えば、リン酸化MAP-キナーゼ)の混合物中に、この混合物の1以上の成分とのプレインキュベーションありまたはなしで含まれ得る。一般的に、抗体またはこのようなアッセイにおける使用のための他の薬剤の適切な量は、約0.01 $\mu$ M~約100 $\mu$ Mの範囲である。次いで、薬剤のDSP-5活性への効果は、基質からのホスフェートの損失を定量化し、そしてその損失を、候補薬剤の添加なしでDSP-5(またはDSP-5代替形態)を用いて達成された損失と比較することによって評価され得る。あるいは、結合キナーゼアッセイが使用され得、このアッセイにおいてDSP-5活性は、MAP-キナーゼ活性に基づいて間接的に測定される。

#### 【0111】

あるいは、DSP-5(またはDSP-5代替形態)コード領域またはレポーター遺伝子と作動可能に連結されたDSP-5プロモータを含むポリヌクレオチドは、試験化合物のDSP-5転写への影響を評価するために使用され得る。こ

のようなアッセイは、DSP-5（またはDSP-5代替形態）を内因的に発現する細胞（例えば、ヒトもしくは他の哺乳動物の脳、精巣、卵巣、脾臓または胸腺）またはレポーター遺伝子と連結したDSP-5プロモーターを含む発現ベクターでトランスフェクトされた細胞において行われ得る。次いで、試験化合物の効果は、DSP-5またはレポーターの転写に対する効果を、例えば、ノーザンブロット分析または適切なレポーター活性アッセイを用いてアッセイすることによって評価され得る。

#### 【0112】

DSP-5活性はまた、その発現が適切な基質の活性化に依存するレポーター遺伝子でトランスフェクトした全細胞において測定され得る。例えば、適切な細胞（すなわち、DSP-5（またはDSP-5代替形態）を発現する細胞）は、レポーター遺伝子と連結された基質依存性プロモーターでトランスフェクトされ得る。このような系において、レポーター遺伝子の発現（これは、当業者に周知の方法を用いて容易に検出され得る）は、基質の活性化に依存する。基質の脱リン酸化は、レポーター活性における減少に基づいて検出され得る。候補調節薬剤は、上記のようにこのような系に添加され得、DSP-5活性に対するそれらの効果を評価する。

#### 【0113】

本発明はさらに、DSP-5（またはDSP-5代替形態）と相互作用するか、またはDSP-5（またはDSP-5代替形態）に結合する分子を同定するための方法を提供する。このような分子は、一般的に、少なくとも $10^4$ 、好ましくは、少なくとも $10^5$ 、より好ましくは、少なくとも $10^6$ 、なおより好ましくは、少なくとも $10^7$ 、そして最も好ましくは、少なくとも $10^8$ の親和力定数（ $K_d$ ）を有してDSP-5（またはDSP-5代替形態）と会合する。親和力定数は、周知の技術を用いて決定され得る。相互作用分子を同定するための方法は、例えば、調節薬剤についての最初のスクリーニングとして、またはインビボでのDSP-5活性に関与する因子を同定するために使用され得る。基質捕捉のための技術（例えば、上記のようなDSP-5改変体もしくはDSP-5代替形態改変体または基質捕捉変異体を用いる）はまた、本明細書中で提供される特定の

実施形態に従って意図される。標準的な結合アッセイに加えて、相互作用分子を  
同定するために周知である多くの他の技術（酵母ツーハイブリッドスクリーニン  
グ、ファージディスプレイおよび親和力技術を含む）が存在する。このような技  
術は、慣用的なプロトコルを用いて行われ得、これらのプロトコルは当業者に周  
知である（例えば、Bartelら、Cellular Interactions in Development: A Practical Approach、D. A. Harley（編）、Oxford University Press（Oxford, UK）、153～179頁、1993を参照のこと）。  
これらおよび他の技術においては、候補相互作用タンパク質（例えば、推定D  
SP-5基質）は、DSP-5結合タンパク質またはDSP-5相互作用タンパ  
ク質の存在についてアッセイする前に、リン酸化され得る。

#### 【0114】

他の局面においては、本発明は、動物が機能的なDSP-5（またはDSP-  
5代替形態）の発現も、変化したDSP-5（またはDSP-5代替形態）の発  
現もしない、動物モデルを提供する。このような動物は、標準的な相同組換え戦  
略を用いて産生され得る。この様式で産生された動物モデルは、DSP-5（ま  
たはDSP-5代替形態）ポリペプチドの活性およびインビボでの調節薬剤を研  
究するために使用され得る。

#### 【0115】

（基質を脱リン酸化する方法）

本発明の別の局面において、DSP-5（またはDSP-5代替形態）ポリペ  
プチドは、本明細書中で提供されるDSP-5（またはDSP-5代替形態）の  
基質を脱リン酸化するために使用され得る。1つの実施形態において、基質は、  
30℃で10分間、適切な緩衝液（例えば、Tris、pH7.5、1mM E  
DTA、1mM ジチオスレイトール、1mg/mL ウシ血清アルブミン）中  
で基質とともにDSP-5（またはDSP-5代替形態）ポリペプチドをインキ  
ュベートすることで、インビボで脱リン酸化され得る。MAPキナーゼのような  
、DSP-5によって脱リン酸化され得る任意の化合物が、基質として使用され  
得る。一般に、反応成分の量は、約50pg～約50ngのDSP-5（または

DSP-5代替形態)ポリペプチドにわたり、そして約10ng~約10μgの基質にわたり得る。次いで、脱リン酸化された基質は、例えば、親和性技術および/またはゲル電気泳動によって精製され得る。基質の脱リン酸化の程度は、[<sup>32</sup>P]標識化基質を試験アリコートに添加し、そして本明細書中に記載されるように基質の脱リン酸化のレベルを評価することによって、一般にモニターされ得る。

#### 【0116】

##### (細胞応答を調節する方法)

調節薬剤は、インビボおよびインビトロの両方の種々の状況における、細胞の増殖、分化および生存のような細胞応答を、調節、改変またはさもなくば変化(例えば、増加または減少)するために使用され得る。一般に、このような応答を調節(例えば、統計的に有意な様式で増加または減少)するために、細胞は、DSP-5活性の調節を可能にするのに十分な時間および条件下で、DSP-5活性を調節する薬剤に接触される。細胞応答を調節する薬剤は、種々の方法の任意において機能し得る。例えば、薬剤は、遺伝子発現のパターンを調節し得る(すなわち、協調的様式で発現される遺伝子ファミリーまたは遺伝子の発現を増大または阻害し得る)。種々のハイブリダイゼーションおよび増幅の技術は、遺伝子発現のパターンを評価するために利用可能である。あるいは、またはさらに、薬剤は細胞のアポトーシスまたは壊死をもたらし得、そして/または細胞内の細胞サイクルの機能を調節し得る。(例えば、Ashkenaziら、1998 Science、281:1305; Thornberryら、1998 Science 281:1312; Evanら、1998 Science 281:1317; Adamsら、1998 Science 281:1322; およびそれらに列挙される参考文献を参照のこと。)

上記のように処置された細胞は、変化した増殖、分化または生存特性を有する細胞の標準的特徴を示し得る。さらに、このような細胞は、細胞増殖の接触阻害、足場非依存性増殖または改変された細胞間接着のような、他の検出可能な特性における変化を示し得る(しかし、必要とはされない)。このような特性は、当業者が精通した技術を使用して容易に検出され得る。

## 【0117】

## (治療方法)

1つ以上のDSP-5ポリペプチドもしくはDSP-5代替形態ポリペプチド、調節薬剤(DSP-5と特異的に結合する任意の薬剤(例えば、本明細書中に提供されるような抗体またはそのフラグメント))および/またはこのようなポリペプチドをコードするポリヌクレオチドおよび/または調節薬剤はまた、患者においてDSP-5活性を調節するためにも使用され得る。本明細書中で使用される場合、「患者」は、任意の哺乳動物(ヒトを含む)であり得、そしてDSP-5活性に関連した状態に冒され得るか、または検出可能な疾患を有さないものであり得る。従って、処置は、存在する疾患の処置であり得るか、または予防的であり得る。DSP-5活性に関連する状態としては、細胞増殖(癌、対宿主性移植片病(GVHD)、自己免疫疾患、アレルギーまたは免疫抑制が関与し得る他の状態を含む)、代謝疾患、異常な細胞増殖または異常な細胞分化、および細胞周期異常に関連する任意の障害が挙げられる。このような特定の障害は、正常なMAPキナーゼのホスファターゼ活性の欠損に関連し、制御されていない細胞増殖を導く。DSP-5(またはDSP-5代替形態)ポリペプチドおよびこのようなポリペプチドをコードするポリヌクレオチドは、このような障害を回復させるために使用され得る。

## 【0118】

患者への投与のために、1つ以上のポリペプチド、ポリヌクレオチドおよび/または調節薬剤が、薬学的組成物として一般に処方される。薬学的組成物は、滅菌した水溶液または非水溶液、懸濁液または乳濁液であり得、これはさらに生理学的に受容可能なキャリア(すなわち、活性成分の活性に干渉しない非毒性物質)を含む。このような組成物は、固体、液体または気体(エアロゾル)の形態であり得る。あるいは、本発明の組成物は、凍結乾燥物として処方され得るか、または化合物は、周知の技術を使用してリポソーム内にカプセル化され得る。本発明の範囲内の薬学的組成物はまた、他の成分を含み得、これらは生物学的に活性であるか、または不活性であり得る。このような成分としては、以下が挙げられるがこれらに限定されない: 緩衝液(例えば、中性緩衝生理食塩水またはリン酸

緩衝生理食塩水)、炭水化物(例えば、ブドウ糖、マンノース、ショ糖またはデキストラン)、マンニトール、タンパク質、ポリペプチド、またはグリシンのようなアミノ酸、抗酸化剤、EDTAまたはグルタチオンのようなキレート化剤、安定剤、色素、矯味矯臭剤、および懸濁剤および/または保存剤。

#### 【0119】

当業者に公知の任意の適切なキャリアは、本発明の薬学的組成物において使用され得る。治療的使用のためのキャリアは周知であり、そして例えば、Remingtons Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing Co. (A. R. Gennaro 編 1985)に記載される。一般に、キャリアの型は、投与の形態に基づいて選択される。薬学的組成物は、投与(例えば、局所的、経口、経鼻、クモ膜下内、直腸、膺、舌下、または非経口(皮下、静脈内、筋肉内、胸骨内(intrasternal)、空洞内、道内(intrameatal)、または尿道内の注射あるいは注入が挙げられる)投与が挙げられる)の任意の適切な様式のために処方され得る。非経口投与について、このキャリアは、好ましくは水、生理食塩水、アルコール、脂肪、ワックスまたは緩衝液を含む。経口投与について、上記の任意のキャリアまたは固体キャリア(例えば、マンニトール、ラクトース、デンプン、ステアリン酸マグネシウム、ナトリウムサッカリン、滑石粉、セルロース、カオリン、グリセリン、デンプンデキストリン、アルギニン酸ナトリウム、カルボキシメチルセルロース、エチルセルロース、ブドウ糖、ショ糖、および/または炭酸マグネシウム)が使用され得る。

#### 【0120】

薬学的組成物(例えば、経口投与または注射による送達のための)は、液体形態(例えば、エリキシル、シロップ、溶液、乳濁液または懸濁液)であり得る。液体の薬学的組成物としては、例えば以下の1つ以上が挙げられ得る:注射のための水、食塩水、好ましくは生理食塩水、リンゲル液、等張性塩化ナトリウム、溶媒または懸濁媒体として役立つ合成のモノグリセリドまたはジグリセリドのような不揮発性油、ポリエチレングリコール、グリセリン、プロピレングリコールまたは他の溶媒のような滅菌希釈剤;ベンジルアルコールまたはメチルパラ

ベン ( p a r a b e n ) のような抗菌剤 ; アスコルビン酸または亜硫酸水素ナトリウムのような抗酸化剤 ; エチレンジアミン四酢酸のようなキレート化剤 ; アセテート、シトレートまたはホスフェートのような緩衝液および塩化ナトリウムまたはブドウ糖のような張度の調節のための薬剤。非経口調製物は、ガラスまたはプラスチックで作製されたアンプル、使い捨てシリンジまたは複数の用量バイアルに同封され得る。生理食塩水の使用が好ましく、そして注射可能な薬学的組成物は、好ましくは滅菌されている。

#### 【0121】

本明細書中に記載された組成物は、持続放出のために処方され得る (すなわち、投与に続く化合物の緩やかな放出をもたらすカプセルまたはスポンジのような処方物)。このような組成物は、一般的には周知の技術を用いて調製され得、そして例えば、経口、直腸または皮下埋め込み術によってか、または所望の標的部位への移植によって投与され得る。持続放出处方物は、キャリアマトリックスにおいて分散され、そして / または速度制御膜によって囲まれたリザーバ内に含まれる薬剤を含み得る。このような処方物内での使用のためのキャリアは、生体適合性であり、そしてまたは生分解性であり得る ; 好ましくは、この処方物は、活性成分の放出の比較的一定のレベルを提供する。持続放出处方物に含まれる活性成分の量は、移植の部位、放出の速度および予期される持続期間ならびに処置または予防される状態の性質に依存する。

#### 【0122】

D S P - 5 ( もしくは D S P - 5 代替形態 ) ポリペプチドおよび / または調節薬剤をコードするポリヌクレオチドを ( ポリペプチドおよび / または調節薬剤が、インサイチュで生成されるように ) 含有する薬学的組成物に関して、このポリヌクレオチドは、核酸ならびに、細菌発現系、ウイルス発現系および哺乳動物発現系を含む、当業者に公知の種々の送達系のいずれかに存在され得る。このような発現系に DNA を取り込むための技術は、当業者に周知である。この DNA はまた、例えば、Ulmerら、Science 259 : 1745 - 1749 , 1993 に記載およびCohen , Science 259 : 1691 - 1692 , 1993 によって概説されるように「裸」であり得る。裸の DNA の取り込

みは、細胞に効果的に輸送される生分解性ビーズ上にDNAを被覆することによって上昇され得る。

#### 【0123】

薬学的組成物内の、DSP-5（またはDSP-5代替形態）ポリペプチド、ポリヌクレオチドまたは調節薬剤は、種々の化合物のいずれかに連結され得る。例えば、このような因子は、その薬剤の標的部位への送達を容易にする標的化部分（例えば、モノクロナール抗体またはポリクロナール抗体、タンパク質またはリポソーム）に連結され得る。本明細書中で使用される場合「標的化部分」は、任意の物質（例えば、化合物または細胞）であり得、その薬剤の標的細胞または組織への輸送を増大する薬剤と連結された場合、それによってその薬剤の局所的な濃度を上昇する。標的化部分としては、抗体またはそのフラグメント、レセプター、リガンドならびに標的組織の細胞に結合する他の分子、または標的組織の近位の細胞に結合する他の分子が挙げられる。抗体標的化因子は、インタクト（全て）な分子、そのフラグメント、またはその機能的な等価物であり得る。抗体フラグメントの例としては、 $F(ab')_2$ 、 $-Fab'$ 、 $Fab$ および $F[v]$ フラグメントであり、これらは、従来の方法によってか、または遺伝子工学もしくはタンパク質工学によって産生され得る。結合は、一般的には、共有結合であり、そして例えば、直接縮合または他の反応によってか、二機能性リンカーまたは多機能性リンカーを手段として達成され得る。標的化部分は、薬剤が治療的利点を発揮すると予期される、細胞または組織に基づいて選択され得る。

#### 【0124】

薬学的組成物は、処置（または予防）される疾患に適切な様式で投与され得る。適切な投薬量ならびに投与の適切な持続期間および頻度は、患者の状態、患者の疾患の型および重篤性、活性成分の特定の形態および投与の方法のような因子によって決定される。一般的には、適切な投薬量および処置レジメンは、治療的利点および/または予防的利点（例えば、より多くの完全な寛解または部分的な寛解、または長期の無疾患および/または全体的な生存のような臨床的な成果を向上させる）を提供するのに十分な量で薬剤を提供する。予防的な使用に関して、用量は、細胞増殖に関連する疾患の発症を予防、遅延、またはこれの重篤性を

減少するのに十分でなければならない。

#### 【0125】

最適な投薬量は、一般的には、実験的なモデルおよび/または臨床的な試みを用いて決定され得る。一般的には、用量において存在するポリペプチドの量または用量において存在するDNAによってインサイチュで産生されるポリペプチドの量は、約0.01  $\mu\text{g}/\text{kg}$  宿主~約100  $\mu\text{g}/\text{kg}$  宿主、代表的には約0.1  $\mu\text{g}$  ~約10  $\mu\text{g}$  の範囲である。効果的な治療を提供するのに十分な最少投薬量の使用は、通常好ましい。患者は、一般的には、当業者に公知である処置または予防される状態について適切なアッセイを用いて治療有効性または予防有効性についてモニタされ得る。適切な用量サイズは、患者の大きさに伴って変化するが、代表的には、10~60 kgの動物に対して約10 mL ~約500 mL の範囲である。

#### 【0126】

以下の実施例は、例示の目的で提示するが、限定の目的ではない。

#### 【0127】

(実施例)

(実施例1)

(DSP-5およびDSP-5代替形態をコードするcDNAのクローニングおよび配列決定)

本実施例は、ヒトDSP-5をコードするcDNA分子のクローニングを示す。

#### 【0128】

二重特異性 (dual-specificity) ホスファターゼの活性部位ドメインの周囲の保存された配列モチーフを以下のように同定した：二重特異性ホスファターゼは、タンパク質チロシンホスファターゼ (PTP) のより大きなファミリーに属する。このファミリーのホスファターゼは、5つの可変アミノ酸ストレッチのN末端に位置するシステイン残基、それに続くアルギニン残基を含む保存された触媒性ドメインを共有する (Faumanら、Trends In Bioch. Sci. 21: 413~417、1996)。DSPは、代表的

に、PTP活性部位モチーフを含むが、他の領域においてはPTPに対する配列相同性を欠いている(Jia, Biochem. and Cell Biol. 75:17~26, 1997)。しかし、DSPの間で保存されているコンセンサス配列は、報告されておらず、かつ上記に言及されたような公知のDSP配列の試験から明白なコンセンサス領域も報告されていない。新しいDSPファミリーメンバーの同定に有用な、より長いコンセンサスDSPアミノ酸配列モチーフを誘導するために、複数の公知のヒト二重特異性ホスファターゼ配列を整列させ、比較した。MAP-キナーゼホスファターゼ活性を有する8つのヒトDSP由来の8つのアミノ酸配列の整列により、PTP活性部位サインモチーフを含む23アミノ酸のペプチド配列から構成される保存された相同性領域を得た。従って、以下の配列:

GRVLVHCQAGISRSGTNILAYLM (配列番号6)

を有する候補ペプチドを用いて、発現配列タグ(Expressed Sequence Tag)データベース(Nat. Center for Biol. Information. www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST)を検索した。この検索では、デフォルトパラメータ中の遺伝子コード縮重性を可能にする反復(iteration)で候補ペプチドの逆翻訳を可能にするアルゴリズム(tblastn)を使用した。この検索結果は、EST AA314946を、MAP-キナーゼホスファターゼ配列の候補として同定した。このESTは、発現された遺伝子の完全なコード領域を含まなかった。また、センス鎖およびオープンリーディングフレーム(ORF)も同定されなかった。ORFの存在を決定するために、EST AA314946配列を、2つの等しいセグメント(第1は、推定ORFのアミノ末端領域を含み、そして第2は、カルボキシ末端領域を含む)に細分した。アミノ末端フラグメントの配列を、上記のtblastnを用いるESTデータベースを再び検索するために使用し、そしてEST AA316253およびAA081517を、EST AA314946と有意な配列重複を有するとして同定した。EST AA314946のカルボキシ末端部分を、ESTデータベースを検索するために使用する場合、さらなるEST AA489562およびAA312939を、有意な配列重複を有

するとして同定した。

【0129】

全長コード配列を得るため、供給業者の指示に従って、5' / 3' RACEキット(Boehringer Mannheim, Indianapolis, IN; Clontech, Palo Alto, CA; Life Technologies, Inc., Gaithersburg, MD)を用いて、記載のように(Frohmanら、Proc. Nat. Acad. Sci. USA 85:8998、1988; Oharaら、Proc. Nat. Acad. Sci. USA 86:5673、1989; Lohら、Science 243:217、1989)、5' および3' RACE(rapid amplification of cDNA end:cDNA末端の迅速増幅)反応において、ヒト胸腺、脳、および精巣cDNAをスクリーニングした。保存された配列モチーフにすぐ隣接する配列情報を、ヒト胸腺、脳、および精巣のcDNAでの5' および3' RACE反応において用いた。これには、以下のプライマー(配列番号7~11)を用いた。

【0130】

【化1】

DSP5-SP1:	5'-ACTCAAACCCCTCATTCATCTTAGC-3'	SEQ ID NO:7
DSP5-SP2:	5'-CCACACTTCGACTGACTCCTGC-3'	SEQ ID NO:8
DSP5-SP3:	5'-CACCGAAATACAATCCTGGCTG-3'	SEQ ID NO:9
DSP5-SP5:	5'-CAGCCAGGATTGTATTTTCGGTG-3'	SEQ ID NO:10
DSP5-SP6:	5'-AGGATTGTATTTTCGGTGGGGC-3'	SEQ ID NO:11

生じたRACE 5'産物のヌクレオシド配列決定は、AA314946、AA316253およびAA081517の存在を確認し、そしてDSP-5の開始メチオニンについてコドンが存在するこれらの配列における決定を可能にした。

【0131】

3' RACE産物の配列決定は、EST AA489562との有意な重複を示し、上記されるように、AA314946のカルボキシ末端領域との重複を示

した。DSP-5カルボキシ末端をコードするヌクレオチド配列を同定するために、ESTデータベースを、プローブとしてEST AA489562配列を用いて、上記の通りに検索した。結果は、EST AA489562と別のEST AA074665との有意な重複を示し、後者のESTは、DSP-5カルボキシ末端を含むことを示唆した。AA074665における3'配列の同一性を確認するために、以下のオリゴヌクレオチドプライマーを、設計および合成した：

DSP5-3'-norm:5'-TGAATGATAAGAAGCAAAGG  
CAGC-3' (配列番号12)

(これは、DSP-5 ORFに対する3'に位置しかつこの外にあるヌクレオチド配列領域について特異的である)かつ

DSP5-3'-end:5'-GTGGCAACTGAAATTATACCA  
GCC-3' (配列番号13)

(これは、以前に確認されたORFに局在する)。これらのプライマーを用いるPCR増幅は、残余のDSP-5 C末端領域配列ならびにDSP-5のカルボキシ末端の決定を可能にする。614塩基対の推定単位複製配列を、胸腺、脳および精巢cDNAテンプレートから得た。

#### 【0132】

検索配列としてAA489562を用いる、上記のESTデータベース検索はまた、さらなるEST、AA923158を所与した。AA923158を、BLASTアルゴリズムを用いる検索配列としてESTデータベースに再実行する場合、類似性を、別のEST、AA88077(第2潜在性DSP-5 C末端についてのコード配列を含む)に対して同定した。これらのさらなるESTにおける3'配列の同一性を確認するために、末端コドンに対する配列3'に特異的なオリゴマープライマー：

DSP5-3'var:5'-GTTAAAATAGAGCTTAAAATGC  
AAGAAGG-3' (配列番号14)

を、脳および胸腺cDNAから推定サイズの単位複製配列をPCR増幅するために、DSP5-3'末端(配列番号13)と対にした。

#### 【0133】

340アミノ酸のDSP-5タンパク質(図3;配列番号3)をコードするcDNA(図1;配列番号1)および299アミノ酸(図4;配列番号4)のDSP-5タンパク質(「DSP-5代替形態」)の代替形態をコードする別の3'末端を有する代替cDNA形態(図2、配列番号2)を同定した。第1287アミノ酸(配列番号3および4に共通する)をコードするDNA配列は、他のMAP-キナーゼホスファターゼ(図5)に対して有意な相同性を有する。同定されたcDNAは、1020(図1)塩基対のコード領域および897(図2)塩基対コード領域、ならびに関連する5'および3'非翻訳配列を含む。DSP-5(およびDSP-5代替形態)についての活性部位ドメインを、配列番号3および4の各々においてアミノ酸の113位で始まる領域に同定させた。

#### 【0134】

半定量的RT-PCR分析を実行した。これらの分析は、脳、精巣、および胸腺における、有意により高いレベルのDSP-5 mRNAを示した。

#### 【0135】

(実施例2)

(ヒト組織におけるDSP-5発現)

本実施例において、DSP-5コード核酸配列が、種々の組織供給源由来のヒトポリA+RNAにハイブリダイズすることを示す。核酸ハイブリダイゼーションプローブとしての使用のため、全長DSP-5コードcDNA(配列番号1)を、Ausubelら(1998 Current Protocols in Molecular Biology, Greene Publ. Assoc. Inc. & John Wiley & Sons, Inc., Boston, MA)に記載のランダムプライマー方法により<sup>32</sup>P標識した。このプローブを、検出可能なアクチンmRNAの量について基準化した、複数のヒト組織に由来するヒトポリA+RNAを含むプロット(図4、カタログ番号7759-1; Clontech, Inc., Palo Alto, CA)にハイブリダイズした。Express Hyb™溶液(Clontech)中で68°Cで30分間、プロットをプレハイブリダイゼーションし、次いで、標識したプローブを用い、Express Hyb™溶液中で、68°Cで1時間ハイブリダイズした。次

に、このプロットを、 $2 \times \text{SSC}$ 、 $0.5\%$  SDS中で、室温にて40分間洗浄し、次いで、 $0.1 \times \text{SSC}$ 、 $0.1\%$  SDS中で50 で40分間、2回目の洗浄をした。プロットを風乾し、次いで、Hyperfilm MP™オートラジオグラフィフィルム(Amersham Life Sciences, Arlington Hts, IL)に一晩曝露した。結果を図5に示す。ここでは、RNAのヒト組織供給源は以下のとおりであった：(図6A)レーン1、心臓；レーン2、脳；レーン3、胎盤；レーン4、肺；レーン5、肝臓；レーン6、骨格筋；レーン7、腎臓；レーン8、脾臓；(図6B)レーン1、脾臓；レーン2、胸腺；レーン3、前立腺；レーン4、精巣；レーン5、卵巣；レーン6、小腸；レーン7、結腸；レーン8、末梢血白血球。

#### 【0136】

前述により、本発明の特定の実施形態が例示の目的で本明細書において記載されているが、種々の改変が本発明の精神および範囲から逸脱することなくなされ得ることが理解される。従って、本発明は添付の特許請求の範囲によってしか限定されない。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【図1】

図1は、DSP-5についてのcDNA配列(配列番号1)を示し、開始コドンおよび終止コドンが、太字で示される。

##### 【図2】

図2は、DSP-5代替形態のcDNA配列(配列番号2)を示し、開始コドンおよび停止コドンは、太字で示される。

##### 【図3】

図3は、DSP-5の推定アミノ酸配列(配列番号3)を示す。

##### 【図4】

図4は、DSP-5代替形態の推定アミノ酸配列(配列番号4)を示す。

##### 【図5】

図5は、DSP-5と他のMAP-キナーゼホスファターゼとの間の配列類似性を示す、配列アラインメントである。

## 【図6】

図6は、 $^{32}\text{P}$ 標識した全長DSP-5コード核酸配列をプローブとして使用する、ノーザンブロットハイブリダイゼーションを示す。プロットは、以下のような種々の組織型由来のヒトポリA+RNAを含んだ：(図6A)レーン1、心臓；レーン2、脳；レーン3、胎盤；レーン4、肺；レーン5、肝臓；レーン6、骨格筋；レーン7、腎臓；レーン8、膵臓；(図6B)レーン1、脾臓；レーン2、胸腺；レーン3、前立腺；レーン4、精巣；レーン5、卵巣；レーン6、小腸；レーン7、結腸；レーン8、末梢血白血球。

## 【図1】

1020 塩基対においてコードされた DSP-5

```

1  GACGCGTGGC CATGTTGGAG GCTCCGGGCC CGAGTGATGG CTGCGAGCTC AGCAACCCCA
61  GCGCCAGCAG AGTCAGCTGT GCCGGGCAGA TGCTGGAAGT GCAGCCAGGA TTGTATTTCTG
121 GTGGGGCCGC GGCCGTCGCG GAGCCAGATC ACCTGAGGGA AGCGGGCATC ACGGCCGTGC
181 TAACAGTGGG CTCGGAGGAG CCCAGCTTCA AGGCGGGGCC TGGGGTCGAG GATCTATGGC
241 GCCTCTTCGT GCCAGCGCTG GACAAACCCG AGACGGACCT ACTCAGCCAT CTGGACCGGT
301 GCGTGGCCTT CATCGGTCAG GCCCGCGCTG AGGGCCGTGC GGTGTTGGTG CACTGTCATG
361 CAGGAGTCAG TCGAAGTGTG GCCATAATAA CTGCTTTTCT CATGAAGACT GACCAACTTC
421 CCTTTGAAAA AGCCTATGAA AAGCTCCAGA TTCTCAAACC AGAGGCTAAG ATGAATGAGG
481 GGTTTGAGTG GCAACTGAAA TTATACCAGG CAATGGGATA CGAAGTGGAT ACCTCTAGTG
541 CAATTTATAA GCAATATCGT TTACAAAAGG TTACAGAGAA GTATCCAGAA TTGCAGAATT
601 TACCTCAAGA ACTCTTTGCT GTTGACCCAA CTACCGTTTC ACAAGGATTG AAAGATGAGG
661 TTCTCTACAA GTGTAGAAAG TGCAGGCGAT CATTATTTCT AAGTTCTAGT ATTCTGGATC
721 ACCGTGAAGG AAGTGGACCT ATAGCCTTTG CCCACAAGAG AATGACACCA TCTTCCATGC
781 TTACCACAGG GAGGCAAGCT CAATGTACAT CTTATTTTCAT TGAACCTGTA CAGTGGATGG
841 AATCTGCTTT GTTGGGAGTG ATGGATGGAC AGCTTCTTTG CCCAAAATGC AGTGCCAAGT
901 TGGGTTTCCT CAACTGGTAT GGTGAACAGT GCTCTTGTGG TAGGTGGATA ACACCTGCTT
961 TTCAAATACA TAAGAATAGA GTGGATGAAA TGAAAATATT GCCTGTTTTG GGATCACAAA
1021 CAGGAAAAAT ATGAACATGA TATTTTATAG CTTGGGAAGA AACTTGCAGA TGATATGTGC
1081 TGCCTTTGCT TCTTATCATT CATGGC

```

【図2】

897塩基対によるコードされた DSP-5 の代替形態

1 GACGCGTGGC CATGTTGGAG GCTCCGGGCC CGAGTGATGG CTGCGAGCTC AGCAACCCCA  
 61 GCGCCAGCAG AGTCAGCTGT GCCGGGCAGA TGCTGGAAGT GCAGCCAGGA TTGTATTTTCG  
 121 GTGGGGCCGC GGCCGTCGCG GAGCCAGATC ACCTGAGGGA AGCGGGCATC ACGGCCGTGC  
 181 TAACAGTGGG CTCGGAGGAG CCCAGCTTCA AGGCGGGGCC TGGGGTCGAG GATCTATGGC  
 241 GCCTCTTCGT GCCAGCGCTG GACAAACCCG AGACGGACCT ACTCAGCCAT CTGGACCGGT  
 301 GCGTGGCCTT CATCGGTCAG GCCCGCGCTG AGGGCCGTGC GGTGTTGGTG CACTGTCATG  
 361 CAGGAGTCAG TCGAAGTGTG GCCATAATAA CTGCTTTTCT CATGAAGACT GACCAACTTC  
 421 CCTTTGAAAA AGCCTATGAA AAGCTCCAGA TTCTCAAACC AGAGGCTAAG ATGAATGAGG  
 481 GGTGTTGAGTG GCAACTGAAA TTATACCAGG CAATGGGATA CGAAGTGGAT ACCTCTAGTG  
 541 CAATTTATAA GCAATATCGT TTACAAAAGG TTACAGAGAA GTATCCAGAA TTGCAGAATT  
 601 TACCTCAAGA ACTCTTTGCT GTTGACCCAA CTACCGTTTC ACAAGGATTG AAAGATGAGG  
 661 TTCTCTACAA GTGTAGAAAAG TGCAGGCGAT CATTATTTTCG AAGTTCTAGT ATTCTGGATC  
 721 ACCGTGAAGG AAGTGGACCT ATAGCCTTTG CCCACAAGAG AATGACACCA TCTTCCATGC  
 781 TTACCACAGG GAGGCAAGCT CAATGTACAT CTTATTTTCAT TGAACCTGTA CAGTGGATGG  
 841 AATCTGCTTT GTTGGGAGTG ATGGATGGAC AGGTGAGAAC ACATTTTATT TTCTACAATT  
 901 TTATTTTATG ATCTATATTT TATTCCTTCT TGCATTTTAA GCTCTATTTT AACTAGTGTT  
 961 TTGCTCCATT TCTTAATTTT TTTATTTCTG ATGATTATAT CTTTCTTGTG TAGATAA

【図3】

DSP-5, 340アミノ酸の推定アミノ酸配列

MLEAPGPSDGCELSNPSASRVSCAGQMLEVQPLYFGAAVAEPDHLREAGITAVLTVDSEEPSFKAGP  
 GVEDLWRLFVPALDKPETDLLSHLDRCVAFIGQARAEGRAVLVHCHAGVSRVVAITAFMKTDQLPFK  
 AYEKLQILKPEAKMNEGFQWLKLYQAMGYEVDTSIAIKYRQLQKVTKEYPELQNLQELFAVDPTTVS  
 QGLKDEVLYKCRKRRSLFRSSILDHREGSGPIAFAHKRMT PSSMLTTGRQAQCTS YFIEPVQWMSAL  
 LGVMDGQLLCPKCSAKLGSFNWYGEQCSCGRWITPAFQIHKNRVDEMILPVLGSQTGKI\*

Fig. 3

【図4】

DSP-5 の代替形態, 299アミノ酸の推定アミノ酸配列

MLEAPGPSDGCELSNPSASRVSCAGQMLEVQPLYFGAAVAEPDHLREAGITAVLTVDSEEPSFKAGP  
 GVEDLWRLFVPALDKPETDLLSHLDRCVAFIGQARAEGRAVLVHCHAGVSRVVAITAFMKTDQLPFK  
 AYEKLQILKPEAKMNEGFQWLKLYQAMGYEVDTSIAIKYRQLQKVTKEYPELQNLQELFAVDPTTVS  
 QGLKDEVLYKCRKRRSLFRSSILDHREGSGPIAFAHKRMT PSSMLTTGRQAQCTS YFIEPVQWMSAL  
 LGVMDGQVRTHFIFYNFIL\*

Fig. 4



【図6】

• 1-ガンマロート分析




Fig. 6A-6B

## 【国際調査報告】

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

		International Application No. PCT/US 00/11665
<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> IPC 7 C12N15/55 C12N9/16 C12N15/11 G01N33/53 C12Q1/68 C12Q1/42 C07K16/40		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C12N C07K G01N C12Q		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, BIOSIS, EMBL, WPI Data, PAJ, MEDLINE		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DATABASE EMBL 'Online! Accession AA314946, 18 April 1997 (1997-04-18) ADAMS M D ET AL: "EST186775 HCC cell line (matatasis to liver in mouse) II Homo sapiens cDNA 5' end similar to tyrosine phosphatase CL100" XP002145710 cited in the application 99.4% identity in 501 BP overlap (pos. 31-531) of SEQ ID NO 1 and 2  --- -/-	1-14, 50-63
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C.		<input type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.
* Special categories of cited documents :		
*A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *Z* document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report
29 August 2000		11/09/2000
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo.nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer  Lejeune, R

3

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In tional Application No  
PCT/US 00/11665

G.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>DATABASE EMBL 'Online! Accession AA489562, 2 July 1997 (1997-07-02) HILLIER L ET AL: "ab40g09.r1 Stratagene HeLa cell s3 937216 Homo sapiens cDNA clone IMAGE:843328 5' similar to SW:PVHI_YEAST Q02256 PROTEIN-TYROSINE PHOSPHATASE YVHI ;, mRNA sequence." XP002145711 cited in the application 99.5% identity in 372 BP overlap (pos. 351-722) with SEQ ID NO 1 and 2</p>	1-14, 50-63
X	<p>DATABASE EMBL 'Online! Accession AA1477450, 14 December 1996 (1996-12-14) HILLIER L ET AL: "z151g08.r1 Soares_pregnant_uterus_NbHPU Homo sapiens cDNA clone IMAGE:505502 5' similar to SW:PVHI_YEAST Q02256 PROTEIN-TYROSINE PHOSPHATASE YVHI ;, mRNA sequence" XP002145712 100% identity in 419 BP overlap (pos. 688-1106) with SEQ ID 1 99.5% identity in 187 BP overlap (pos. 688-874) with SEQ ID 1</p>	1-14, 50-63
P,X	<p>MUDA MARCO ET AL: "Identification of the human YVHI protein-tyrosine phosphatase orthologue reveals a novel zinc binding domain essential for in vivo function." JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, vol. 274, no. 34, 20 August 1999 (1999-08-20), pages 23991-23995, XP002145708 ISSN: 0021-9258 the whole document -&amp; DATABASE EMBL 'Online! Accession AF119226, 25 August 1999 (1999-08-25) MUDA M ET AL: "Homo sapiens dual-specificity tyrosine phosphatase YVHI mRNA, complete cds." XP002145713 99.8% identity in 1103 BP overlap with SEQ ID NO 1 99.7% identity in 871 BP overlap with SEQ ID NO 2</p>	1-14, 50-63

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/US 00/11665

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>GUAN K ET AL: "The yeast open reading frame encoding a dual specificity phosphatase" TIBS TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES., vol. 18, no. 1, January 1993 (1993-01), page 6 XP002145709 ELSEVIER PUBLICATION, CAMBRIDGE., EN ISSN: 0968-0004 the whole document</p>	1-14, 50-63
A	<p>MUDA MARCO ET AL: "Molecular cloning and functional characterization of a novel mitogen-activated protein kinase phosphatase, MKP-4." JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, vol. 272, no. 8, 1997, pages 5141-5151, XP002144712 ISSN: 0021-9258 abstract figure 1 figure 3B</p>	1-14
A	<p>FLINT A J ET AL: "DEVELOPMENT OF SUBSTRATE-TRAPPING MUTANTS TO IDENTIFY PHYSIOLOGICAL SUBSTRATES OF PROTEIN TYROSINE PHOSPHATASES" PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF USA, US, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE. WASHINGTON, vol. 94, 1 March 1997 (1997-03-01), pages 1680-1685, XP002051429 ISSN: 0027-8424 the whole document</p>	45,46, 94,95
A	<p>KEYSE S M: "AN EMERGING FAMILY OF DUAL SPECIFICITY MAP KINASE PHOSPHATASES" BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA. MOLECULAR CELL RESEARCH, NL, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, vol. 1265, 1995, pages 152-160, XP000196716 ISSN: 0167-4889 abstract figure 1</p>	

## FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/SA/ 210

Continuation of Box I.2

Claims Nos.: 33-44, 82-93

Claims 33-44, 82-93 were not searched because because the agent that modulates DSP-5 (or DSP-5 alternate form) activity is not sufficiently characterized.

The applicant's attention is drawn to the fact that claims, or parts of claims, relating to inventions in respect of which no international search report has been established need not be the subject of an international preliminary examination (Rule 66.1(e) PCT). The applicant is advised that the EPO policy when acting as an International Preliminary Examining Authority is normally not to carry out a preliminary examination on matter which has not been searched. This is the case irrespective of whether or not the claims are amended following receipt of the search report or during any Chapter II procedure.

## フロントページの続き

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-マ-コ-ト' (参考)
A 6 1 P 35/00		A 6 1 P 37/06	4 B 0 6 5
37/06		37/08	4 C 0 8 4
37/08		43/00	1 0 5 4 C 0 8 5
43/00	1 0 5	C 0 7 K 16/40	4 H 0 4 5
C 0 7 K 16/40		C 1 2 N 1/15	
C 1 2 N 1/15		1/19	
1/19		1/21	
1/21		9/16	B
5/06		C 1 2 Q 1/68	A
5/10		G 0 1 N 33/15	Z
9/16		33/50	Z
C 1 2 Q 1/68		33/53	D
G 0 1 N 33/15			M
33/50		33/566	
33/53		33/577	B
		33/58	Z
33/566		C 1 2 P 21/08	
33/577		C 1 2 N 15/00	Z N A A
33/58		5/00	A
// C 1 2 P 21/08			E

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW

Fターム(参考) 2G045 AA25 AA40 BB20 CA25 CB01  
DA12 DA13 DA14 DA20 DA36  
DA77 FB01 FB02 FB03 FB07  
4B024 AA01 AA11 BA11 BA44 CA01  
DA03 GA11 GA18 HA12  
4B050 CC01 CC03 DD11 EE10 LL01  
4B063 QA18 QQ02 QQ27 QQ42 QQ79  
QQ96 QR08 QR32 QR42 QR48  
QR55 QR62 QS25 QS33 QS34  
QX01  
4B064 AG27 CA19 CC24 DA01 DA13  
4B065 AA93X AA93Y AB01 AC14  
BA02 BB19 BB34 CA25 CA31  
CA44 CA46  
4C084 AA02 AA03 AA06 AA07 AA13  
AA17 CA53 NA14 ZB082  
ZB132 ZB212 ZB262  
4C085 AA13 AA14 DD62  
4H045 AA10 AA11 BA10 CA40 DA76  
DA89 EA20 EA50 FA74

专利名称(译)	DSP-5双特异性MAP激酶磷酸酶		
公开(公告)号	<a href="#">JP2002542786A</a>	公开(公告)日	2002-12-17
申请号	JP2000614403	申请日	2000-04-26
[标]申请(专利权)人(译)	硒Putia公司		
申请(专利权)人(译)	Seputia公司		
[标]发明人	ルーチェラルフエム ウェイボ		
发明人	ルーチェ, ラルフ エム. ウェイ, ボ		
IPC分类号	G01N33/50 A61K39/395 A61K45/00 A61P3/00 A61P35/00 A61P37/06 A61P37/08 A61P43/00 C07K16/40 C12N1/15 C12N1/19 C12N1/21 C12N5/06 C12N5/10 C12N9/16 C12N15/09 C12N15/55 C12P21/08 C12Q1/68 G01N33/15 G01N33/53 G01N33/566 G01N33/577 G01N33/58		
CPC分类号	A61P3/00 C12N9/16 C12Y301/03016 C12Y301/03048		
FI分类号	A61K39/395.D A61K39/395.N A61K45/00 A61P3/00 A61P35/00 A61P37/06 A61P37/08 A61P43/00.105 C07K16/40 C12N1/15 C12N1/19 C12N1/21 C12N9/16.B C12Q1/68.A G01N33/15.Z G01N33/50.Z G01N33/53.D G01N33/53.M G01N33/566 G01N33/577.B G01N33/58.Z C12P21/08 C12N15/00.ZNA.A C12N5/00.A C12N5/00.E		
F-TERM分类号	2G045/AA25 2G045/AA40 2G045/BB20 2G045/CA25 2G045/CB01 2G045/DA12 2G045/DA13 2G045/DA14 2G045/DA20 2G045/DA36 2G045/DA77 2G045/FB01 2G045/FB02 2G045/FB03 2G045/FB07 4B024/AA01 4B024/AA11 4B024/BA11 4B024/BA44 4B024/CA01 4B024/DA03 4B024/GA11 4B024/GA18 4B024/HA12 4B050/CC01 4B050/CC03 4B050/DD11 4B050/EE10 4B050/LL01 4B063/QA18 4B063/QQ02 4B063/QQ27 4B063/QQ42 4B063/QQ79 4B063/QQ96 4B063/QR08 4B063/QR32 4B063/QR42 4B063/QR48 4B063/QR55 4B063/QR62 4B063/QS25 4B063/QS33 4B063/QS34 4B063/QX01 4B064/AG27 4B064/CA19 4B064/CC24 4B064/DA01 4B064/DA13 4B065/AA93X 4B065/AA93Y 4B065/AB01 4B065/AC14 4B065/BA02 4B065/BB19 4B065/BB34 4B065/CA25 4B065/CA31 4B065/CA44 4B065/CA46 4C084/AA02 4C084/AA03 4C084/AA06 4C084/AA07 4C084/AA13 4C084/AA17 4C084/CA53 4C084/NA14 4C084/ZB082 4C084/ZB132 4C084/ZB212 4C084/ZB262 4C085/AA13 4C085/AA14 4C085/DD62 4H045/AA10 4H045/AA11 4H045/BA10 4H045/CA40 4H045/DA76 4H045/DA89 4H045/EA20 4H045/EA50 4H045/FA74		
优先权	60/131156 1999-04-27 US 09/564357 2000-04-24 US		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

#### 摘要(译)

提供了用于治疗涉及细胞增殖，细胞分化和细胞存活的病症的组合物和方法。特别地，提供了刺激DSP-5底物的去磷酸化的双特异性磷酸酶DSP-5和DSP-5的多肽变体。这些多肽可用于例如鉴定抑制DSP-5活性的抗体和其他试剂。这些多肽和试剂可用于调节细胞增殖，细胞分化和细胞存活。

