

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2019-89845

(P2019-89845A)

(43) 公開日 令和1年6月13日(2019.6.13)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 K 39/00 (2006.01)	A 6 1 K 39/00 H	4 B 0 6 4
A 6 1 P 31/04 (2006.01)	A 6 1 P 31/04	4 B 0 6 5
A 6 1 K 31/726 (2006.01)	A 6 1 K 31/726	4 C 0 7 6
A 6 1 K 47/64 (2017.01)	A 6 1 K 47/64	4 C 0 8 5
A 6 1 K 35/74 (2015.01)	A 6 1 K 35/74 G	4 C 0 8 6
審査請求 有 請求項の数 1 O L 外国語出願 (全 51 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2019-35315 (P2019-35315)	(71) 出願人	503146324
(22) 出願日	平成31年2月28日 (2019.2.28)		ザ ブリガム アンド ウィメンズ ホス ピタル インコーポレイテッド
(62) 分割の表示	特願2016-171443 (P2016-171443) の分割		The Brigham and Wom en's Hospital, Inc.
原出願日	平成15年11月12日 (2003.11.12)		アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 O 2 1 1 5 ポストン フランシス ストリ ート 7 5
(31) 優先権主張番号	60/425, 425	(74) 代理人	100078282
(32) 優先日	平成14年11月12日 (2002.11.12)		弁理士 山本 秀策
(33) 優先権主張国	米国 (US)	(74) 代理人	100113413
			弁理士 森下 夏樹

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 Staphylococcus 感染に対する多糖類ワクチン

(57) 【要約】

【課題】 Staphylococcus 感染に対する多糖類ワクチンの提供。

【解決手段】本発明は、Staphylococcus の脱アセチル化ポリN - アセチル化グルコサミン (dPNAG) の組成物に関する。このdPNAGは、天然供給源から単離され得、または新規に合成され得る。本発明はまた、Staphylococcus aureus、S. epidermidis、関連する他のコアグララーゼ陰性Staphylococcusまたはコアグララーゼ陽性Staphylococcus、およびica (細胞内接着) 遺伝子座を有する他の生物によって引き起こされる感染に対する能動免疫を誘導するワクチンとしての、dPNAGの使用に関する。本発明はさらに、dPNAGに指向される抗体について使用する方法、特に、同じレベルの感染に対する受動免疫を誘導するために使用する方法を提供する。

【選択図】なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

本明細書の一部に記載の発明。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、*Staphylococcus* 感染の処置および予防のための免疫を誘導するために有用な多糖類組成物に関する。本発明はまた多糖類ベースの抗原、それに関連する抗体および診断キットを作製および使用する方法、ならびにこの多糖類とそれに対する抗体の能動免疫および受動免疫を誘導するための方法に関する。

10

【背景技術】

【0002】

Staphylococcus は、通常ヒトの粘液膜および肌に生息しコロニーを作る、グラム陽性の細菌である。肌または粘膜液が、手術の間または他の外傷で損傷する場合、この *Staphylococcus* は、内部の組織へのアクセスを獲得し得、感染の発生を引き起こす。*Staphylococcus* が局所的に増殖しまたはリンパ系または血液系に侵入する場合、*Staphylococcus* 菌血症に関する合併症のような重篤な感染合併症が生じ得る。これらの合併症としてさまざまな臓器における敗血症性ショック、心内膜炎、関節炎、骨髄炎、肺炎および膿瘍が挙げられる。

【0003】

20

Staphylococcus は、遊離したコアグラゼを産生するコアグラゼ陽性生物、および遊離したコアグラゼを産生しないコアグラゼ陰性生物の両方を含む。*Staphylococcus aureus* は最も一般的コアグラゼ陽性形態である。*S. aureus* は、一般的に局所部位、管外または管内のいずれかにおいて感染を引き起こし、最終的に菌血症を引き起こし得る。*S. aureus* はまた、急性骨髄炎の主な原因であり、*Staphylococcus* 肺炎感染を引き起こす。さらに、*S. aureus* は、細菌性髄膜炎の症例の約 1 ~ 9 % および脳膿腫の症例の 10 ~ 15 % の原因である。

【0004】

30

少なくとも 21 種類のコアグラゼ陰性の *Staphylococcus* 種が公知であり、それには *S. epidermidis*、*S. saprophyticus*、*S. hominis*、*S. warneri*、*S. haemolyticus*、*S. saprophiteticus*、*S. cohnii*、*S. xylosus*、*S. simulans* および *S. capitis* が含まれる。*S. epidermidis* は静脈へのアクセスデバイスに関連する最も頻繁な感染原因因子であり、主要な院内の菌血症における最も頻繁な分離菌である。*S. epidermidis* はまた人工弁の心内膜炎にも関連する。

【0005】

40

Staphylococcus はまた、動物における一般的な細菌感染源である。例えば、*Staphylococcus* 乳腺炎は、ウシ、ヒツジおよびヤギのような反芻動物における一般的な問題である。この疾患は一般的に、抗生物質で処方されてこの感染が軽減されるが、この処置は費用のかかる手順でありかつ、今もなお乳製品の損失を引き起こす。現在までに同定されている最も有効なワクチンは、皮下に投与された無傷の *S. aureus* ワクチンである。しかし、生ワクチンの投与は感染の危険が伴う。この理由より、多くの研究者は、*S. aureus* 死菌ワクチンを産生し、および / または *S. aureus* に対する免疫を誘導する夾膜の多糖類または細胞壁成分を単離することを試みてきた。しかし、これらの試みは成功していない。

【発明の概要】

【課題を解決するための手段】

【0006】

(発明の要旨)

50

本発明はコアグラゼ陰性 *Staphylococcus* およびコアグラゼ陽性 *Staphylococcus* に対するヒトおよび動物の免疫に有用な方法および生産物に関する。この発明により、*S. aureus* および *S. epidermis* のような *Staphylococcus* からのほとんどアセート残基で置換されていない、表面多糖類そしてポリ N - アセチルグルコサミン (PNA G) が、インビボで高い免疫原性を有し、オプソニン死滅および感染からの保護を仲介する抗体を優先的に誘発することが発見された。それゆえ、この多糖類は、とりわけ、*Staphylococcus* に対する抗体依存性免疫応答を含む、免疫応答の生成において有用である。

【0007】

一つの局面では、この発明は、少なくとも2つの単量体単位の長さを有する β - 1, 6 - グルコサミンポリマーを含む単離された多糖類を含む組成物を提供する。ここで、グルコサミンのアミノ基の50%未満がアセートに置換されている。一つの局面では、その組成物が滅菌されている(例えば、それはインビボ注射に適している)。別の局面では、本発明は、少なくとも2つの単量体単位の長さを有する β - 1, 6 - グルコサミンポリマーを含む単離された多糖類を含む組成物を提供する。ここで、グルコサミンのアミノ基の50%未満がアセートに置換されており、そしてその多糖類はキャリアー化合物と結合体化している。

【0008】

本明細書全体において、「本発明の多糖類」とは、アセート置換が50%未満である *Staphylococcus* ポリ N - アセチルグルコサミン (PNA G) 表面多糖類をいう。この多糖類は本明細書において脱アセチル化 PNA G (d PNA G) と称される。d PNA G は、完全にまたは部分的に脱アセチル化され得、ただしアセチル化の範囲は0から50%未満であることが理解される。本明細書において使用される場合、天然 PNA G はさまざまな程度のアセチル化を有する PNA G の形態の混合物である。天然 PNA G は d PNA G を含み得るが、しかし、高いアセチル化形態の PNA G を有する混合物として存在する。本明細書において使用される「高いアセチル化」形態の PNA G とは50%より多くのアセート置換を有する PNA G である。

【0009】


いくつかの実施形態は、本発明の様々な局面に等しく適用される。これらの実施形態を以下に記載する。

【0010】

一つの実施形態では、この単離された多糖類は次に示す構造によって定義される：

【0011】

【化4】



【0012】

ここで、 n は 4 より大きいまたは等しい整数であり、 R は $-NH-CO-CH_3$ および $-NH_2$ からなる群より選択され、 R 基の 50%未満は $-NH-CO-CH_3$ である。この多糖類がキャリアー化合物またはキャリアー化合物と結合しているリンカーと結合体化している、本発明のいくつかの局面の n は 2、3、4、またはそれより大きい。

【0013】

一つの実施形態では、この多糖類は、少なくとも 800 ダルトンの分子量を有し、他方、他の実施形態では、分子量は、少なくとも 1000 ダルトンである。なおさらなる実施形態では、分子量は、少なくとも 1200 ダルトン、少なくとも 2000 ダルトンより大きく、少なくとも 2500 ダルトン、少なくとも 5000 ダルトン、少なくとも 7500 ダルトン、少なくとも 10,000 ダルトン、少なくとも 25,000 ダルトン、少なくとも 50,000 ダルトン、少なくとも 75,000 ダルトン、および少なくとも 100,000 ダルトンからなる群より選択される。なおさらなる実施形態では、分子量は、少なくとも 125,000 ダルトン、少なくとも 150,000 ダルトン、少なくとも 200,000 ダルトン、少なくとも 250,000 ダルトン、少なくとも 300,000 ダルトン、少なくとも 350,000 ダルトン、少なくとも 400,000 ダルトン、少なくとも 450,000 ダルトン、および少なくとも 500,000 ダルトンからなる群より選択される。

10

【0014】

この単離された多糖類は、少なくとも 2、少なくとも 3、少なくとも 4、少なくとも 5 または少なくとも 6 の単量体単位 of 長さ を有し得る。他の実施形態では、この多糖類の長さは、少なくとも 6 単量体単位、少なくとも 10 単量体単位、少なくとも 20 単量体単位、少なくとも 50 単量体単位、少なくとも 100 単量体単位、少なくとも 200 単量体単位、少なくとも 300 単量体単位、少なくとも 400 単量体単位および少なくとも 500 単量体単位からなる群より選択される。

20

【0015】

他の実施形態では、グルコサミンのアミノ基（または R 基）の、45%以下、40%以下、35%以下、30%以下、25%以下、20%以下、15%以下、10%以下、5%以下または 1%以下がアセテートに置換される。なおさらなる実施形態では、グルコサミンのアミノ基のいずれもがアセテートで置換されていない。この dPNA G はこれらのいずれかであり得る。

30

【0016】

それゆえに、この多糖類は、ヘテロ置換ポリマーであり得、ここで、この R 基はアセテート置換基（例えば、 $-NH-CO-CH_3$ ）および非置換アミノ基（例えば $-NH_2$ ）の混合物であり、ただし、これらの基の 50%はアセテートに置換される。この R 基の全てがアミノ基である（いずれもがアセテート置換されていない）場合、この多糖類はまた、ホモ置換され得る。

【0017】

本発明のいくつかの実施形態では、この単離された多糖類はキャリアー化合物と結合体化され得る。このキャリアー化合物はリンカーを通してこの多糖類と結合体化され得る。このキャリアー化合物はペプチドキャリアー化合物であり得るが、しかし、このキャリアー化合物はそれに限定されない。

40

【0018】

これらのおよび他の実施形態では、この単離された多糖類を含む組成物は、薬学的に受容可能なキャリアーをさらに含み得る。

【0019】

いくつかの実施形態では、この組成物は、少なくとも 90%純粋、少なくとも 95%純粋、少なくとも 97%純粋または少なくとも 99%純粋である（すなわち、この組成物において存在するこの多糖類の、少なくとも 90%、少なくとも 95%、少なくとも 97%または少なくとも 99%が dPNA G である）。なお他の実施形態では、この組成物は、リン酸塩またはテイコ酸を実質的に含まない。好ましくは、この組成物は、グルコサミン

50


のアミノ (R) 基において 50 % より多くのアセテート置換、75 % より多くのアセテート置換、90 % より多くのアセテート置換を有する多糖類を実質的に含まない。

【 0020 】

いくつかの実施形態では、この多糖類は次以下の構造からなる。

【 0021 】

【 化 5 】



10

20

【 0022 】

ここで、X1、X2、X3、X4、X5およびX6の各々は、H、キャリアー化合物またはキャリアー化合物に結合するリンカーのいずれかであり；およびY1、Y2およびY3の各々は、OH、キャリアー化合物またはキャリアー化合物に結合するリンカーのいずれかである。いくつかの実施形態では、キャリアー化合物またはキャリアー化合物に結合するリンカーのうち一つのみが、この構造と結合体化される。他の実施形態では、X1、X2、X3、X4、X5またはX6の一つのみが、キャリアー化合物またはキャリアー化合物に結合するリンカーと結合体化される。なおさらなる他の実施形態では、Y1、Y2またはY3の一つのみが、キャリアー化合物またはキャリアー化合物と結合するリンカーと結合体化される。なおさらなる他の実施形態では、キャリアー化合物またはキャリアー化合物に結合するリンカーのうち一つのみが、このX1、X2、X3、X4、X5、X6、Y1、Y2またはY3の位置のうちの一つにおいて結合体化する。このキャリアー化合物は多糖類であり得る。他の実施形態では、このキャリアー分子は、他の多糖類、ペプチドなどのような一つ以上のキャリアー化合物に、必要に応じて、直接またはリンカーを介して置換された多糖類である。いくつかの実施形態では、このキャリアー多糖類は、N - アセチル - ベータ (β) 1 - 6 グルコサミンではない。Xがキャリアー化合物またはキャリアー化合物と結合しているリンカーである、本発明のいくつかの局面では、nは、2、3、4またはそれより大きくあり得る。

30

40

【 0023 】

本発明は、本発明の多糖類のいずれかを含む、薬学的組成物を提供する。この組成物は、ワクチンとして使用され得る。これらの組成物は、抗原特異的免疫応答のような免疫応答を刺激する有効な量でこの多糖類を含む。このワクチン組成物が、薬学的に受容可能なキャリアーおよび/またはアジュバントをさらに含み得る。この薬学的組成物は、キャリアー化合物と、直接またはリンカーを介してのいずれかで、結合体化された多糖類を含み得る。

【 0024 】

本発明の他の局面は、本発明のこの多糖類を作製するための方法を提供する。これらの方法は以下に記載される。

【 0025 】

50

一つの局面では、本発明は以下に示す方法によって調製される、単離された多糖類を提供する：濃縮された細菌の細胞体調製物から多糖類粗調製物をエタノール沈澱する工程；この粗多糖類をリゾチームおよびリソスタフィンを用いて同時に消化し、次いで、ヌクレアーゼおよびプロテイナーゼKを連続して用いて消化して、消化された多糖類調製物を形成させる工程；この消化された多糖類調製物をサイズ分画する工程；アセチル化多糖類の画分を単離する工程；このアセチル化多糖類を脱アセチル化して、脱アセチル化多糖類（すなわち、50%未満のアセテート置換を有する多糖類）を産生する工程。

【0026】

別の局面では、本発明はまた、以下の方法によって調製される、多糖類を含む多糖類抗原を提供する：細菌培養物から純粋でない多糖類を調製する工程；この純粋でない多糖類を酸または塩基とともにインキュベートさせて、半純粋な多糖類を産生する工程；この調製物を中和する工程；この中和された調製物をフッ化水素酸中でインキュベートさせる工程。一つの実施形態では、この方法はさらに、この調製物からアセチル化多糖類を単離する工程、およびこのアセチル化多糖類を脱アセチル化して、脱アセチル化多糖類を産生する工程を含む。一つの実施形態では、このアセチル化多糖類は、50%未満である所望の程度にまで、化学的に脱アセチル化される。別の実施形態では、このアセチル化多糖類は、50%未満である所望の程度にまで、塩基性溶液とともにインキュベートされることにより、脱アセチル化される。なお別の実施形態では、このアセチル化多糖類は酵素学的に、脱アセチル化される。

10

【0027】

様々な実施形態は、上記の方法に適用される。これらのさらなる実施形態のいくつかは、以下に記載される。この細菌培養物は、コアグラゼ陰性 *Staphylococcus* 培養物またはコアグラゼ陽性 *Staphylococcus* 培養物であり得る。この細菌培養物は、*Staphylococcus aureus* 培養物または *Staphylococcus epidermidis* 培養物であり得る。別の実施形態では、多糖類調製物は、カラムを用いてサイズ分画される。

20

【0028】

本発明の多糖類の調製物の例は、以下の通りである：細菌培養物は、強塩基および強酸とともにインキュベートされて、酸または塩基性溶液が作製される。次いでこの酸溶液および塩基性溶液は、pH 2 に中和されて、抗原粗懸濁液が生産される。この抗原粗懸濁液は、脱イオン化水のような溶液に対して透析され、そして不溶性粗抗原が収集される。この不溶性粗抗原は、凍結乾燥され得、次いで緩衝液中で再懸濁され得る。この緩衝液は 50 mM PBS および 100 mM Tris からなる群より選択され得、150 mM NaCl を伴う。上記強塩基または強酸は、1 N NaOH または 1 M HCl より強くあり得る。いくつかの実施形態では、この強塩基および強酸は、5 N NaOH または 5 M HCl である。別の実施形態では、細菌培養抽出物は、18 ~ 24 時間にわたり強塩基または強酸中で攪拌される。この強塩基または強酸の抽出はくりかえされ得る。この方法は、抗原調製物を処理して、アセテート置換の所望の程度に到達するまでアミノ結合化アセテート基を除去して、脱アセチル化 PNG を産生する工程をさらに含む。脱アセチル化は、化学的にまたは酵素学的のいずれかで行われ得る。例えば、この抗原調製物は、1 . 0 N NaOH 中で、2 ~ 20 時間にわたり 37 でインキュベートされ得る。このインキュベーションはまた、より長い時間またはより高い温度でより弱い塩基中で、またはより短い時間もしくはより低い温度でより強い塩基中で行われ得る。

30

40

【0029】

あるいは、上記の方法は、さらなる脱アセチル化の必要なしに、50%未満のアセテート置換を有する調製物から単離された画分を代わりに含み得る。

【0030】

なお別の局面では、本発明は、薬学的組成物を作製するための方法を提供する。一つの実施形態では、この多糖類は、薬学的に受容可能なキャリアーおよび/またはアジュバントと合わされる。別の実施形態では、この多糖類は、直接またはリンカーを介してのいず

50

れかで、キャリアー化合物と結合体化され、次いで必要に応じて薬学的に受容可能なキャリアーおよび/またはアジュバントと合わされる。

【0031】

本明細書に記載の脱アセチル化多糖類(すなわちdPNAG)は、のいずれもは本発明の薬学的または予防方法において使用され得る。

【0032】

別の局面では、本発明は、被験体、好ましくは非げっ歯類被験体における、*Staphylococcus* 感染を予防するための方法を提供する。本発明は、本発明の任意の多糖類を、*Staphylococcus* に対する免疫応答を誘導するための有効な量で、それを必要とする被験体を、投与する工程を含む。いくつかの実施形態では、*Staphylococcus* は *Staphylococcus aureus* であり、および他の実施形態では、*Staphylococcus* は *Staphylococcus epidermidis* である。

10

【0033】

この被験体は、*Staphylococcus* 感染され得る任意の被験体であり、および好ましくはげっ歯類ではない。いくつかの実施形態では、この被験体、ヒトの被験体であり、そして他の実施形態では、この被験体は、霊長類、ウマ、ウシ、ブタ、ヤギ、ヒツジ、イヌまたはネコである。

【0034】

いくつかの実施形態では、この被験体は、*Staphylococcus* にさらされる危険状態にあり、そして他の実施形態では、この被験体は *Staphylococcus* にさらされた被験体である。いくつかの実施形態では、この被験体は、60歳を超えるヒトである。この被験体は、健康な被験体であり得る。いくつかの実施形態では、この被験体は、医療デバイス移植体を受けていない。

20

【0035】

好ましくは、この多糖類は、本明細書において記載されているかまたは当該分野において公知であるように、ワクチンとして処方される。関連する実施形態では、この多糖類は、アジュバントとともに投与される。他の実施形態では、この多糖類は、被験体に全身投与される。この抗原は、キャリアー化合物と結合体化され得る。いくつかの実施形態では、このキャリアー化合物は、ペプチド化合物であるが、これに限定されない。

30

【0036】

別の局面では、本発明は、被験体における *Staphylococcus* 感染に対する能動免疫を誘導するための方法を提供する。この方法は、*Staphylococcus* 感染に対する能動免疫を誘導するための有効な量の、任意の上記の多糖類を含む組成物を、被験体に投与する段階を含む。一つの実施形態では、この方法は、*Staphylococcus aureus* による感染に対する免疫を誘導するための方法である。別の実施形態では、この方法は、*Staphylococcus epidermidis* による感染に対する免疫を誘導するための方法である。

【0037】

本発明の別の局面によって、ポリクローナル抗体またはモノクローナル抗体を産生するための方法は提供される。この方法は、*Staphylococcus* に対して特異的な抗体を産生するために有効な量の、アジュバントおよび本発明の任意の多糖類を、被験体に投与する工程、およびこの被験体から抗体を単離する工程を含む。本発明のこれらおよび他の局面では、この多糖類は抗原として使用される。一つの実施形態では、この被験体は、ヒトであり、他方、他の実施形態ではこの被験体は、ウサギ、マウスまたはラットのような非ヒト被験体である。この方法は、この抗体を精製する工程をさらに含み得る。

40

【0038】

別の局面では、本発明は、モノクローナル抗体を産生するための方法を提供する。この方法は、*Staphylococcus* に対して特異的な抗体を産生するのに有効な量の本発明の単離された多糖類およびアジュバントを被験体に投与する工程、この被験体から

50

脾臓細胞を採取する工程、この被験体からの脾臓細胞と骨髓腫細胞とを融合する工程、ならびに融合サブクローンから抗体産生物を採取する工程を包含する。

【0039】

本発明のなお別の局面によって、本発明の多糖類に対して特異的なモノクローナル抗体を同定する方法が提供される。この方法は、非ヒト被験体における抗原に対する免疫応答を誘導する工程、この被験体から抗体産生細胞を単離する工程、抗体産生細胞から不死化細胞を産生する工程、および本発明の多糖類を用いて、この不死化細胞がこのモノクローナル抗体を産生する能力を試験する工程を含む。一つの実施形態では、この方法はまた、この不死化細胞の上清からモノクローナル抗体を単離する工程を含む。

【0040】

本発明は、本発明の単離された多糖類に選択的に結合する、単離された結合因子を含む組成物をさらに提供する。一つの実施形態では、この単離された結合因子はペプチドである。このペプチドは、抗体、またはそのフラグメントであり得る。この抗体は、ポリクローナル抗体であり得る。この抗体は、ヒトの抗体またはキメラ抗体であり得る。いくつかの重要な実施形態では、この抗体はヒトの抗体である。いくつかの実施形態では、この単離された結合因子は、d P N A G に特異的に結合する。他の実施形態では、この単離された結合因子は、d P N A G および d N A G の高いアセチル化形態の両方と結合する。

【0041】

いくつかの実施形態によって、この単離された結合因子は、検出可能標識と結合体化される。この検出可能標識は、放射性標識、酵素、ビオチン分子、アビジン分子または蛍光色素からなる群より選択され得る。この単離された結合因子は、抗生物質のような殺菌剤と結合体化され得る。

【0042】

本発明の別の局面によって、被験体において *Staphylococcus* 感染に対する能動免疫を誘導する方法が提供される。この感染は、*Staphylococcus aureus* 感染または *Staphylococcus epidermis* 感染であり得るが、これに限定されない。この方法は、d P N A G と結合する上記の抗体のひとつの、*Staphylococcus* のオプソニン化を誘導するのに有効な量を、被験体に投与する工程を含む。

【0043】

Staphylococcus 感染の予防を意図された上記の方法は、そのような感染の発生の危険状態にある被験体に対して行われ得る。これらの方法は、同様に、*Staphylococcus* 感染を有する被験体の処置に適用され得る。本発明の予防および治療方法は、天然 P N A G を発現する細菌種からの感染を有するか、または感染する危険状態にある被験体において使用され得る。

【0044】

さらなる局面では、本発明は、*Staphylococcus* 感染を有する被験体を処置するための方法を提供する。その方法は、本発明の単離された多糖類と結合する、単離された結合因子を、*Staphylococcus* 感染を阻害するのに有効な量で被験体に投与する工程を含む。重要な実施形態では、この結合因子は、P N A G の高いアセチル化形態および d P N A G と結合する。

【0045】

一つの実施形態では、この *Staphylococcus* 感染は、*Staphylococcus epidermidis* 感染および *Staphylococcus aureus* 感染からなる群より選択される。別の実施形態では、この単離された結合因子は、抗生物質のような殺菌剤と結合体化される。

【0046】

本発明の別の局面では、多糖類が被験体において *Staphylococcus* 感染から保護する能力を評価するための方法を提供する。この方法は、この多糖類の有効な量を、被験体に投与する工程（ここで、この多糖類は、能動免疫を誘導する）、この被験体に

10

20

30

40

50

Staphylococcus をさらす工程、およびこの被験体における *Staphylococcus* の存在について試験する工程を包含する。

【0047】

なお別の局面では、本発明は、サンプルにおける d P N A G の存在を同定する方法を提供する。その方法は、サンプルを、d P N A G と結合する単離された結合因子と接触させる工程、および単離された結合因子のこのサンプルへの結合を検出する工程を含む。単離された結合因子のこのサンプルへの結合は、このサンプルにおける d P N A G の存在を示す。この結合因子がまた P N A G にも結合する場合、この方法はまたこのサンプルにおける P N A G の存在を検出するために使われ得る。一つの実施形態では、このサンプルは、被験体から得られる生物学的サンプルである。この生物学的サンプルは、尿、血、膿、皮膚、痰、関節液、リンパおよび乳汁からなる群より選択され得る。一つの実施形態では、この単離された結合因子は、本明細書に記載の検出可能標識のような検出可能標識と結合体化される。サンプルはまた、移植可能な医療デバイスまたは移植された医療デバイスのスワブから得られ得る。

10

【0048】

本発明の限定の各々は、本発明の様々な実施形態を包含し得る。それゆえ、任意の一つの要素、または要素の結合を含む、本発明の限定の各々は、本発明の各々の局面に含まれ得ることが予想される。

例えば、本願発明は以下の項目を提供する。

20

(項目1)

少なくとも4つの単量体単位の長さを有する β - 1, 6 - グルコサミンポリマーを含む単離された多糖類を含む組成物であって、ここで、グルコサミンのアミノ基の50%未満がアセテートに置換され、かつ、該組成物は滅菌されている、組成物。

(項目2)


少なくとも2つの単量体単位の長さを有し、かつ、キャリアー化合物と結合した β - 1, 6 - グルコサミンポリマーを含む単離された多糖類を含む組成物であって、ここで、該多糖類のグルコサミンのアミノ基の50%未満がアセテートに置換されている、組成物。

(項目3)

前記単離された多糖類は、次の構造を有し、

30

【化1】



40

ここで、 n は少なくとも4である整数であり、 R は $-NH-CO-CH_3$ および $-NH_2$ からなる群より選択され、ただし、 R 基の50%未満は $-NH-CO-CH_3$ であり、かつ、該多糖類は少なくとも800ダルトンの分子量を有する、項目1または2に記載の組成物。

(項目4)

50

前記 R 基の 45 % 未満、40 % 未満、35 % 未満、30 % 未満、25 % 未満、20 % 未満、15 % 未満、10 % 未満、または 5 % 未満が $-NH-CO-CH_3$ である、項目 3 に記載の組成物。

(項目 5)

前記 R 基のいずれも $-NH-CO-CH_3$ ではない、項目 3 に記載の組成物。

(項目 6)

n が少なくとも 6、少なくとも 10、少なくとも 20、少なくとも 50、少なくとも 100、少なくとも 200、少なくとも 300、少なくとも 400 および少なくとも 500 からなる群より選択された整数である、項目 3 に記載の組成物。

(項目 7)

前記単離された多糖類が、ヘテロに置換されたポリマーである、項目 1 または 2 に記載の組成物。

(項目 8)

前記単離された多糖類が、少なくとも 800 ダルトンの分子量を有する、項目 1 または 2 に記載の組成物。

(項目 9)

前記単離された多糖類が、少なくとも 1000 ダルトン、少なくとも 1200 ダルトン、少なくとも 1500 ダルトン、少なくとも 2000 ダルトン、少なくとも 2500 ダルトン、少なくとも 5000 ダルトン、少なくとも 7500 ダルトン、少なくとも 10,000 ダルトン、少なくとも 25,000 ダルトン、少なくとも 50,000 ダルトン、少なくとも 75,000 ダルトンおよび少なくとも 100,000 ダルトンからなる群より選択された分子量を有する、項目 1 または 2 に記載の組成物。

(項目 10)

前記単離された多糖類が、少なくとも 125,000 ダルトン、少なくとも 150,000 ダルトン、少なくとも 200,000 ダルトン、少なくとも 250,000 ダルトン、少なくとも 300,000 ダルトン、少なくとも 350,000 ダルトン、少なくとも 400,000 ダルトン、少なくとも 450,000 ダルトンおよび少なくとも 500,000 ダルトンからなる群より選択された分子量を有する、項目 1 または 2 に記載の組成物。

(項目 11)

β -1,6-グルコサミンポリマーの長さが、少なくとも 6、少なくとも 10、少なくとも 20、少なくとも 50、少なくとも 100、少なくとも 200、少なくとも 300、少なくとも 400、少なくとも 500 の単量体単位からなる群より選択される、項目 1 または 2 に記載の組成物。

(項目 12)

グルコサミンのアミノ基の 40 % 未満、35 % 未満、30 % 未満、25 % 未満、20 % 未満、15 % 未満、10 % 未満または 5 % 未満がアセテートに置換されている、項目 1 または 2 に記載の組成物。

(項目 13)

前記グルコサミンのアミノ基のいずれもアセテートに置換されていない、項目 1 または 2 に記載の組成物。

(項目 14)

前記組成物は、少なくとも 90 % 純粋、少なくとも 95 % 純粋、少なくとも 97 % 純粋および少なくとも 99 % 純粋からなる群より選択される純度を有する、項目 1 または 2 に記載の組成物。

(項目 15)

前記単離された多糖類がキャリアーと結合体化している、項目 1 に記載の組成物。

(項目 16)

前記単離された多糖類が、リンカーを介して前記キャリアー化合物と結合体化している、項目 1 または 15 に記載の組成物。

10

20

30

40

50

(項目 17)

前記キャリアー化合物が、ペプチドキャリアーである、項目 1 または 15 に記載の組成物。

(項目 18)

薬学的に受容可能なキャリアーをさらに含む、項目 1 または 2 に記載の組成物。

(項目 19)

前記組成物が滅菌されている、項目 2 に記載の組成物。


(項目 20)

前記単離された多糖類はワクチンとして処方される、項目 1 または 2 に記載の組成物。

(項目 21)

前記単離された多糖類は、次に示す構造

【化 2】



からなり、ここで、X1、X2、X3、X4、X5 および X6 の各々は、H、キャリアー化合物、またはキャリアー化合物と結合したリンカーのいずれかであり；ならびに、Y1、Y2 および Y3 の各々は、OH、キャリアー化合物、またはキャリアー化合物と結合したリンカーのいずれかである、項目 1 または 2 に記載の組成物。

(項目 22)

キャリアー化合物、またはキャリアー化合物と結合したリンカーのうちの一つだけが、前記構造と結合体化している、項目 21 に記載の組成物。

(項目 23)

X1、X2、X3、X4、X5 または X6 のうちの一つだけが、キャリアー化合物またはキャリアー化合物と結合したリンカーと結合体化している、項目 22 に記載の組成物。

(項目 24)

Y1、Y2 または Y3 のうちの一つだけが、キャリアー化合物またはキャリアー化合物と結合したリンカーと結合体化している、項目 21 に記載の組成物。

(項目 25)

前記キャリアー化合物が、N - アセチル β 1 - 6 グルコサミンではない多糖類である、項目 22 に記載の組成物。

(項目 26)

濃縮された細菌の細胞体調製物から、多糖類の粗調製物をエタノール沈澱させる工程；該粗多糖類をリゾチームおよびリソスタフィンを用いて同時に消化し、次にヌクレアーゼおよびプロテイナーゼ K を用いて連続して消化して、消化された多糖類調製物を形成させる工程；

該消化された多糖類調製物をサイズ分画する工程；

アセチル化多糖類の画分を単離する工程；および

10

20

30

40

50

該アセチル化多糖類の画分を脱アセチル化して、５０％未満のアセート置換を有する多糖類を生産する工程；

を包含する、項目１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２または１３に記載の単離された細菌性多糖類を作製する方法。

（項目２７）

細菌培養物から純物でない多糖類を調製する工程；

該純粋でない多糖類を酸または塩基とともにインキュベートさせて、半純粋の多糖類調製物を生産する工程；

該調製物を中和する工程；

中和された該調製物をフッ化水素酸中でインキュベートさせる工程；

該調製物からアセチル化多糖類を単離させる工程；および

該アセチル化多糖類を脱アセチル化して、５０％未満のアセート置換を有する多糖類を生産する工程；

を包含する、項目１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２または１３に記載の単離された細菌性の多糖類を作製する方法。

（項目２８）

細菌培養物から純粋でない多糖類を調製する工程；

該純粋でない多糖類を酸または塩基とともにインキュベートとさせて、半純粋の多糖類調製物を生産する工程；

該調製物を中和する工程；

中和された該調製物をフッ化水素酸中でインキュベートさせる工程；および

該調製物から５０％未満のアセート置換を有する多糖類を単離する工程；

を包含する、項目１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２または１３に記載の単離された細菌性多糖類を作製する方法。

（項目２９）

前記細菌培養物が、コアグラゼ陰性 *staphylococcus* 培養物である、請求項２６、２７または２８に記載の方法。

（項目３０）

前記細菌培養物が、*staphylococcus aureus* 培養物、または *staphylococcus epidermidis* 培養物である、項目２６、２７または２８に記載の方法。

（項目３１）

前記単離された多糖類が、少なくとも１０００ダルトン、少なくとも１２００ダルトン、少なくとも１５００ダルトン、少なくとも２０００ダルトン、少なくとも２５００ダルトン、少なくとも５０００ダルトン、少なくとも７５００ダルトン、少なくとも１０，０００ダルトン、少なくとも２５，０００ダルトン、少なくとも５０，０００ダルトン、少なくとも７５，０００ダルトンおよび少なくとも１００，０００ダルトンからなる群より選択された分子量を有する、項目２６、２７または２８に記載の方法。

（項目３２）

前記単離された多糖類が、少なくとも１２５，０００ダルトン、少なくとも１５０，０００ダルトン、少なくとも２００，０００ダルトン、少なくとも２５０，０００ダルトン、少なくとも３００，０００ダルトン、少なくとも３５０，０００ダルトン、少なくとも４００，０００ダルトン、少なくとも４５０，０００ダルトンおよび少なくとも５００，０００ダルトンからなる群より選択された分子量を有する、項目２６、２７または２８に記載の方法。

（項目３３）

前記単離された多糖類が、少なくとも９０％純粋、少なくとも９５％純粋、少なくとも９７％純粋および少なくとも９９％純粋からなる群より選択された純度を有する、項目２６、２７または２８に記載の方法。

（項目３４）

前記単離された多糖類と、少なくとも一つのキャリアー化合物とを結合体化させる工程を包含する、項目 26、27 または 28 に記載の方法。

(項目 35)

前記キャリアー化合物が、リンカーを介して前記単離された多糖類と結合体化される、項目 34 に記載の方法。

(項目 36)

前記キャリアー化合物がペプチドキャリアーである、項目 34 に記載の方法。

(項目 37)

前記アセチル化多糖類が化学的に脱アセチル化される、項目 26 または 27 に記載の方法。

10

(項目 38)

前記アセチル化多糖類が、塩基性溶液とのインキュベーションにより脱アセチル化される、項目 37 に記載の方法。

(項目 39)

前記アセチル化多糖類が、酵素学的に脱アセチル化される、項目 26 または 27 に記載の方法。

(項目 40)

前記多糖類調製物が、カラムを用いてサイズ分画される、項目 26 に記載の方法。

(項目 41)

前記単離された多糖類を、ワクチンとして処方する工程をさらに包含する、項目 26、27 または 28 に記載の方法。

20

(項目 42)

薬学的に受容可能なキャリアーの中に、免疫応答を刺激するために有効な量で、項目 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、21、22、23、24 または 25 に記載の単離された多糖類を含む薬学的組成物。

(項目 43)

アジュバントをさらに含む、項目 42 に記載の薬学的組成物。

(項目 44)

前記免疫応答が抗原特異的免疫応答である、項目 42 に記載の薬学的組成物。

(項目 45)

30

項目 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、21、22、23、24 または 25 のいずれか一項に記載の単離された多糖類の、*Staphylococcus* に対する免疫応答を誘導するために有効な量を、*Staphylococcus* 感染を有するか、または発生する危険状態にある、非げっ歯類被験体に投与する工程を包含する、非げっ歯類被験体における *Staphylococcus* 感染を処置、または予防するための方法。

(項目 46)

前記 *Staphylococcus* は *Staphylococcus aureus* である、項目 45 に記載の方法。

(項目 47)

40

前記 *Staphylococcus* は、*Staphylococcus epidermidis* である、項目 45 に記載の方法。

(項目 48)

前記非げっ歯類被験体が、ヒト被験体である、項目 45 に記載の方法。

(項目 49)

前記非げっ歯類被験体が、霊長類、ウマ、ウシ、ブタ、ヤギ、ヒツジ、イヌおよびネコからなる群より選択される、項目 45 に記載の方法。

(項目 50)

前記非げっ歯類被験体が *Staphylococcus* にさらされる危険状態にある、項目 45 に記載の方法。

50

(項目 5 1)

前記非げっ歯類被験体が *Staphylococcus* にさらされた被験体である、請求項 4 5 に記載の方法。

(項目 5 2)

前記単離された多糖類が、アジュバントと結合体化されて投与される、項目 4 5 に記載の方法。

(項目 5 3)


前記単離された多糖類がワクチンとして処方される、項目 4 5 に記載の方法。

(項目 5 4)

前記単離された多糖類は

10

【化 3】



20

の構造を有し、ここで、 n は少なくとも 4 であり、 R は $-NH-CO-CH_3$ および $-NH_2$ からなる群より選択され、ただし該 R 基の 50% 未満が $-NH-CO-CH_3$ である項目 4 5 に記載の方法。

(項目 5 5)

前記被験体が医療デバイスの移植体を受けていない被験体である、項目 5 4 に記載の方法。

30

(項目 5 6)

前記多糖類が全身に投与される、項目 4 5 に記載の方法。

(項目 5 7)

前記単離された多糖類がアジュバントとともに投与される、項目 4 5 に記載の方法。

(項目 5 8)

前記単離された多糖類がキャリアー化合物と結合体化される、項目 4 5 に記載の方法。

(項目 5 9)

前記キャリアー化合物がペプチドキャリアーである、項目 5 8 に記載の方法。

(項目 6 0)

項目 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、21、22、23、24 または 25 に記載の単離された多糖類の、*Staphylococcus* に対して特異的な抗体を生産するための有効な量およびアジュバントを、被験体に投与する工程；および
該被験体から抗体を単離する工程；
を包含する、抗体を生産するための方法。

40

(項目 6 1)

項目 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、21、22、23、24 または 25 に記載の単離された多糖類の、*Staphylococcus* に対して特異的な抗体を生産するために有効な量およびアジュバントを、被

50

験体に投与する工程；

該被験体から脾臓細胞を採取する工程；

該被験体からの脾臓細胞と骨髓種細胞とを融合する工程；および

融合サブクローンから生産された抗体を採取する工程；

を包含する、モノクローナル抗体を生産するための方法。

(項目62)

項目1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、21、22、23、24または25に記載の単離された多糖類およびアジュバントを、被験体へ投与することによって、前記細菌性多糖類に対する免疫応答を刺激する工程；および

10

該被験体から抗体を採取する工程；

を包含する、細菌性多糖類に対するポリクローナル抗体を生産する方法。

(項目63)

前記抗体を単離する工程をさらに含む、項目62に記載の方法。

(項目64)

前記被験体がウサギである、項目62に記載の方法。

(項目65)

前記被験体がヒトである、項目62に記載の方法。

(項目66)

前記多糖類に対する免疫応答を誘導する工程；

20

該被験体から抗体産生細胞を単離する工程；

該抗体産生細胞から不死化細胞を生産する工程；および

項目1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、21、22、23、24または25に記載の単離された多糖類を用いて、該不死化細胞がモノクローナル抗体を生産する能力を試験する工程；
を包含する、非ヒト被験体における多糖類に対して特異的なモノクローナル抗体を同定する方法。

(項目67)

前記不死化細胞の上清からモノクローナル抗体を単離する工程をさらに包含する、請求項66に記載の方法。

30

(項目68)

項目1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、21、22、23、24または25に記載の単離された多糖類と結合する、単離された結合因子を含む組成物。

(項目69)

前記単離された結合因子がペプチドである、項目68に記載の組成物。

(項目70)

前記ペプチドが抗体、またはそのフラグメントである、項目69に記載の組成物。

(項目71)

前記抗体がポリクローナル抗体である、項目70に記載の組成物。

40

(項目72)

前記抗体がヒト抗体、またはキメラの抗体である、項目71に記載の組成物。

(項目73)

前記抗体がヒト抗体である、項目71に記載の組成物。

(項目74)

前記単離された結合因子が検出可能標識と結合体化される、項目68に記載の組成物。

(項目75)

前記検出可能標識が、放射性標識、酵素、ビオチン分子、アビジン分子および蛍光色素からなる群より選択される、項目74に記載の組成物。

(項目76)

50

前記単離された結合因子が殺菌剤と結合体化されている、項目 6 8 に記載の組成物。

(項目 7 7)

前記殺菌剤が抗生物質である、項目 7 6 に記載の組成物。

(項目 7 8)

サンプルを、項目 6 8 に記載の単離された結合因子と接触させる工程；および該単離された結合因子と該サンプルとの結合を検出する工程を包含し、ここで、該単離された結合因子の結合は、該細菌性多糖類が該サンプル中に存在することを示す、50%未満のアセテート置換を有する細菌性多糖類がサンプル中に存在することを同定する方法。(項目 7 9)

前記サンプルが被験体からの生物学的サンプルである、項目 7 8 に記載の方法。

10

(項目 8 0)

前記生物学的サンプルが、尿、血、膿、肌、痰、関節液、リンパおよび乳汁からなる群より選択される、項目 7 8 に記載の方法。

(項目 8 1)

前記単離された結合因子が検出可能標識と結合体化される、項目 7 8 に記載の方法。

(項目 8 2)

Staphylococcus 感染を阻害するための有効な量で、項目 6 8 に記載の単離された結合因子を、それを必要とする被験体に、投与する工程を包含する、*Staphylococcus* 感染を有するか、または発生する危険状態にある被験体を処置するための方法。

20

(項目 8 3)

Staphylococcus 感染が、*Staphylococcus epidermidis* 感染および *Staphylococcus aureus* 感染からなる群より選択される、項目 8 2 に記載の方法。

(項目 8 4)

前記単離された結合因子が殺菌剤と結合体化される、項目 8 2 に記載の方法。

(項目 8 5)

前記殺菌剤が抗生物質である、項目 8 2 に記載の方法。

【0049】

(配列表の簡単な説明)

30

配列番号 1 は、*S. aureus* からの *ica* 遺伝子座のヌクレオチド配列であり、それは、GenBank において受託番号 AF086783 として寄託された。

【図面の簡単な説明】

【0050】

【図 1】図 1 は、天然 PNA G に対する抗体の結合を示す。この抗体は、ジフテリアトキソイドと結合体化された天然 PNA G に対して惹起された。

【図 2】図 2 は、脱アセチル化 PNA G に対する抗体の結合を示す。この抗体は、ジフテリアトキソイドと結合体化された dPNA G に対して惹起された。

【図 3】図 3 は、ジフテリアトキソイド (DTm) と結合体化された天然 PNA G を用いて、一週間おきに、3 回皮下に免疫したマウス (1 グループにつき 10 匹) において得られる抗体力価を示す。動物は、凡例で示される投与量で、免疫された。血液サンプルは、最終免疫化後、1 ~ 4 週、毎週得られた。

40

【図 4】図 4 は、ジフテリアトキソイド (DTm) と結合体化された dPNA G を用いて、一週間おきに、3 回皮下に免疫したマウス (1 グループにつき 10 匹) において得られる抗体力価を示す。動物は、凡例で示される投与量で、免疫された。血液サンプルは、最終免疫化後、1 ~ 4 週、毎週得られた。

【図 5】図 5 は、ジフテリアトキソイドと結合体化される dPNA G を用いて、免疫されたウサギの血清から得られた抗体による、凡例で示された、*Staphylococcus* 菌株のオプソニン性殺傷 (ウサギ 1) を示す。各点は、指示された希釈で殺傷された平均パーセントを示す。

50

【図 6】図 6 は、ジフテリアトキシソイドと結合体化された d P N A G を用いて、免疫されたウサギの血清からの抗体による、凡例で示された、*S t a p h y l o c o c c u s* 菌株のオプソニン性殺傷（ウサギ 2）を示す。各点は、指示された希釈で殺傷された平均パーセントを示す。

【図 7】図 7 は、ジフテリアトキシソイドに結合体化された天然 P N A G を用いて、免疫されたウサギの血清からの抗体による凡例で示された、*S t a p h y l o c o c c u s* 菌株のオプソニン性殺傷（ウサギ 3）を示す。各点は、指示された希釈で殺傷された平均パーセントを示す。

【図 8】図 8 は、ジフテリアトキシソイドに結合体化された天然 P N A G を用いて、免疫されたウサギの血清からの抗体によって、凡例で示された、*S t a p h y l o c o c c u s* 菌株のオプソニン性殺傷（ウサギ 4）を示す。各点は、指示された希釈で殺傷された平均パーセントを示す。

【図 9】図 9 は、X 軸上で示された *S t a p h y l o c o c c u s* 菌株に対する、4 匹のウサギの血清から得られた抗体の、オプソニン性殺傷力価をまとめる。このウサギは、上記の図の凡例で記載されている通りである。各バーは、この細菌の 40 % 以上が殺傷された血清希釈の対数を示す。10 より下のバーは、1 : 10 の血清希釈では、細菌の 40 % を殺傷できない血清を示す。

【発明を実施するための形態】

【0051】

（発明の詳細な説明）

本発明は、*S t a p h y l o c o c c u s* 細菌から得られる多糖類の抗体に関する。これらの抗体は、細菌感染に対する免疫を誘導するために、ならびに診断目的および治療目的のための抗体を産生するために有用である。

【0052】

本発明は、乏しくアセチル化されている（すなわち脱アセチル化された）ポリ - N - アセチルグルコサミン（P N A G）（本明細書では d P N A G と称する）が、高度に免疫原性であり、従って、インビボで保護性免疫応答を刺激するための適切なワクチン候補に相当するという発見に部分的に基づく。脱アセチル化 P N A G は、アミノ基の 50 % 未満がアセテート置換されている P N A G である。いくつかの好ましい実施形態では、35 % 以下のアセテート置換が存在し、他方、他の実施形態では、15 % 以下のアセテート置換が存在する。本発明によって、d P N A G は、天然 P N A G よりも、オプソニンの保護性抗体をより良好に惹起できることがさらに発見された。「天然」P N A G とは、0 ~ 100 % に及ぶアセチル化レベルの範囲内の、天然存在する P N A G の混合物が自然に生じることをいう。従って P N A G は、本明細書に記載の脱アセチル化方法を用いて、天然 P N A G から得られ得る。d P N A G に対して調製される抗体は、*S . a u r e u s* および *S . e p i d e r m i d i s* のような *S t a p h y l o c o c c u s* に対して有効である。従って、本発明によって、アセチル化の程度が、インビボでの抗体投与において誘導される免疫応答のレベルに影響することが発見された。d P N A G 投与の後に惹起される抗体は、d P N A G を認識し、および重要な実施形態ではまた、P N A G の高いアセチル化形態を認識する。

【0053】

本発明は、単離された d P N A G の組成物、単離する方法、およびいくつかの例では d P N A G を精製する方法、ならびに、インビボでの治療方法、予防方法および診断方法を含む、使用方法を提供する。本明細書で使用される場合、この d P N A G は、d P N A G 抗原として称され得る。後者の用語は、交換可能であることを意図される。本発明はまた、ワクチンとして使用され得る d P N A G の薬学的組成物を提供する。

【0054】

いくつかの局面では、d P N A G は、次の構造を有する。

【0055】


10

20

30

40

【化 6】



10

【0056】

ここで、 n は2から300以上に及ぶ整数であり、 R は $-\text{NH}-\text{CO}-\text{CH}_3$ および $-\text{NH}_2$ からなる群より選択される。ただし、 R 基の50%未満は $-\text{NH}-\text{CO}-\text{CH}_3$ である。 dPNA G は、ベータ(β)1-6結合を有する(すなわち dPNA G は、ベータ(β)1-6結合によってともに結合されているグルコサミン単量体単位で構成される)。

【0057】

dPNA G は、全ての R 基が置換されていない(すなわち、 $R = \text{NH}_2$)である場合、ホモポリマーであり得る。ホモポリマーは、グルコサミン残基の R 基が同一である、 dPNA G である。 dPNA G はまた、 R 基の位置が、 $-\text{NH}_2$ および $-\text{NH}-\text{CO}-\text{CH}_3$ 基の混合物を有するヘテロポリマーであり得る。ただし、 R 基の50%未満がアセテートに置換される。この実施形態によると、 R 基の49%未満、45%未満、40%未満、35%未満、30%未満、25%未満、20%未満、15%未満、10%未満、5%未満または1%未満がアセテートに置換され得る。

20

【0058】

dPNA G のサイズは大いに変動し、そして本明細書に記載のように dPNA G がキャリア化合物と結合体化されるかどうか依存する。いくつかの局面では、 dPNA G 抗原は、少なくとも100,000ダルトンの分子量を有する。他の局面では、 dPNA G 抗原は、2000ダルトン未満の分子量を有する。 PNA G の分子量は、少なくとも200ダルトン、または少なくとも400ダルトン、または少なくとも600ダルトン、または少なくとも800ダルトンであり得る。より低い分子量の dPNA G は、本発明によって、好ましくはキャリア化合物と結合体化される場合に、使用され得る。これらの dPNA G は、2~3単量体単位程度に小さくあり得るが、好ましくは少なくとも4~6単量体単位の長さである。これらに対応する分子量は、約400、約600、約800、約1000および約1200ダルトンである。500から20,000,000ダルトンまでの間の多糖類は、典型的である。

30

【0059】

理解されるように、上記の構造における n の値は、この抗原の分子量に対して影響を与える。 n が300以上の場合は、この構造における最小多糖類の分子量は60,918ダルトンである(300単位 $\times$ 203ダルトン/単位+末端残基における置換基についての18ダルトン)。この抗原が100,000ダルトンの最小分子量を有する場合、この多糖類は、300単位より多くを有するか、またはこの多糖類は、この分子量における違いを創出するキャリア化合物と結合体化されるかのいずれかである。

40

【0060】

本発明は、 dPNA G 抗原の、天然に存在する形態および合成された形態の両方を提供する。本明細書に記載のように、この天然に存在する dPNA G は、天然に存在する供給源に存在する、または天然に存在する供給源から単離され得るか、もしくは天然に存在する供給源に由来し得る dPNA G である。 dPNA G 抗原はまた、単離された形態で提供

50

される。d P N A Gのような単離された多糖類は、通常存在する環境から取り出され、従って分離される。いくつかの例では、単離された多糖類は、構造的にまたは機能的に特徴付けられた他の化合物から充分に分離される。例えば、単離された多糖類は、その化学的組成を決定するために「配列決定され」得る。

【0061】

d P N A Gは、このi c a遺伝子座を有する任意の細菌株から調製され得る。これらの株としては、S . e p i d e r m i sおよびS . a u r e u sが挙げられるが、これらに限定されず、このi c a遺伝子座においてこの遺伝子で形質転換されている他の株（例えばS . c a r n o s u s）も含む。特に、d P N A Gは、S . e p i d e r m i s R P 6 2 A（ATCC番号35984）、S . e p i d e r m i s R P 1 2（ATCC番号35983）、S . e p i d e r m i s M 1 8 7、S . c a r n o s u s T M 3 0 0（p C N 2 7）、S . a u r e u s R N 4 2 2 0（p C N 2 7）およびS . a u r e u s M N 8 ムコイドを含む特定の株から調製され得る。

10

【0062】

一つの方法は、塩基または酸とともに純粋でないP N A Gをインキュベートして、半純粋のP N A G調製物を生産する工程、この調製物を中和する工程、およびさらにこの中和された調製物をさらに処置してd P N A Gを生産する工程を含む。

【0063】

純粋でない天然P N A Gは、細胞および無細胞培養物上清を含む、細菌培養物からの天然P N A G粗調製物を抽出して、このP N A G粗調製物から高い分子量の天然P N A G豊富な材料を単離を生じさせる工程を包含する様々な方法によって調製され得、そしてメタノール、エタノール、アセトンまたはおよび水溶液から多糖類の沈澱を引き起こす能力を有すると当該者に知られている他の任意の有機溶媒のような溶媒を用いて、高い分子量のP N A G豊富な材料を含む純粋でないP N A Gを最初に沈澱することによって得られ得る。この天然P N A G粗調製物を抽出する工程、および純粋でない天然P N A G抗原調製物を単離して、そして沈澱する工程は、米国特許第5,055,455号を含む方法のような、当該分野で知られている任意の方法によって行われる。この純粋でない材料は、精製され、そして脱アセチル化されて、そして本発明のd P N A Gが生産される。

20

【0064】

この精製工程は、リゾチーム、リソスタフィンおよびプロテイナーゼKのような細胞壁破壊因子、ならびにD N AおよびR N Aを消化するD N a s eおよびR N a s eのようなヌクレアーゼ酵素を含む、生物学的材料を消化し得る細菌性酵素とともに、純粋でないP N A Gをインキュベートすることによって達成される。そのあとに、溶液からP N A Gを沈澱させる溶媒を添加する工程、この沈澱を収集する工程およびN a O Hのような塩基、またはH C lのような酸中でP N A Gを再溶解する工程、その次に中和する工程が続く。この中和は、このインキュベーションされる工程が酸で行われた場合は塩基を用いて、またはこのインキュベーションされる工程が塩基で行われた場合は酸を用いて、達成され得る。次いで、この中性材料からの不溶性画分は、例えば、フッ化水素酸中でインキュベーションされて、純粋な天然P N A G抗原を生産すること、またはp Hが4.0より小さい緩衝液中で再溶解され、そのあと分子篩および/またはイオン交換クロマトグラフィーで処理されるような、処理をされる。

30

40

【0065】

別の単離方法は、強塩基または強酸とともにこの細菌をインキュベートさせることによって、細菌培養物からP N A G粗懸濁物を抽出する工程を含む。好ましくは、細菌は、少なくとも2時間、およびより好ましくは少なくとも5時間、10時間、15時間、18時間または24時間、強塩基または強酸中で攪拌される。この強塩基または強酸は、任意のタイプの強塩基または強酸であり得るが、好ましくは少なくとも1 M N a O HまたはH C lの強さを有する。いくつかの実施形態では、この強塩基または強酸は、5 M N a O Hまたは5 M H C lである。次いで、この酸溶液または塩基溶液は、遠心分離されて、細胞体が収集される。いくつかの実施形態では、この抽出手順は、数回繰り返される。生じた酸

50

溶液または塩基溶液は、約 pH 7 に中和され、次いで透析されて、不溶性の純粋でない P N A G が生産される。

【 0 0 6 6 】


d P N A G は、5 0 % よりも多くアセテート置換された天然に存在する多糖類から合成され得る。例えば、この d P N A G 抗原は、化学手段（例えば、塩基処理）、または酵素手段によって、高度なアセチル化グルコサミンポリマーを脱アセチル化することにより合成され得る。

【 0 0 6 7 】

d P N A G 抗原はまた、デノボで合成され得る（例えば、Me l e a n e t a l . Carbohydrate Research, 337: 1893 - 1916, 2002 を参照）。出発材料としては、ポリグルコース（すなわち、デキストラン）、キチンまたはキトサンのようなポリグルコサミン、およびポリグルコサミノウロン酸が挙げられるが、これらに限定されない。ポリグルコサミノウロン酸はまた、本発明の d P N A G 抗原を生産するために使用され得る。様々な置換基を有するポリグルコサミンはまた、この P N A G 抗原を生産するために改変され得る。例えば、多糖類細胞内付着因子（P I A）は、 β - 1 - 6 結合型グルコサミン残基の高度なアセチル化ポリマーである。P I A は次の構造を有する。

【 0 0 6 8 】

【 化 7 】



【 0 0 6 9 】

イミン部分（C - N H）を含むこれらの多糖類に対して、遊離アミノ基は、当業者に公知の通常の化学技術によって形成され得る。一つの適切な方法は、ホウ化水素ナトリウムの使用を含む。このイミン基はホウ化水素ナトリウムを用いて還元され得、遊離アミノ基が生成され得る。これは、2 時間室温で攪拌しながら、5 m g 過剰ホウ化水素を、蒸留水に溶解させた多糖類に加えることによって行われる。次いで、この混合物は水に対して透析され、そして凍結乾燥される。（例えば、Di F a b i o , e t a l . Biochem J . , 1987 15 ; 244 (1) : 27 - 33 を参照）。

【 0 0 7 0 】

本発明は、様々な純度の d P N A G 調製物を提供する。本明細書に記載のように、「純粋な d P N A G 調製物」は、単離されまたは合成されて、そして 9 2 % より多く不純物がない d P N A G 調製物である。これらの不純物は、高度のアセテート置換 P N A G 形態（すなわち、5 0 % より多いアセテート置換体）、ガラクトース、リン酸塩、テイコ酸などを含む。いくつかの実施形態では、d P N A G 組成物は、少なくとも 9 3 %、9 4 %、9 5 %、9 6 %、9 7 %、9 8 %、9 9 % 不純物がない、または 1 0 0 % 不純物がない。

【 0 0 7 1 】

d P N A G 組成物はまた、不純物が「実質的にない」と称され得る。例えば、ガラクトースが実質的にない d P N A G 組成物は、d P N A G を含む調製物の中に、1 0 % 未満、好ましくは 5 % 未満、より好ましくは 1 % 未満のガラクトースの存在を指し示す。

【 0 0 7 2 】

この d P N A G 組成物の純度の程度は、当該分野で公知の任意の手段で評価され得る。例えば、この純度は、ガスクロマトグラフィーおよび核磁気共鳴のような化学的分析アッセイで評価して、この材料の構造的側面を確認し得る。

【0073】

いくつかの d P N A G 調製物の別の主な不純物は、ホスフェートを含むテイコ酸であり得る。このテイコ酸不純物は、本発明の d P N A G 抗原の、化学的特徴付けおよび免疫原性の両方を妨害し得る。本明細書に記載の本発明の方法は、テイコ酸が実質的にない単離された d P N A G 調製物を生産する能力を有する。テイコ酸が実質的にない d P N A G 調製物とは、1.0%未満のホスフェート、より好ましくは0.1%未満のホスフェートを有する d P N A G 調製物である。このサンプル中に存在するホスフェートの量は、当該分野で公知の任意の手段によって評価され得る。ホスフェート不純物の量は、K e l e t i , G . および W . H . L e d e r e r , ((1 9 7 4) H a n d b o o k o f M i c r o m e t h o d s f o r t h e B i o l o g i c a l S c i e n c e s V a n N o s t r a n d R e i n h o l d C o . , N e w Y o r k) に記載の方法を用いて評価され得、これは本明細書により、参考として援用される。手短に言えば、このアッセイは次のように行われる：100 μ g のサンプルに、43.5 ml の水、6.5 ml の70%過塩素酸 (H C l O ₄) および50 ml の20N硫酸 (H ₂ S O ₄) をともに加えて作製された溶液を100 μ l 加える。これは、その上部に大理石を有するチューブの中で、2時間95 で加熱される。次いで、この混合物は、165 にて乾燥機の中に置かれ、そしてさらに2時間加熱され、次いで室温まで冷却される。次に、下に記載の方法で作製された試薬5が1 ml、このサンプルに加えられる：

試薬1：10 ml の水に溶解させた酢酸ナトリウム、3 H ₂ O 1.36 グラム

試薬2：20 ml の水に溶解させたモリブデン酸アンモニウム500 mg

試薬3：2 ml の試薬1、2 ml の試薬2および16 ml の水

試薬4：使用直前に調製される、20 ml の水に溶解させたアスコルビン酸2 mg

試薬5：氷浴中で、試薬3を9 ml および試薬4を1 ml 加える。

【0074】

試薬5を加えたあと、チューブは徹底的に混合され、そしてこの光学密度が分光光度計で820ナノメートルで読まれる。第一リン酸ナトリウム(チューブ1本につき0.1~5 μ g の範囲)からなる検量線を用いて、この試験サンプル中に存在するホスフェートの量を計算する。(L o w r y , O . H . , N . R . R o b e r t s , K . Y . L e i n e r , M . L . W u a n d A . L . F a r r . , (1 9 5 4) , B i o l . C h e m . 2 0 7 , 1 .) 。

【0075】

本発明の組成物は、感染のような病理学的状態のインビトロ、インサイチュおよびインビボでの診断を含む、様々な異なる適用に対して有用である。この組成物を用いて、インビボで被験体を免疫して、感染を予防または処置し得る。この組成物はまた、本発明の d P N A G 組成物と同じ目的のために有用である、抗体および他の結合性ペプチドを発生させるために使用され得る。従って、本発明は、d P N A G または対応する結合因子(例えば、抗体)を含む薬学的組成物を包含する。この薬学的組成物は、それを必要とする被験体に能動免疫または受動免疫のいずれかを誘導させる、ワクチン接種目的のために使用され得る。本発明はまた、d P N A G と結合する抗体のような結合因子を生産するための方法を提供し、この結合因子は S t a p h y l o c o c c u s 感染および関連する状態の診断および処置において使用され得る。

【0076】

d P N A G は、結合体化された形態または結合体化されない形態で使用され得る。結合体化された形態では、d P N A G は直接またはリンカーを介してのいずれかでキャリア化合物と結合体化され得る。この結合体化は、グルコサミン単量体単位またはポリマー末端において任意の位置で生じ得る。

【0077】

10

20

30

40

50

本明細書において使用される「キャリアー化合物」は、直接またはリンカーを介してのいずれかで多糖類と結合体化され得、および免疫学的に活性または不活性であり得る化合物である。

【0078】

キャリアー化合物としては、タンパク質またはペプチド、多糖類、核酸または他のポリマー、脂質および小分子が挙げられるが、それらに限定されない。例えば、タンパク質としては、血清アルブミン、免疫グロブリン、アポリボタンパク質およびトランスフェリンのような血漿タンパク質；TRPLE、 β -ガラクトシダーゼ、ヘルペスgDタンパク質、アレルゲン、ジフテリアトキソイド、破傷風トキソイドのポリペプチド、サルモネラのフラゲリン、ヘモフィルスのピリン、ヘモフィスルスの15kDa膜タンパク質、ヘモフィスルスの28~30kDa膜タンパク質、ヘモフィスルスの40kDa膜タンパク質、*Escherichia coli*、非耐熱性(heat-label)エンテロトキシンltb、コレラ毒素のような細菌性ポリペプチド、またはロタウイルスVPおよび呼吸器系合胞体ウイルスfタンパク質および呼吸器系合胞体ウイルスgタンパク質を含むウイルスタンパク質を含む。本発明において有用なタンパク質は、哺乳動物に対して投与するのに安全であり、および必要に応じて免疫学的に有用なキャリアータンパク質である任意のタンパク質を含む。

10

【0079】

免疫化に特に有用であるキャリアー化合物としては、キーホールリンペットヘモシアニン、血清アルブミン、ウシのチログロブリン、またはダイズトリブシンインヒビターのようなタンパク質が挙げられる。免疫される動物のその種において免疫原性である任意の他の化合物が、同様にして使用され得る。

20

【0080】

多糖類をタンパク質に結合体化させる多くの方法が、当該分野で公知である。一般的に、この多糖類は、活性化され得るか、さもなければ結合体化されやすくさせられるべきであり、すなわち、少なくとも一つの部分が、タンパク質または他分子と共有結合する能力を有するようになされなければならない。多くのそのような方法は、当該分野で公知である。例えば、Jenningsに対して発行された、米国特許第4,356,170号は、過ヨウ素酸を使用して多糖類のアルデヒド基を生成させ、次いでシアノホウ化水素を用いて還元的アミノ化が行われることを記載する。Tsay et al.に対して発行された、米国特許第4,663,160号もまた、過ヨウ素酸を使用してアルデヒド基を生成させるが、次いでシアノホウ化水素のような還元剤の存在下で、シフの塩基反応を用いて(縮合剤の存在下で調製される)4~12炭素部分を用いて誘導されたタンパク質に、多糖類を結合させた。Gordonに対して発行された、米国特許第4,619,828号は、臭化シアンを用いて多糖類を活性化させ、次いで4~8炭素原子のスペーサーブリッジを通して、活性化された多糖類とこのタンパク質を結合体化させた。AndersonおよびClementsに対して発行された、米国特許第4,808,700号では、多糖類は、過ヨウ素酸塩による限定的酸化的開裂、グリコシダーゼによる加水分解、または酸加水分解を用いて改変され、少なくとも一つの還元末端を生成させ、そしてシアノホウ化水素の存在下において還元性アミノ化を通してタンパク質と結合体化された。PorroおよびCostantinoに対して発行された、米国特許第4,711,779号は、シアノホウ化水素ナトリウムを用いて還元した末端基に、第一級アミノ基を導入することによって多糖類を活性化し、次にアジピン酸の存在下でエステルに転換し、そしてジメチルスルホキシドのような有機溶媒の存在下で、トキソイドと結合体化させることを記載した。結合体化の多くの他の方法は当該分野で公知である。

30

40

【0081】

キャリアー化合物は、リンカーまたはスペーサーを介してdPNAGと結合体化され得る。多糖類は、当該分野で公知の任意の手段によって、リンカーまたはスペーサーと結合され得る。その手段としては、例えば、この多糖類の遊離還元末端を使用して、スペーサーまたはリンカーとの共有結合を生成する方法である。共有結合は、dPNAGの遊離還

50

元末端を遊離 1 - アミノグリコシド (1 - aminoglycoside) に転換することによって生成され得る。次いでそれは、アシル化によりスパーサーと共有結合され得る。(Lundquist et al. , J. Carbohydrate Chem. , 10 : 377 (1991))。あるいは、dPNA G は、このスパーサー上での活性基として N - ヒドロキシスクシンイミド活性エステルを用いて、このスパーサーと共有結合され得る。(Kochetkov , Carbohydrate Research , 146 : C1 (1986))。dPNA G の遊離還元末端はまた、ヨウ素および水酸化カリウムを用いてラクトンに転換され得る。(Isabell et al. , Methods of Carbohydrate Chemistry , Academic Press , New York (1962))。このラクトンは、このスパーサーまたはこのリンカー上にある第一級アミノ基を用いて、このスパーサーと共有結合され得る。dPNA G の遊離還元末端はまた、還元性アミノ化を用いて、このリンカーまたはこのスパーサーと共有結合され得る。

10

【0082】

本発明は、dPNA G と結合する抗体を含む。この抗体は、モノクローナル抗体またはポリクローナル抗体のいずれかであり得る。この dPNA G 抗体は dPNA G に結合し、そしてまた、50% より多くアセチル化された PNA G 形態と結合し得る。

【0083】

ポリクローナル抗体は、一般的に、抗体およびアジュバントの複数回の皮下注射または腹腔内注射によって動物の中に惹起させられる。dPNA G に対するポリクローナル抗体は、dPNA G の結合体化された形態または結合体化されない形態を、単独で、またはアジュバントとの組み合わせにより、注射することにより生成され得る。

20

【0084】

ポリクローナル抗体調製物の例を次に示す。dPNA G または dPNA G 結合体は、フロイント完全アジュバントのようなアジュバントと結合体化され、(例えば、1 ~ 3 容積フロイント中に、ウサギまたはマウスに対して 100 μ g の結合体)、そして複数箇所の皮内に注射される。約 1 ヶ月後、この動物は、複数箇所の皮下に注射されたアジュバント中の抗原または抗原結合体の、初回投与量の 5 分の 1 ~ 10 分の 1 量を用いて追加免疫される。一週間 ~ 二週間後、この動物から採血され、そしてその血清は抗体の存在についてアッセイされる。この動物は、抗体力価がプラトーに達するまで繰り返し追加免疫され得る。この動物には、dPNA G 単独、dPNA G 結合体、または異なるキャリアー化合物と結合体化された dPNA G が、アジュバントとともにまたはアジュバントなしで注射され得る。いくつかの実施形態では、この追加免疫は、dPNA G ではなく PNA G を含み得、またはこの追加免疫は、dPNA G および PNA G の混合物を含み得る。

30

【0085】

ポリクローナル抗体源を供給することに加えて、この免疫された動物は、抗 dPNA G モノクローナル抗体を生成させるために使用され得る。本明細書において使用されるように、用語「モノクローナル抗体」とは、dPNA G の同じエピトープ(すなわち、抗原決定基)と結合する免疫グロブリンの均質の集団をいう。このエピトープはまた、50% より多くアセチル化された PNA G 形態の中にも存在し得る。モノクローナル抗体は、同じ Ig 遺伝子再配列を有し、従って同一の結合特異性を示す。モノクローナル抗体は、当該分野で公知の任意の方法、例えば、骨髓腫細胞と融合またはエプスタインバーウイルス形質転換により免疫された動物から単離された脾臓細胞を不死化すること、および所望の抗体を発現するクローンについてスクリーニングすることによって調製され得る。他の方法は、再配列された Ig 遺伝子配列の単離および不死化細胞株中へのクローニングを含む。モノクローナル抗体を調製する方法および使用する方法は、当該分野において周知である。

40

【0086】

マウスの抗 dPNA G モノクローナル抗体は、免疫抗原として dPNA G を利用するこれらの任意の方法によって作製され得る。抗 dPNA G モノクローナル抗体を生成するた

50

めの方法の次に示す記載は、例示であり、および例示の目的のためのみに提供される。B a l b / c マウスは、完全フロイントアジュバントの中の精製された d P N A G の約 7 5 ~ 1 0 0 μ g を用いて、腹腔内免疫される。不完全フロイントアジュバント中の約 2 5 ~ 5 0 μ g の追加免疫注射は、初回注射後約 1 5 日および約 3 5 日に投与される。6 0 ~ 6 5 日目に、このマウスはアジュバントの非存在下で約 2 5 μ g の d P N A G の追加免疫注射を受ける。あるいは、追加免疫注射は、天然 P N A G 調製物、または d P N A G と P N A G との混合物を含み得る。3 日後、このマウスは殺され、そして、O i に記載されているような手順により、ポリエチレングリコールを用いて、単離された脾臓細胞がマウスの骨髓腫 NS - 1 細胞に融合される (O i V T : I m m u n o g l o b u l i n - p r o d u c i n g h y b r i d c e l l l i n e s i n H e r z e n b e r g L A (e d) : S e l e c t e d M e t h o d s i n C e l l u l a r B i o l o g y , S a n F r a n c i s c o , C A , F r e e m a n , (1 9 8 0)) 。ハイブリドーマ細胞は、ヒポキサンチン、アミノプテリンおよびチミジン (H A T) を用いて選択され、そして培養中で増殖される。融合後 1 4 日 ~ 1 5 日間、抗 d P N A G モノクローナル抗体を産生するハイブリドーマ細胞は、固定されたヤギ抗マウス I g G 有する、馴化培地から抗 d P N A G 抗体を捕獲すること、次いで特異的に結合した ^{1 2 5} I - 標識される d P N A G または ^{1 2 5} I - 標識される P N A G の定量化することによる固相ラジオイムノアッセイを用いて同定される。d P N A G に対する抗体に対して陽性であると試験されたハイブリドーマは、限界希釈によりサブクローニングされ、および再試験される。次いで、ハイブリドーマに関する腹水は、プリスタンで初回刺激された B A L B / c マウス中で、マウス 1 匹につき約 1×10^6 個の細胞を注射することによって調製される。この選択されたモノクローナル抗体が濃縮された濃縮物は、S - 2 0 0 上でゲル濾過によって腹水から生産され、N H ₄ S O ₄ を用いて濃縮される。このペレットは、5 0 % グリセロール / H ₂ O のような適切な保存溶液中に溶解され、そして 4 °C で保存される。

【 0 0 8 7 】

本明細書において使用される「抗 d P N A G 抗体」は、ヒト化抗体および抗体フラグメント、ならびに d P N A G およびいくつかの例では 5 0 % より多くアセチル化された P N A G 形態に結合する、インタクトなモノクローナル抗体およびインタクトなポリクローナル抗体を含む。本明細書において使用される「ヒト化モノクローナル抗体」とは、ヒト化モノクローナル抗体またはその機能的に活性なフラグメントであり、このフラグメントは、少なくとも、ヒト定常領域およびヒト以外の種の哺乳動物からの d P N A G 結合領域 (たとえば、C D R) を有する。単離された形態の、または薬学的調製物中のインタクトなヒト化抗 d P N A G モノクローナル抗体は、本発明のいくつかの局面に特に適切である。ヒト化抗体は、このヒト化抗体が d P N A G および好ましくは天然 P N A G 形態を特異的に認識するが、ヒトにおいて抗体それ自体に対する免疫応答を惹起しないという点で特に臨床的有用性を有する。一つの好ましい実施形態では、マウスの C D R を、ヒト化抗体のフレームワーク領域へグラフト化して「ヒト化抗体」を調製する。例えば、R i e c h m a n n e t a l . , N a t u r e 3 3 2 , 3 2 3 (1 9 8 8) ; M . S . N e u b e r g e r e t a l . , N a t u r e 3 1 4 , 2 6 8 (1 9 8 5) および E P A 0 2 3 9 4 0 0 (1 9 8 7 年 9 月 3 0 日 公開) を参照。

【 0 0 8 8 】

ヒトモノクローナル抗体は、当該分野で公知の任意の方法 (B o r r e b a e c k e t a l に対して発行された米国特許第 5 , 5 6 7 , 6 1 0 号、O s t b e r g に対して発行された米国特許第 5 6 5 , 3 5 4 号、B a k e r e t a l , K o z b e r , J . I m m u n o l . 1 3 3 : 3 0 0 1 (1 9 8 4) 、B r o d e u r , e t a l . , M o n o c l o n a l A n t i b o d y P r o d u c t i o n T e c h n i q u e s a n d A p p l i c a t i o n s , p . 5 1 - 6 3 (M a r c e l D e k k e r , I n c , n e w Y o r k , 1 9 8 7) および B o e r n e r e t a l . , J . I m m u n o l . , 1 4 7 : 8 6 - 9 5 (1 9 9 1) に対して発行された米国特許第 5 , 5 7 1 , 8 9 3 号で公開されている方法) によって作製され得る。ヒトモノクローナル抗体を調

製するための通常の方法に加えて、そのような抗体はまた、ヒト抗体を生成する能力のある、トランスジェニック動物を免疫することによって調製され得る（例えば、J a k o b o v i t e t a l . , P N A S U S A , 9 0 : 2 2 5 1 (1 9 9 3) , J a k o b o v i t s e t a l . , N a t u r e , 3 6 2 : 2 5 5 - 2 5 8 (1 9 9 3) , B r u g g e r m a n n e t a l . , Y e a r i n I m m u n o l . , 7 : 3 3 (1 9 9 3) および L o n g b e r g に対して発行された米国特許第 5 , 5 6 9 , 8 2 5 号）。

【 0 0 8 9 】

d P N A G および好ましくは他の天然 P N A G 形態と反応する、ヒト化モノクローナル抗体を調製するための方法の、次に示す例はまた、例示であり、および例示の目的のため 10 のみに提供される。例えば、ヒト化モノクローナル抗体は、ヒト以外の哺乳動物の抗体の非 C D R 領域を、ヒト化抗体の同様の領域と取り替えることによって組み立てられ得、他方、このもともとの抗体のエピトープ特異性を維持され得る。例えば、非ヒト C D R および必要に応じていくつかのフレームワーク領域は、ヒト F R および / または F c / p F c ' 領域と共有結合され、機能的抗体が生産し得る。米国では、P r o t e i n D e s i g n L a b s (M o u n t a i n V i e w C a l i f o r n i a) , A b g e n i x , および M e d a r e x のような、商業的に、特異的なマウス抗体領域からヒト化抗体を合成する企業が存在する。

【 0 0 9 0 】

欧州特許出願第 0 2 3 9 4 0 0 号（その全体の内容は、本明細書により参考として援用 20 される）は、マウス（またはヒト以外の他の哺乳動物）抗体の少なくとも C D R 部分がヒト化抗体中に含まれるヒト化クローナル抗体の生産および使用の例示的教示を提供する。手短に言うと、次に示す方法は、少なくともマウス C D R の一部を含む、ヒト化 C D R モノクローナル抗体を構築するために有用である。少なくとも I g の重鎖または軽鎖の可変領域（ヒト抗体からのフレームワーク領域を含む）およびマウス抗体の C D R 領域を少なくともコードする D N A 配列から作動可能に結合される、適切なプロモーターを含む、第一の複製可能な発現ベクターが調製される。必要に応じて相補的なヒト I g の軽鎖または重鎖の可変領域を少なくともコードする D N A 配列を作動可能に結合させる適切なプロモーターを含む第二の複製可能な発現ベクターが調製される。次いで、このベクターを用いて、細胞株が形質転換される。好ましくは、この細胞株は、骨髓腫細胞株、ハイブリド 30 マ細胞株、トリオーマ細胞株もしくはクアドローマ細胞株のようなリンパ系起源の、哺乳動物の不死化細胞株であるか、またはウイルスを用いる形質転換によって不死化された正常のリンパ系細胞である。次いで、この形質転換された細胞株を、当業者において公知の条件下で培養して、このヒト化抗体が生産される。

【 0 0 9 1 】

欧州特許出願第 0 2 3 9 4 0 0 号の中で示されているように、複製可能ベクターに挿入 されるための特定の抗体ドメインを作製するためのいくつかの技術は、当該分野において周知である。（好ましいベクターおよび組換え技術は、下でより詳細に議論される）。例 えば、この領域をコードする D N A 配列は、オリゴヌクレオチド合成によって調製され得 40 る。あるいは、粘着末端を有する二本鎖の合成または制限されたサブクローニングされた C D R カセットが、フレームワーク領域の結合部において連結され得るように、4 つのフ レームワーク領域が、結合部において適切な制限部位とともに融合される、C D R 領域が 欠如している合成遺伝子。別の方法は、オリゴヌクレオチド部位指向性変異誘発による可 変 C D R を含むドメインをコードする D N A 配列の調製物を含む。これらの方法の各々は、当該分野で周知である。それゆえ、当業者は、マウス C D R を含むヒト化抗体の、その エピトープに対する抗体の特異性を破壊することなく、マウス C D R 領域を含むヒト化抗 体を構築し得る。

【 0 0 9 2 】

ヒト抗体はまた、d P N A G に対する抗体を生産する血液またはヒト組織から抗体産生 リンパ球を回収することによって得られ得る。これらのリンパ球は、適切な培養条件下に 50

において実験室でリンパ球自身を増殖させる細胞を生産するために処置され得る。この細胞培養物はまた、d P N A Gに対する抗体の生産についてスクリーニングされ得、次いでクローニングされ得る。クローニング培養物を用いて、d P N A Gに対するヒトモノクローナル抗体を生産し得、またはこの抗体の重鎖または軽鎖の様々な部分をコードする遺伝子エレメントがクローニングされ得、そして異なるタイプの抗体の生産のために核酸ベクター中へ挿入される。

【0093】

抗体フラグメントに結合するd P N A Gもまた、本発明によって包含される。当該分野で周知のように、抗体分子の小さい一部分のみであるパラト-ブは、そのエピトープに対する抗体の結合に關与する（一般的に、Clark, W. R. (1986) *The Experimental Foundations of Modern Immunology* Wiley & Sons, Inc., New York; Roitt, I. (1991) *Essential Immunology*, 7th Ed., Blackwell Scientific Publications, Oxfordを参照）。例えば、この抗体のp F c ' 領域およびF c 領域は、補体カスケードのエフェクターであるが、抗原の結合に關与しない。p F c ' 領域が酵素学的に切除されている抗体、またはp F c ' 領域なしで生産されている抗体（F (a b ')₂ フラグメントと称される）は、インタクトな抗体の両方の抗原結合部位を保持する。単離されたF (a b ')₂ フラグメントは、その2つの抗原結合部位のために、二価のモノクローナルフラグメントと称される。同様に、F c 領域が酵素学的に切除されている抗体、またはF c 領域なしで生産されている抗体（F a b フラグメントと称される）は、インタクトな抗体分子の抗原結合部位のうちの一つを保持する。さらに前進すると、このF a b フラグメントは、共有結合した抗体軽鎖とF d と称される抗体重鎖の一部（重鎖可変領域）からなる。このF d フラグメントは抗体特異性の主な決定基であり（単一F d フラグメントは、抗体特異性を変えることなしに、10個までの異なる軽鎖と結合され得る）、そしてこのF d フラグメントは、単離物の際エピトープが結合する能力を保持する。

【0094】

用語F a b、F c、p F c '、F (a b ')₂ およびF v は、いずれも標準的な免疫学的意味で使用される[Klein, *Immunology* (John Wiley, New York, NY, 1982); Clark, W. R. (1986) *The Experimental Foundations of Modern Immunology* (Wiley & Sons, Inc., New York); Roitt, I. (1991) *Essential Immunology*, 7th Ed., (Blackwell Scientific Publications, Oxford)]。周知の機能的活性抗体フラグメントとしては、抗体のF (a b ')₂ フラグメント、F a b フラグメント、F v フラグメントおよびF d フラグメントが挙げられるが、これらに限定されない。インタクトな抗体のF c フラグメントが欠損したこれらのフラグメントは、循環からより急速に除去され、そしてインタクトな抗体よりも少ない特異的組織結合性を有し得る(Wahl et al., *J. Nucl. Med.* 24:316-325 (1983))。例えば、単鎖抗体は、Ladner et al. に対して発行された米国特許第4,946,778号に記載の方法に従って構築され得る。そのような単鎖抗体は、可撓性のあるリンカー部分によって結合された軽鎖および重鎖の可変領域を含む。単離された可変の重鎖の単ドメイン（単ドメイン抗体（「F d」））を得るための方法もまた、報告されている（例えば、Ward et al., *Nature* 341:644-646 (1989)を参照、これは、単離された形態において抗体重鎖可変領域（V_H 単ドメイン抗体）と結合する標的エピトープに対して十分な親和力を有する、抗体重鎖可変領域を同定するためのスクリーニングする方法を開示する。）。公知の抗体重鎖可変領域配列および軽鎖可変領域配列に基づく組換えF v フラグメントを作製するための方法は、当該分野で公知であり、そして例えばMoore et al. 米国特許第4,462,334号に記載されている。抗体フラグメントの使用および生産を記載する他の参考文献は、例えば、

10

20

30

40

50

Fabフラグメント(Tijssen, Practice and Theory of Enzyme Immunoassays (Elsevier, Amsterdam, 1985))、Fvフラグメント(Hochman et al., Biochemistry 12:1130 (1973); Sharon et al., Biochemistry 15:1591 (1976); Ehrilch et al., 米国特許第4,355,023号)および抗体分子の一部(Audilore-Hargreaves, 米国特許第4,470,925号)を含む。従って、当業者は、このdPNAGエピトープに対する抗体の特異性を破壊することなく、インタクトな抗体の様々な部分から抗体フラグメントを構築し得る。抗dPNAG抗体によって認識されるエピトープはまた、他の天然PNAG形態上に存在し得ることが理解される。

10

【0095】

この抗体フラグメントはまた、「ヒト化抗体フラグメント」を包含する。当業者が認識するように、そのようなフラグメントは、インタクトなヒト化抗体の伝統的な酵素学的開裂によって調製され得る。しかし、関与する構築物の性質のために、インタクトな抗体がそのような開裂に対して感受性がない場合、言及されるこの構築物は、出発材料として使用される免疫グロブリンフラグメントを用いて調製され得、または、組換え技術が使用される場合、そのDNA配列それ自身が、所望のフラグメント(これを、化学的手段または生物学的手段によってインビボまたはインビトロにおいて組み合わせ、最終の所望のインタクトな免疫グロブリンフラグメントが調製され得る。)をコードするために改変され得る。

20

【0096】

dPNAGに対して結合特異性を有する他のdPNAG結合因子は、本発明の診断的方法において使用され得る。いくつかの慣用のアッセイは、dPNAG結合性ペプチドを容易に同定するために使用され得る。本発明のペプチドを同定するためのスクリーニングアッセイは、例えば、Hart, et al., J. Biol. Chem. 269:12468 (1994)に記載されているようなファージディスプレイ手順を用いて行われる。Hart et al.は、哺乳動物細胞レセプターに対する新しいペプチドのリガンドを同定するための繊維状ファージディスプレイライブラリーを報告する。一般的に、例えば、M13またはfdファージを用いたファージディスプレイライブラリーは、上述の参考文献に記載のような通常の手順を用いて調製される。このライブラリーは、4~80アミノ酸残基を含む挿入物を提示する。必要に応じて、この挿入物は、完全に縮重のペプチド配列または偏ったペプチド配列のアレイを表す。dPNAGに選択的に結合するリガンドは、dPNAGに結合するリガンドをファージ表面に発現するファージを選択することによって得られる。次いで、これらのファージは、何サイクルかの再選択に供されて、最も有用な結合性特徴を有するペプチドリガンドを発現するファージが同定される。代表的には、最良の結合性特徴(例えば、最も高い親和性)を示すファージを、核酸分析により特徴付けて、ファージ表面上に発現するペプチドの特定アミノ酸配列を同定し、そしてdPNAGへの最適の結合性を達成するために、発現されたペプチドの長さを同定する。

30

【0097】

あるいは、そのようなペプチドのリガンドは、一つまたはより多くのアミノ酸を含むペプチドの組み合わせライブラリーから選択され得る。そのようなライブラリーはさらに、非ペプチド合成部分を含んで合成される。この部分は、天然に存在する対応物と比較して酵素学的に分解を受け難い。

40

【0098】

ペプチドがdPNAGと結合するかどうかを決定するために、任意の公知の結合実験が使用され得る。例えば、このペプチドは、表面上に固定され、次いで標識されたdPNAGと接触させられる。次いで、このペプチドと相互作用するdPNAGの量またはこのペプチドと結合しない量を定量して、ペプチドがdPNAGと結合するかどうかを決定し得る。固定された抗dPNAG抗体を有する表面は、ポジティブコントロールとして使用され得る。結合アッセイはまた、推定上のdPNAG特異的抗体がPNAGの他の天然形態

50

と結合する程度を決定し得る。

【0099】

本発明の組成物は、多くのインビボまたはインビトロにおいての目的のために有用である。例えば、本発明の組成物は、例えば、*Staphylococcus* 感染、および P N A G を生成する他の細菌種によって引き起こされる感染を予防するための、ヒトおよび動物に対しての能動免疫のためのワクチンとして；*Staphylococcus* 感染を予防または処置するための、他の動物またはヒトに対して投与され得る抗 d P N A G 抗体を生産するためのヒトまたは動物の免疫のためのワクチンとして；*Staphylococcus* 感染を予防する能力のあるモノクローナル抗体、抗体の作成に必要である遺伝子のライブラリー、またはペプチド模倣物のような生物学的因子に対してスクリーニングするための抗原として；*Staphylococcus* 感染、および P N A G を生成する細菌の他の種によって引き起こされる感染に対する診断的試薬として；ならびに、*Staphylococcus* 感染および P N A G を生成する細菌の他の種により引き起こされる感染に対する感受性に関して、ヒトまたは動物の免疫状態を決定するための診断的試薬として抗体応答を生産するために有用である。

10

【0100】

d P N A G は、被験体における *Staphylococcus* による感染に対する能動免疫を誘導することによって P N A G を作成する細菌を有する感染に対して、被験体を保護するために使用され得る。この方法は、本発明の任意の P N A G 組成物の、*Staphylococcus* に対する抗体応答のような免疫応答を誘導するための有効な量を、被験体に投与することによって達成される。本明細書において使用される「能動免疫」とは、いくつかのリンパ系細胞の、抗体を生産する細胞への分化を引き起こし、およびある例では、他のリンパ系細胞へ分化する、抗原を被験体に導入することを含む。記憶細胞は、抗体を分泌しないが、抗体が再度身体へ投与される場合に抗原を感知するために、その抗体を記憶細胞膜へ取り込む。

20

【0101】

この方法は、*Staphylococcus* による感染に対する免疫を誘導するために有用である。本明細書において使用される「*Staphylococcus*」とは、この P N A G を発現する全ての *Staphylococcus* 細胞種をいう。任意の特定の機構により拘束されることは意図しないが、P N A G の高いアセチル化（例えば、50% より多くアセチル化されている形態）は、d P N A G と同じ程度まで、オブソニンの保護的な抗体の生産を顕在化することができないと考えられる。*Staphylococcus* として分類される細菌は、当業者において周知であり、および微生物学文献の中で記載されている。P N A G を発現する *Staphylococcus* として、*Staphylococcus epidermidis* (R P 6 2 A (A T C C 番号 3 5 9 8 4)、R P 1 2 (A T C C 番号 3 5 9 8 3)、および M 1 8 7 を含む)、*Staphylococcus aureus* (R N 4 2 2 0 (p C N 2 7) および M N 8 ムコイドを含む)、および *ica* 遺伝子座 (T M 3 0 0 (p C N 2 7) を含む) 上の遺伝子を用いて形質転換された *Staphylococcus carnosus* のような菌株が挙げられるが、これらに限定されない。P N A G を発現する他の細菌株は、通常の当業者によって容易に同定され得る。例えば、*ica* 遺伝子座を発現する *Staphylococcus* 細菌は、P N A G を発現する。通常の当業者は、*ica* 遺伝子座の核酸配列が公知である（配列番号 1 および Heilmann, C., O. Schweitzer, C. Gerke, N. Vanittanakom, D. Mack and F. Gotz (1996) *Molecular basis of intercellular adhesion in the biofilm-forming Staphylococcus epidermidis*. *Molec. Microbiol.* 20: 1083 に、通常記載されている）ので、*ica* 遺伝子座に関連する mRNA またはタンパク質の発現に対して容易にスクリーニングされ得る。P N A G を発現する細菌株はまた、抗 P N A G 抗体または抗 d P N A G 抗体を用いて、免疫電子顕微鏡（または他の免疫実験）によって同定され、この細菌

30

40

50

菌の表面上の P N A G の存在を検出し得る。加えて、細菌株の夾膜は、単離され得、液体クロマトグラフィーおよび質量分析を用いて分析され得る。

【 0 1 0 2 】

本明細書において使用される「被験体」とは、温血哺乳動物であり、および、例えば、ヒト、霊長類、ウマ、ウシ、ブタ、ヤギ、ヒツジ、イヌ、およびネコを含む。いくつかの実施形態では、この被験体は非げっ歯類被験体である。非げっ歯類被験体は、上述で定義された任意の被験体であるが、特にマウス、ラット、およびウサギのようなげっ歯類を除外する。いくつかの実施形態では、好ましい被験体はヒトである。

【 0 1 0 3 】

d P N A G は、抗原に対する抗体応答のような免疫応答を誘導する能力のある任意の被験体に投与され得る。この抗体は特に、免疫応答を生産する能力および S t a p h y l o c o c c u s 感染を発生する危険状態にある能力を有する被験体に、S t a p h y l o c o c c u s によって引き起こされる全身性感染に対する能動免疫を誘導することに適合する。免疫応答を生産する能力および S t a p h y l o c o c c u s 感染を発生する危険状態にある能力を有する被験体は、環境性 S t a p h y l o c o c c u s にさらされる危険状態にある免疫体系を所有する哺乳動物である。例えば、入院患者は、病院の環境においてこの細菌にさらされる状態にある結果として、S t a p h y l o c o c c u s 感染を発生する危険状態にある。S . a u r e u s による感染を発生する、特に高い危険集団は、例えば、透析を受ける腎臓病患者、および高い危険の外科手術を受ける個人を含む。S . e p i d e r m i d i s による感染を発生する高い危険集団はまた、例えば、静脈系（例えば、中心系）、または人工器官（例えば、臀部または膝に代わる人工器官）のような内在性医療デバイスを有する患者を含む。なぜなら、臨床的分離菌は、しばしば、（生物膜または粘液と称される）細胞外材料であるために、可塑性表面に高く接着するからである。いくつかの実施形態では、この被験体は医療デバイス移植物を受け入れられており、および他の実施形態では、この被験体は医療デバイス移植物を受け入れられていないが、医療デバイス移植物を受け入れる予定はあり得る。S . e p i d e r m i d i s による感染を発生させる危険状態にある被験体は、例えば、化学療法を受ける早期産新生児および患者が含まれる。

【 0 1 0 4 】

d P N A G は、抗体応答を誘導するための有効な量を、被験体に投与され得る。本明細書において使用される「免疫応答（例えば、抗体応答）を誘導するための有効な量」は、（i）例えば、被験体（被験体は、d P N A G および P N A G の高いアセチル化形態の両方を認識し得る）において抗 d P N A G 抗体の生産を誘導すること、記憶細胞およびおそらく細胞毒性リンパ球反応などの生産を誘導することによって、被験体自身の免疫保護を生産する際に被験体を補助すること、および / または（ii）S t a p h y l o c o c c u s にさらされる被験体において、S t a p h y l o c o c c u s による感染が発生することを予防することに対して充分である d P N A G の量である。

【 0 1 0 5 】

いくつかの好ましい実施形態では、免疫応答を刺激するための d P N A G ワクチンの有効な量は、S t a p h y l o c o c c u s の少なくとも 2 種類（例えば、S . a u r e u s および S . e p i d e r m i d i s ）と交差反応する抗体の生産を誘発する能力がある d P N A G ワクチンの量である。

【 0 1 0 6 】

当業者は、d P N A G の量が、当該分野において公知の慣用の方法によって能動免疫を誘導するために充分であるかどうかを評価し得る。例えば、哺乳動物の中で抗体を生産するための特異的な抗原の能力は、d P N A G 抗原を用いてマウスまたは他の被験体において抗体をスクリーニングすることによって評価され得る。

【 0 1 0 7 】

本発明の抗 d P N A G 抗体は、感染因子にさらされる危険状態にあるそれらの被験体における全身感染の発生を予防することによって、被験体において受動免疫を誘導するため

10

20

30

40

50

に有用である。Staphylococcus aureusのようなStaphylococcusによる感染に対する受動免疫を誘導するための方法は、例えばStaphylococcus aureusのようなStaphylococcusのオプソニン化を引き起こすことによって、Staphylococcusに対する免疫応答を誘導するための抗dPNA G抗体の有効な量を被験体に投与されることによって行われる。本明細書において使用される「受動免疫」とは、被験体に対する抗体の投与を包含し、ここで、この抗体は、Staphylococcus細菌の表面に接着して、そしてStaphylococcus細菌が食作用されることを引き起こすような、異なる被験体（同一のおよび異なる種の被験体を含む）において生産される。

【0108】

10

この抗dPNA G抗体は、受動免疫を誘導するために、Staphylococcus感染を発生する危険状態にある任意の被験体に投与され得、およびいくつかの実施形態では、dPNA Gに対する能動免疫を誘導する能力のない被験体のために特に適合し得る。dPNA Gを用いてのワクチン接種は、高い免疫無防備状態である危険状態の被験体に完全に有効ではあり得ないので、これらの被験体は、Staphylococcus aureusのようなStaphylococcusに対して惹起された抗体調製物を用いての処置から利益を得ている。免疫応答を誘導する能力のない被験体とは、免疫無防備状態の被験体（例えば、化学療法を受ける患者、AIDS患者など）、または免疫系のまだ発生していない被験体（例えば、早期産新生児）が挙げられる。

【0109】

20

この抗dPNA G抗体は、Staphylococcus感染を発生する危険状態にある被験体に投与され、この感染因子が体の中で繁殖することを予防し得またはこの感染因子を殺傷し得る。この抗PNA G抗体はまた、Staphylococcusによって引き起こされる感染を既に有している被験体に投与され、この感染因子が体の中で繁殖することを予防し得またはこの感染因子を殺傷し得る。

【0110】

本発明の抗dPNA G抗体は、Staphylococcus aureusのようなStaphylococcusに対して免疫応答を誘導するための有効な量を、被験体に投与される。本明細書において使用される「Staphylococcusに対して免疫応答を誘導するための有効な量」とは、抗dPNA G抗体の量が、(i) Staphylococcusにさらされた被験体において、Staphylococcusによる感染が発生することを予防する；(ii) 感染の発生を阻害する、すなわちStaphylococcusの発生を阻止するまたは遅らせる、および/または(iii) Staphylococcus感染を軽減する、すなわち、感染した被験体における、Staphylococcus細菌の根絶に対して充分であることである。

30

【0111】

当業者で公知の慣用の手順を用いて、抗dPNA G抗体の量は、抗体のオプソニンの程度を予測するインビトロのオプソニン化分析において、「Staphylococcusに対する免疫応答を誘導するための有効な量」であるかどうかを決定され得る。Staphylococcus細菌をオプソニン化する抗体は、Staphylococcus細菌のサンプルに加えるときにStaphylococcus細菌の食作用を引き起こす抗体である。オプソニン化分析は、比色定量分析、化学発光分析、蛍光または放射性同位元素標識取り込み分析、細胞伸介性細菌分析または細菌のオプソニン潜在性を測定する他の分析であり得る。次に示すオプソニン化分析は、抗dPNA G抗体の有効な量を決定するために使用され得る。抗dPNA G抗体は、Staphylococcus細菌、および真核生物食作用性細胞、および必要に応じて補体タンパク質と共にインキュベートされる。抗PNA G抗体のオプソニンの能力は、インキュベーションのあとに残っているStaphylococcusの量に基づいて決定される。これは、2つの同様のアッセイ（このうち、一方のみがオプソニン化免疫グロブリンを含む）間で、生存するStaphylococcusの数を比較することによって達成される。制御非特異的免疫グロブリンと

40

50

のインキュベーションと比較すると、*Staphylococcus*の数の減少は、オプソニン化を指し示す。

【0112】

本発明の方法はまた、抗dPNAG_{pure}抗体の*Staphylococcus*のオプソニン化を誘導するための有効な量を被験体に投与することによって、被験体において*Staphylococcus*に対する受動免疫を誘導するために有効である。本明細書において使用される抗dPNAG_{pure}抗体とは、本発明の純粋なdPNAG抗体と特定に相互作用し、そしてコアグラゼ陰性*Staphylococcus*またはコアグラゼ陽性*Staphylococcus*のオプソニン化を誘導するが、dPNAGの純粋でない調製物と相互作用し得ない抗体である。上述において議論されるように、純粋でないdPNAG調製物は、10
テイコ酸またはこの抗原の免疫原性を妨げ得る他の不純物によって汚染され得る。当業者は、容易に、抗dPNAG抗体が、慣用の結合アッセイを用いて抗dPNAG_{pure}抗体であるかどうかを同定し得る。例えば、抗dPNAG抗体は、表面に固定され得、次いで標識された純粋でないdPNAG調製物または標識された純粋なdPNAG調製物と接触され得る。この抗体と接触するdPNAG調製物（純粋な調製物対純粋でない調製物）の量、またはこの抗体と結合しない量は、次いで、この抗体が純粋でないdPNAG調製物と結合するかどうかを決定するために定量され得る。重要な実施形態では、この抗dPNAG_{pure}抗体は、コアグラゼ陰性*Staphylococcus*およびコアグラゼ陽性*Staphylococcus*に対して有効であり、ならびにその表面に20
dPNAGまたは高くアセチル化されたPNAGを発現する、任意の適切な微生物に対して有効である。

【0113】

dPNAG抗原は、ワクチンとして処方され得る。ワクチンとして処方するための適切なキャリア媒体は、リン酸ナトリウム緩衝化生理食塩水（pH 7.4）、またはリン酸ナトリウム緩衝化生理食塩水（pH 6）中で懸濁された0.125Mリン酸アルミニウムゲル、および他の従来型の媒体を包含する。一般的に、ワクチンは、この抗原を約5～約100μgおよび好ましくは約10～50μg含み、温血の哺乳動物において有効なレベルの抗体を誘発させる。このdPNAGがワクチンとして投与されるとき、必要に応じてアジュバントを含む。

【0114】

用語「アジュバント」とは、dPNAGへ組み込まれるまたはdPNAGとともに同時に投与される、被験体において免疫応答を増強する任意の物質を含むことを意味する。アジュバントは、アルミニウム化合物、例えば、ゲル、水酸化アルミニウムおよびリン酸アルミニウム、およびフロイント完全アジュバントまたはフロイント不完全アジュバント（例えば、この中では、このdPNAG抗原は、パラフィン油エマルジョンの中の滅菌水の水層に組み込まれる）が挙げられるが、これらに限定されない。パラフィン油は、油の異なるタイプ、例えば、スクアレンまたは落花生油に置き換えられ得る。アジュバント性質を有する他の材料は、BCG（弱毒化*Mycobacterium tuberculosis*）、リン酸カルシウム、レバミゾール、イソプリノシン、多価陰イオン（例えば、ポリA:U）、レンチナン、百日咳毒、リビドA、サポニン、QS-21、およびペプチド（例えば、ムラミルジペプチド）を含む。希土類塩、例えば、ランタンおよびセリウムはまた、アジュバントとして使用され得る。アジュバントの量は、被験体および部分的な使用されるdPNAG抗原（例えば、アセテート置換の程度）に依存し得、そして過度の実験法なしで、当業者によって容易に決定され得る。

【0115】

一般的に、治療目的のために投与されるとき、本発明の処方物は、薬学的に受容可能な溶液中において適用される。そのような調製物は、慣用的に、薬学的に受容可能な塩濃度、緩衝物質、防腐剤、適合性キャリアー、アジュバント、および必要に応じて他の薬学的成分を含む。

【0116】

10

20

30

40

50

本発明の組成物は、それ自体が（ニート）または薬学的に受容可能な塩の形において投与され得る。医薬の中で使われるとき、この塩は薬学的に受容可能であるべきだが、非薬学的に受容可能な塩は、都合よく、薬学的に受容可能な塩それ自体を調製するために使用され得、および本発明の範囲から除外され得ない。そのような薬理学的に受容可能な塩および薬学的に受容可能な塩としては、次に示す酸から調製されるものが挙げられるが、これらに限定されない：塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸、マレイン酸、酢酸、サリチル酸、p - トルエンスルホン酸、酒石酸、クエン酸、メタンスルホン酸、ギ酸、マロン酸、コハク酸、ナフタレン - 2 - スルホン酸、およびベンゼンスルホン酸。また、薬学的に受容可能な塩は、カルボン酸ナトリウム塩、カルボン酸カリウム塩またはカルボン酸カルシウム塩のような、アルカリ金属塩またはアルカリ土類塩として調製され得る。

10

【0117】

適切な緩衝物質は、酢酸および塩（1 ~ 2 % W / V）；クエン酸および塩（1 ~ 3 % W / V）；ホウ酸および塩（0 . 5 ~ 2 . 5 % W / V）；およびリン酸および塩（0 . 8 ~ 2 % W / V）を含む。適切な防腐剤は、塩化ベンザルコニウム（0 . 003 ~ 0 . 03 % W / V）；クロロブタノール（0 . 3 ~ 0 . 9 % W / V）；パラベン（0 . 01 ~ 0 . 25 % W / V）およびチメロサル（0 . 004 ~ 0 . 02 % W / V）を含む。

【0118】

本発明は、医療的使用のために、一つまたはより多くの薬学的に受容可能なキャリアーおよび必要に応じて他の薬学成分とともに d P N A G を包含する、薬学組成物を提供する。本明細書において使用される用語「薬学的に受容可能なキャリアー」とは、下記においてより十分に記載されるが、ヒトまたは他の動物への投与に適合する、適合性固体賦形剤または適合性液体賦形剤、希釈剤、またはカプセル化する物質を意味する。本発明では、用語「キャリアー」は、有機成分または無機成分、天然物または合成物（これらとともに、主成分は、この適用を容易にするために結合される）を表す。この薬学組成物の成分はまた、d P N A G と、およびお互いと、この所望の薬学的有効性を実質的に損なう相互作用がないような様式において、混合される能力がある。

20

【0119】

非経口投与に適する組成物は、都合よく、この多糖類の滅菌した水溶性調製物を含み、この調製物はこの受容者の血液に対して等張性であり得る。とりわけ、使用され得る受容可能な媒体および溶媒は、水、リンゲル液、および等張性塩化ナトリウム溶液である。加えて、滅菌した不揮発性油は、慣習的に、溶媒または懸濁培地として使用される。この目的のために、任意の無刺激性不揮発性油は、合成のモノグリセリドまたはジグリセリドを含んで使用され得る。加えて、オレイン酸のような脂肪酸は、注射可能物質の調製物において用途が見つけられる。皮下投与、筋肉内投与、腹腔内投与、静脈内投与などに適したキャリアー処方物は、Remington's Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing Company, Easton, PAにおいて見つけられ得る。

30

【0120】

本発明の調製物は、有効な量で投与される。上述で議論されるような有効な量は、単独のまたはさらなる用量とともに、それぞれ感染性細菌の能動免疫またはオブソニン化を誘導する d P N A G または抗 d P N A G 抗体の量である。投与形態にも依存するが、1 ナノグラム / キログラム ~ 100 ナノグラム / キログラムまでの範囲の投与量が、有効であることが考えられる。好ましい範囲は、500 ナノグラムと500 マイクログラム / キログラムの間、およびより好ましくは1 マイクログラムと100 マイクログラム / キログラムの間であると考えられる。この絶対量は、この投与がこの細菌を有する高い危険状態にあるがまだ感染していない被験体、または既に感染している被験体に対して行われるのかどうか、併用治療、投与の数および個人の患者の性質（年齢、身体状態、大きさおよび体重を含む）のさまざまな要素に依存する。これらは当業者に周知の要素であり、および慣用の実験法を用いてのみ扱われ得る。最大投与量、つまり安全な医療判断によって最高に安全な投与量が使用されることが、一般的に好まれる。

40

50

【0121】

本発明の薬学的組成物の複数の用量が、考慮される。一般的な免疫計画は、抗体の高い用量を投与し、その次に、数週間待った後、抗体のより低い用量が続くことを包含する。なおさらなる投与量は、同様に投与され得る。受動免疫に対する投薬計画は、必要な場合はより頻繁に投与する点において、全く異なる。細菌感染に対して増大される免疫応答、および/またはその後の感染からの保護が結果として起こる、任意の養生法が使用され得る。特定の d P N A G の複数の投与量の送達に対する所望の時間間隔は、慣用の実験法のみを用いて、当業者により決定され得る。

【0122】

様々な投与経路が利用可能である。もちろん、選択される特定の様式は、選択される特定の d P N A G、治療される特定の状態、および治療の有効性のために必要である投与量に依存する。本発明の方法は、一般的に言えば、医療的に受容可能である任意の様式の投与を用いて実行され得、このことは、臨床的に受容可能でない有害な効果を引き起こすことなく、有効なレベルの免疫応答を生産する任意の様式を意味する。投与の好ましい様式は、非経口経路である。用語「非経口」は、皮下注射、静脈内注射、筋肉間注射、腹腔内注射、または注入技術を包含する。他の経路としては、口、鼻、皮膚、舌下、および局所経路が挙げられるが、これらに限定されない。

【0123】

この組成物は、単位投薬形態の中に都合よく存在し得、および薬学分野で周知の任意の方法によって調製され得る。全ての方法は、d P N A G または d P N A G 結合因子を、一つまたはより多くの付属成分を構成するキャリアーとの会合へと導く工程を包含する。一般的に、この組成物は、このポリマーを、液体キャリアー、微細に分離された固体キャリアー、または両方と、均等におよび親密に会合へと導くことによって調製され、次いで、必要な場合、この生成物を成型させる。このポリマーは、凍結乾燥されて保存され得る。

【0124】

他の送達系としては、時間放出送達系、遅延放出送達系、または持続性放出送達系を挙げることができる。そのような系は、本発明の多糖類の、繰り返される投与を避け、被験体およびその医師にとっての利便性を増やす。多くのタイプの放出送達系は、当業者に公知であり利用できる。これらとしては、ポリ乳酸およびポリグルコール酸、ポリ無水物およびポリカプロラク톤のような、ポリマーに基づく系；コレステロール、コレステロールエステル、およびモノグリセリド、ジグリセリド、およびトリグリセリドのような脂肪酸または中性脂肪；ヒドロゲル放出系；シラスティック系；ペプチドに基づく系；ワックスコーティング、便利な結合剤および賦形剤を用いて圧縮される錠剤、部分的に融解される移植体などが挙げられる。特定例としては、次のものが挙げられるが、これらに限定されない：(a) 侵食系（この中では、多糖類が、米国特許第 4,452,775 号 (Kent)：同 4,667,014 号 (Nestor et al.)；および同 4,748,034 号および同 5,239,660 号 (Leonard) で見出されるマトリックス内の形態に含まれる) および (b) 拡散系（その中では、主薬が、制御された速度で、米国特許第 3,832,253 号 (Higuchi et al.) および同 3,854,480 号 (Zaffaroni) において見出されるポリマーを通して浸透する)。加えて、ポンプに基づくハードウェア送達系が使用され得、これらのいくつかは移植に対して適応する。

【0125】

本発明の P N A G 抗原は、P N A G 抗原自身によってアジュバントの性質を有し得るということがまた、当業者によって評価され得る。本明細書において記載の多糖類がヒト免疫応答を増大させるまでの程度において、P N A G 抗原は、他の材料との結合体化において、アジュバントとして使用され得る。

【0126】

本発明の d P N A G 抗原および抗 d P N A G 抗体は、別の抗細菌性（すなわち、殺菌性）薬物とともに、または抗細菌性反応混液 (cocktail) の形態において、または

10

20

30

40

50

他の細菌性抗原もしくは抗細菌性抗体とともに、送達され得る。抗細菌性抗生物質反応混液は、本発明の任意の組成物と、抗細菌性薬物との混合物である。細菌感染の処置における抗生物質の使用は、慣用されている。能動免疫を誘導するための抗原、および受動免疫を誘導するための抗体の使用もまた、慣用されている。この実施形態では、共通の投与ビヒクル（例えば、錠剤、移植体、注射溶液など）は、本発明において有効な組成物と、抗細菌性抗生物質薬物および／または抗原もしくは抗体とを含み得る。あるいは、この抗細菌性抗生物質薬物および／または抗原もしくは抗体は、別々に投与され得る。この抗細菌性物質（例えば、抗生物質）はまた、d P N A Gまたは抗d P N A G抗体と結合体化され得る。

【0127】

抗細菌性抗生物質薬物は、周知であり、ペニシリンG、ペニシリンV、アンピシリン、アモキシリン、パカンピシリン、シクラミン、エピシリン、ヘタシリン、ピバンピシリン、メチシリン、ナフシリン、オキサシリン、クロキサシリン、ジクロキサシリン、フルクロキサシリン、カルベニシリン、チカルシリン、アプロシリン、メズロシリン、ピペラシリン、アムジノシリン、セファレキシン、セフラジン、セファドキシル、セファクロール、セファゾリン、セフロキシムアキセチル(axetil)、セファマンドール、セフォニド、セフォキシチン、セフォタキシン、セフチゾキシム、セフメノキチン、セフトリアキソン、モキサラクタム、セフォテタン、セフォペラゾン、セフトジジム、イミペネム、クラブラネイト、タイメンチン、スルバクタム、ネオマイシン、エリスロマイシン、メトロニダゾール、クロラムフェニコール、クリンダマイシン、リンコマイシン、バンコマイシン、トリメトプリム-スルファメトキサゾール、アミノグリコシド類、キノロン類、テトラサイクリン類およびリファンピン(Goodman and Gilman's, Pharmacological Basics of Therapeutics, 8th Ed., 1993, McGraw Hill Inc.を参照)が挙げられる。

【0128】

他の多糖類抗原および抗体は、当該分野で周知である。例えば、下に示す多糖類抗原および／またはそれに対する抗体は、このd P N A G抗原および／または抗体との結合体で投与され得る：Salmonella typhi夾膜V_i抗原(Szu, S. C., X. Li, A. L. Stone and J. B. Robbins, Relation between structure and immunologic properties of the V_i capsular polysaccharide, Infection and Immunity. 59:4555-4561(1991)); E. Coli K5夾膜(Vann, W., M. A. Schmidt, B. Jann and K. Jann, The structure of the capsular polysaccharide(K5 antigen) of urinary tract infective Escherichia coli, 010:K5:H4. A polymer similar to desulfo-heparin, European Journal of Biochemistry. 116:359-364, (1981); Staphylococcus aureus 5型夾膜(Fournier, J. - M., K. Hannon, M. Moreau, W. W. Karakawa and W. F. Vann, Isolation of type 5 capsular polysaccharide from Staphylococcus aureus, Ann. Inst. Pasteur/Microbiol. (Paris). 138:561-567, (1987)); Rhizobium meliloti エクス多糖類(expolysaccharide)II(Glazebrook, J. and G. C. Walker, a novel expolysaccharide can function in place of the calcofluor-binding expolysaccharide in nodulation of alfalfa by Rhizobium meliloti, Cell.

65:661-672(1989)); B群Streptococcus III型(We
ssels, M. R., V. Pozagay, D. L. Kasper and H. J.
Jennings, Structure and immunochemistry o
f an oligosaccharide repeating unit of t
he capsular polysaccharide of type III g
roup B Streptococcus, Journal of Biologic
al Chemistry. 262:8262-8267(1987)); Pseudo
monas aeruginosa Fisher O特異的側鎖(Knirel, Y
. A., N. A. Paramonov, E. V. Vinogradov, A. S. Sha
shkow, B. A. N. K. Kochetkov, E. S. Stanislavsky
and E. V. Kholodkova, Somatic antigens of
Pseudomonas aeruginosa The structure of O
-specific polysaccharide chains of lipop
olysaccharides of P. aeruginosa O3(Lanyi)
, 025(Wokatsh) and Fisher immunotypes 3 a
nd 7, European Journal of Biochemistry. 1
67:549, (1987)); Shigella sonnei O特異的側鎖(K
enne, L., B. Lindberg and K. Petersson, Struct
ual studies of the O-specific side chain
s of the Shigella Sonnei phase I lipopol
ysaccharide, Carbohydrate Research. 78:119
-126, (1980)); S. pneumoniae I型夾膜(Lindberg, B
, Lindqvist, B., Lonngren, J., Powell, D. A., S
tructual studies of the capsular polysac
charide from Streptococcus pneumoniae ty
pe 1, Carbohydrate Research. 78:111-117(19
80)); およびStreptococcus pneumoniae群抗原(Jenn
ings, H. J., C. Lugowski and N. M. Young, Struc
ture of the complex polysaccharide C-sub
stance from Streptococcus pneumoniae typ
e 1, Biochemistry. 19:4712-4719(1980))。

【0129】

他の非ポリペプチド抗原またはそれに対する抗体は、当業者に周知であり、および本発
明のdPNAG組成物との結合体で使用され得る。

【0130】

このdPNAG抗原および抗体はまた、被験体もしくはサンプルの免疫状態を決定する
ための診断アッセイにおいて有用であり、または免疫アッセイにおいての試薬として使用
され得る。例えば、この抗体は、サンプル中において、表面にPNAGを有する細菌の存
在を検出するために使用され得る。この細菌がサンプル中に存在する場合、この抗体はこ
の感染された被験体を治療するために使用され得る。この抗体はまた、PNAG抗原の存
在に対して、細菌をスクリーニングするために使用され得、および複合混合物から、dP
NAGまたはPNAG抗原、およびdPNAGまたはPNAG抗原を含む細菌を単離する
ために使用され得る。

【0131】

上述に記載のアッセイおよび当該分野で公知の任意の他のアッセイは、このdPNAG
または抗体、および/または、免疫したこのdPNAGまたは不溶性マトリックス上の抗
体を標識することによって達成され得る。dPNAGおよび/または抗体を用いての、こ
の分析的および診断的方法は少なくとも次に示す試薬のうちの一つを使用する：標識され
た分析アナログ、免疫された分析アナログ、標識された結合パートナー、免疫された結合
パートナー、および滅菌結合体。使用される標識は、分析物とその結合パートナーとの結

合を妨げない、任意の検出可能な官能基であり得る。多数の標識は、免疫アッセイにおけるそのような使用について公知である。例えば、蛍光色素、化学発光標識および放射性標識のような直接的に検出され得る化合物、ならびに、酵素のように、反応または誘導体化を通して検出され得る化合物。これらのタイプの標識の例としては、 ^{32}P 、 ^{14}C 、 ^{125}I 、 ^3H 、および ^{131}I 放射性同位元素、希土類キレートまたはフルオレセインおよびその類似体のような蛍光体、ローダミンおよびその類似体、ダンシル、ウンベリフェロン、ルシフェラーゼ（ホタルルシフェラーゼおよび細菌性ルシフェラーゼ（米国特許第4,737,456号））、ルシフェリン、2,3-ジヒドロフタラジンジオン（2,3-dihydrophthalavinediones）、西洋ワサビペルオキシダーゼ（HRP）、アルカリホスファターゼ、 β -ガラクトシダーゼ、グルコアミラーゼ、リゾチーム、糖オキシダーゼ（グルコースオキシダーゼ、ガラクトースオキシダーゼ、およびグルコース-6-ホスフェートデヒドロゲナーゼ）が挙げられる。ウリカーゼオキシダーゼおよびキサンチンオキシダーゼのような複素環式オキシダーゼは、過酸化水素を使用する酵素と結合して、HRP、ラクトペルオキシダーゼまたはマイクロペルオキシダーゼ、ピオチンアビジン、スピンラベル、バクテリオファージラベルのような色素前駆物質、および安定した遊離基を酸化させる。

【0132】

この標識は、当業者に公知の方法によってdPNA Gまたは抗dPNA Gと結合体化され得る。例えば、米国特許第3,940,475号および同3,645,090号は、蛍光体および酵素の、抗体との結合体化を述べる。他のアッセイは、抗原および抗体とともに慣用されると報告されており、および本発明によって使用され得、組成物およびサンドイッチアッセイを含む。

【0133】

本発明は、dPNA G発現宿主細胞を生産することによってdPNA G抗原を調製する方法、ica遺伝子座を細胞へ導入し、そのような細胞からPNA G抗原を単離し、そしてdPNA Gを形成するための抗原を脱アセチル化することによってdPNA G抗原を調製する方法を包含する。PNA G宿主細胞は、ica遺伝子（配列番号1）をコードする核酸を用いて、形質導入または形質転換した細胞に、トランスフェクトすることによって調製され得る。この細胞は、真核細胞または原核細胞であり得るが、好ましくは、細菌細胞であり得る。この細胞は、天然にてPNA Gを発現しないStaphylococcusであり得る。

【0134】

一つの実施形態では、このica核酸は、真核細胞または原核細胞内にica核酸の発現を指向させる遺伝子発現配列に作動可能に結合される。この「遺伝子発現配列」は、プロモーター配列またはプロモーター-エンハンサーの組み合わせのような、任意の調節ヌクレオチド配列であり、作動可能に結合されているicaの核酸の有用な転写および翻訳を容易にする。例えば、この遺伝子発現配列は、構成的なプロモーターまたは誘導的なプロモーターのような、哺乳動物のプロモーターまたはウィルスプロモーターであり得る。構成的な哺乳動物プロモーターとしては、次に示す遺伝子：ヒポキサンチン ホスホリボシル トランスフェラーゼ（HPTR）、アデノシンデアミナーゼ、ビルビン酸キナーゼ、および β -アクトニンについてのプロモーターが挙げられるが、これらに限定されない。細胞において構成的に機能する例示的なウィルスプロモーターは、例えば、サルウイルス、パピローマウイルス、アデノウイルス、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）、ラウス肉腫ウイルス、サイトメガロウイルス、モロミー白血病ウイルスおよび他のレトロウイルスの末端反復配列（LTR）、および単純ヘルペスウイルスのチミジンキナーゼプロモーターが挙げられる。他の構成的なプロモーターは、当業者に公知である。本発明の遺伝子発現配列として有用であるプロモーターはまた、誘導的なプロモーターを含む。誘導的なプロモーターは、誘導因子の存在下において発現される。例えば、メタロチオネインプロモーターは、ある金属イオンの存在下において、転写および翻訳を促進するために誘導される。他の誘導的なプロモーターは、当業者に公知である。

【0135】

一般的に、この遺伝子発現配列は、必要ならば、それぞれ転写および翻訳の開始に関与する5'非転写配列および5'非翻訳配列に含まれる。5'非転写配列は、作動可能に結合されたi c a核酸の転写制御のためのプロモーター配列を含むプロモーター領域を含む。この遺伝子発現配列は、必要に応じて、所望のようなエンハンサー配列または上流の活性化配列を含む。

【0136】

このi c a核酸配列およびこの遺伝子発現配列は、それらが、この遺伝子発現配列の影響または制御下において、このi c aコード配列の転写および/または翻訳を配置するような方法で、共有結合される場合、「作動可能に結合される」と言われる。機能的タンパク質に翻訳されるi c a配列(2つのDNA配列)は、5'遺伝子発現配列中のプロモーターの誘導がi c a配列の転写を発生させる場合、およびこの2つのDNA配列間の結合の性質が(1)フレームシフト変異の誘導を発生させない、(2)このi c a配列の転写を指示するためのプロモーター領域の能力を妨げない、または(3)タンパク質に翻訳されるための対応するRNA転写物の能力を妨げない場合に、作動可能に結合されると言われる。従って、遺伝子発現配列は、その遺伝子発現配列が生じる転写物が、所望のタンパク質またはポリペプチドに翻訳され得るようにi c a核酸配列の転写を実行する能力を有する場合、i c a核酸配列と作動可能に結合されていることになる。

10

【0137】

本発明のi c a核酸は、単独で、またはベクターとの会合において、その宿主細胞に送達され得る。最も広い意味において、「ベクター」とは、(1)P N A G合成に関与するタンパク質をコードするi c a遺伝子座中のこの遺伝子を含む核酸分子の送達、または(2)標的細胞によって、P N A G合成に関与するタンパク質をコードするi c a遺伝子座中のこの遺伝子を含む核酸分子の取り込み：を容易にする能力のある任意の媒体である。好ましくは、このベクターは、このベクターの欠如を発生させる分解の程度に関連する分解を減らして、標的細胞へi c a分子を運ぶ。一般的に、本発明において有用なベクターは、2種類：生物学的ベクターおよび化学的/物理的ベクターに分割される。生物学的ベクターは、i c a核酸の、標的細胞への送達、標的細胞によっての取り込みに対して有用である。化学的/物理的ベクターは、i c a核酸またはi c aポリペプチドの、標的細胞への送達、標的細胞によっての取り込みに対して有用である。

20

30

【0138】

生物学的ベクターとしては、プラスミド、ファージミド、ウィルス、ウィルス由来の他のビヒクル、もしくは、本発明の核酸配列の挿入または組み込みによって操作されている細菌源、および本発明の核酸配列を付与し得る遊離した核酸フラグメントが挙げられるが、これらに限定されない。ウィルスベクターは、生物学的ベクターの好ましい型であり、次に示すウィルス：以下のようなレトロウィルス、モロニー Maus 白血病ウィルス；ハーベイ Maus 肉腫ウィルス；マウス乳癌ウィルス；ラウス肉腫ウィルス；アデノウィルス；アデノ随伴ウィルス；S V 40 型ウィルス；ポリオーマウィルス；エプスタイン - バーウィルス；パピローマウィルス；ヘルペスウィルス；ワクシニアウィルス；ポリオウィルス、およびあらゆるレトロウィルスのようなRNAウィルスが挙げられるが、これらに限定されない。名前はつけられていないが当該分野で公知である、他のベクターも容易に使用され得る。

40

【0139】

好ましいウィルスベクターは、不必須遺伝子が重要遺伝子と置き換えられた、非細胞変性真核生物ウィルスに基づく。非細胞変性ウィルスはレトロウィルスを含み、レトロウィルスの生活観は、引き続くプロウィルスの宿主細胞内DNAへの組み込みを含むゲノムウィルスRNAのDNAへの逆転写を含む。一般的に、このレトロウィルスは、複製不十分(すなわち、所望のタンパク質の合成を指示する能力はあるが、感染粒子を製造する能力はない)である。複製不十分のレトロウィルスを生産するための標準的プロトコル(外因性遺伝子材料のプラスミドへの組み込み工程、プラスミドを組み込んだパッケージング細

50

胞の形質転換工程、パッケージング細胞株による組換えレトロウイルスの生産工程、組織培養液からのウイルス粒子の収集工程、およびウイルス粒子を用いた標的細胞の感染工程を包含する)は、Kriegler, M., 「Gene Transfer and Expression, A Laboratory Manual」、W. H. Freeman and Co., New York (1990) and Murry, E. J. Ed. 「Methods in Molecular Biology」, vol. 7, Humana Press, Inc., Clifton, New Jersey (1991)において、提供される。

【0140】

ある適用のための別の好ましいウイルスは、アデノ随伴ウイルス、二本鎖DNAウイルスである。このアデノ随伴ウイルスは、複製不十分であるように操作され得、広い範囲の型および種類の細胞を感染する能力を有する。それは、さらに、熱溶媒安定性および脂質溶媒安定性；多様な系統の細胞においての高い形質導入頻度；および重感染抑制の欠如とそれに伴って形質導入の複数の系列を許すような、有利さを有する。伝えるところによれば、このアデノ随伴ウイルスは、部位特異的な方法において、ヒト細胞内DNAへ組み込まれ得、それに関する挿入性変異誘発の可能性および挿入された遺伝子発現の変異性の可能性を最小化する。加えて、野生型アデノ随伴ウイルス感染は、選択圧の欠如下において少なくとも100回継代の間、組織培養が続けられており、このことは、このアデノ随伴ウイルスのゲノム組換えは、比較的、安定した事象であることを暗に意味する。このアデノ随伴ウイルスはまた、染色体外の様式において機能し得る。

【0141】

この生物学的ベクターに加えて、化学的/物理的ベクターは、ica分子を標的細胞に運ぶために使用され得、そしてその結果取り込みを容易にし得る。本明細書において使用されるように、「化学的/物理的ベクター」とは、ica分子を細胞へ運ぶ能力のある、細菌源またはウイルス源由来の分子以外の天然分子または合成分子をいう。

【0142】

本発明の好ましい化学的/物理的ベクターは、コロイド状分散系である。コロイド状分散系としては、水の中に油があるエマルジョン、ミセル、混合ミセル、およびリポソームを含む、脂質に基づく系が挙げられる。本発明の好ましいコロイド状態は、リポソームである。リポソームは、インビボまたはインビトロにおいて送達ベクターとして有用である人工膜管である。大きな単膜管(LUV)は、0.2~4.0 μmのサイズの範囲であり、大きな高分子をカプセル化し得ることが示されている。RNA、DNA、およびインタクトなビリオンは、水性内部の中でカプセル化され得、そして生物学的活性形態で細胞に送達され得る(Fraley, et al., Trends Biochem. Sci., (1981) 6:77)。リポソームが有用な遺伝子伝達ベクターであるために、一つ以上の次に示す特徴を与えられなければならない：(1)生物学的活性を保持した状態で、高い効率で、重要な遺伝子のカプセル化；(2)高い効率で、標的細胞の細胞質への、この小胞の水性含量の送達；および(3)遺伝子情報の正確な発現および有用な発現。

【0143】

リポソームは、例えば、LIPOFECTINTMおよびLIPOFECTACETM（これらはN-[1-(2,3ジオレイルオキシ)-プロピル]-N,N,N-トリメチルアンモニウムクロリド(DOTMA)およびジメチルジオクタデシルアンモニウムブロミド(DDAB)のようなカチオン脂質で構成される)のように、Gibco BRLから、商業的に利用できる。リポソームを作製する方法は当該分野で周知であり、および多くの発行物において記載されている。リポソームはまた、Gregoriadis, G.によって、Trends in Biotechnology, (1985) 3:235-241中で、概説されている。

【0144】

コンパクション因子はまた、単独で、もしくは、生物学的ベクターまたは本発明の化学的/物理的ベクターとの結合体化状態で、使用され得る。本明細書において使用される「

コンパクション因子」とは、核酸上のマイナス電荷を中和し、それにより核酸の微細な顆粒へのコンパクションを可能にするヒストンのような因子をいう。この核酸のコンパクションは、標的細胞による核酸の取り込みを容易にする。このコンパクション因子は、単独で使用され得る、すなわち、細胞によってより効率よく取り込まれる形態で、またはより好ましくは一つ以上の上述で記載のベクターとの結合体化状態で、i c a分子を送達し得る。

【0145】

このi c a核酸の標的細胞による取り込みを容易にするために使用され得る、他の例示的組成物としては、リン酸カルシウムおよび細胞内輸送の他の化学的媒介物、マイクロインジェクション組成物、エレクトロポレーション組成物、および相同的組換え組成物（例えば、i c a核酸を標的細胞の染色体内の前もって選んでおいた位置に組み込むため）が挙げられる。

10

【0146】

次の例は、説明図の目的のために含まれるが、本発明の有効範囲を限定することは意図されない。

【実施例】

【0147】

（実施例1：P N A Gの精製）

d P N A Gは、i c a遺伝子座を発現する任意の細菌株から生産され得ることが、本発明によって発見された。特に、これらの細菌株としては、S t a p h y l o c o c c u s e p i d e r m i d i s、S t a p h y l o c o c c u s a u r e u s、およびこの遺伝子を用いてi c a遺伝子座に形質変換されたS t a p h y l o c o c c u s c a r n o s u sのような他のS t a p h y l o c o c c u s株が挙げられる。次に示す特定菌株は、その特定菌株からd P N A Gを精製するために、本発明によって使用され得る。（その細菌株としては、S . e p i d e r m i d i s R P 6 2 A（A T C C番号35984）、S . e p i d e r m i d i s R P 1 2（A T C C番号35983）、S t a p h y l o c o c c u s e p i d e r m i d i s M 1 8 7、S . c a r n o s u s T M 3 0 0（p C N 2 7）、S . a u r e u s R N 4 2 2 0（p C N 2 7）、およびS . a u r e u s M N 8 ムコイドが挙げられる。）

20

以下は、i c a遺伝子座を含むS t a p h y l o c o c c u sからd P N A Gを生産するために使用され得る方法である。

30

【0148】

出発材料は、次に示すような方法で細菌を増殖させることにより、i c a遺伝子座を発現するS t a p h y l o c o c c u sの培養物から調製する：この多糖類は、16リットルの細菌増殖培地の培養物から調製される。好ましい培地は、R P M I - 1 6 4 0 A U T O - M O D（加圧滅菌（S i g m a C h e m i c a l C o . , S t , M o .）による滅菌を許容するために修正されたR P M Iの調製物）に基づく化学的に規定された培地（C D M）である。このC D Mは、アミノ酸、ビタミンおよびヌクレオチドを、他のC D M（H u s s a i n , M . , J . G . M . H a s t i n g s , a n d P . J . W h i t e , 1 9 9 1）中で見出されるそれらの濃度に合わせるために、付加的に追加する。コアグラゼ陰性S t a p h y l o c o c c u sによる粘液生産物のための化学的に規定された培地（J . M e d . M i c r o b i o l . 3 4 : 1 4 3 - 1 4 7）。この培地にまた、1%の最終濃度にまでショ糖およびグルコースを追加する。

40

【0149】

液体培養物を、多糖類を生産する細菌株の単一のコロニーを用いて播種する。この好ましい菌株は、S t a p h y l o c o c c u s a u r e u s M N 8 m（この多糖類の恒常的な過剰生産者である菌株）を命名される。単一のコロニーを、トリプシン的大豆寒天プレート、または細菌増殖培地の同様のプレートから取り、そして37で増殖させる。10～42の温度もまた受容可能である。液体培養物を、1～96時間37でインキュベート、他方、連続的に攪拌させながら、2リットル/分の速度で酸素を用いて流す。

50

この pH は、pH 滴定器を通した NaOH の付加によって、増殖期間中 7.0 に維持する。増殖期間の最後に、細胞体を、30 分間で 9000 g の割合で沈降させ、そしてその上清を、接線方向に流す濾過 (10,000 ~ 500,000 分子量の分離膜) を通して、~ 500 ml まで集める。エタノールの 2 つの容量物と、多糖類粗調製物を調製するために加える。この沈殿物は、遠心分離によって回収され、水中で再懸濁され、そして蒸留水に対して一晚透析する。この抗体は、不溶性である。この不溶性粗抗体は、50 ml のリン酸緩衝化生理食塩水 (PBS、0.1 M リン酸塩、0.15 M 塩化ナトリウム) 中で懸濁され、0.5 ~ 16 時間 37 °C でライソゾーム (0.5 mg) およびリソスタフィン (0.5 mg) を用いて消化する。抗原懸濁液をさらに、0.5 ~ 16 時間 37 °C でヌクレアーゼ (0.5 mg) を用いて処理し、次に 37 ~ 56 °C でプロテイナーゼ K (5 mg) を用いて 0.5 ~ 16 時間インキュベーションする。透析および凍結乾燥後、乾燥した抽出物は、5 M HCl 中で再溶解し、および pH は、4 N NaOH を用いて、2 に調整する。この溶液の 20 ml アリコート、206 nm での光学的吸収により同定された、溶出した多糖類を有する 0.1 N HCl / 0.15 M NaCl 緩衝液を用いて、Sephacryl S-300 (Pharmacia, Piscataway, NJ) で詰められた 5 × 88 cm カラムに適用する。分子サイズの連続的範囲を表す多糖類に対応する画分を、別々に保存し、水に対して透析し、そして凍結乾燥する。あるいは、サイズ分画は、ダイアフィルトレーション膜の使用のように、当該分野で公知の様々な代替の手順を用いて行われ得る。

10

20

30

40

50

【0150】

アシル化の程度は、化学的に処理される天然の多糖類によって調整され得る。従って、50% より多いアセテートを有する多糖類は単離され、そして脱アセチル化され、所望のアセチル化レベルを達成する。グルコサミンからアミノ結合されたアセテート基を除去するための処理は、公知の塩基溶液中でされる。好ましい手法は、1.0 M NaOH 中で、2 ~ 20 時間 37 °C におけるインキュベーションである。より弱塩基性溶液およびより長いインキュベーション時間、またはより高い温度、もしくは、より短いインキュベーション時間またはより低い温度に加えてより強塩基性溶液は、等しく有効的である。一般的に、10 より上に pH を上げる任意の処理は、適切な温度下において有効である。

【0151】

また、この抗原を脱アセチル化する酵素学的手段が存在する。酵素学的手段は、クロラムフェニコール脱アセチラーゼおよび *icaB* 遺伝子産物に関連する酵素のような、脱アセチル化酵素を含む。

【0152】

(実施例 2: dPNAG ジフテリアトキソイド (DTm) 結合体化ワクチンの調製)

DTm を、還元性アミノ化によって精製された dPNAG と共有結合させた。アルデヒド基を初め、下に示す工程 1 に記載のグルタルアルデヒドを用いたタンパク質の処理によって、デフテリアトキソイド (DTm) の表面上に導入した。活性化型 DTm は、引き続いて、下に示す工程 2 に記載の還元剤 (シアノホウ化水素化ナトリウム) の存在下で、活性化型 DTm の遊離したアミノ基を通して dPNAG とともに反応させた。

【0153】

(工程 1) グルタルアルデヒドを用いた DTm の活性化

10 mg の DTm (4.86 mg / ml 溶液 (20 mM HEPES 緩衝液、50 mM NaCl、pH 8)) を、10 kDa MWCO 透析カセットを用いて、室温で 3 時間、0.1 M 炭酸塩緩衝液 (pH 10) に対して透析した。このタンパク質溶液を、完全に炭酸塩緩衝液を用いて交換した場合、グルタルアルデヒドを、最終濃度 1.25% にまで加え、そしてこの混合物を 2 時間室温で攪拌させた。生産されたこの活性化型 DTm は、リン酸緩衝化生理食塩水 (PBS、pH 7.4) に交換し、そして 10 kDa MWCO 濾過膜を用いて限外濾過によって約 10 mg / ml まで濃縮した。

【0154】

(工程 2) 活性化型 DTm と PNAG の結合 PNAG を、Maira et al.

(Maira-Litran T, Kropec A, Abeygunawardana C, Joyce J, Mark IIIG, Goldmann DA, and Pier GB. Immunochemical properties of the staphylococcal poly-N-acetyl glucosamine surface polysaccharide. Infect. Immun. 2002; 70: 4433-4440) に記載のように、精製した。Maira et al. 中で PNA G - II と命名した、この材料の一画分を、この脱アセチル化 PNA G (dPNA G) を調製するために使用した。天然 PNA G を、5 M NaOH 中で、2 mg/ml の濃度にまで溶解させ、そして攪拌させながら 37 でインキュベートした。18 時間後、このサンプルを、氷のスラリー上に置き、そして 10 以下へ冷却させた。5 N HCl もまた、氷上で冷却させ、そしてこの溶液が中性の pH に到達するまで、0.5 mL アリコート中に加えた。この dPNA G 溶液を、次いで、10 KiloDalton Molecular Weight Cutoff (10 K MWCO) 透析カセット中で、蒸留水に対して一晩中透析し、凍結乾燥した。この手順は、15 ~ 20 % のアセテート置換を有する dPNA G を生産した。

【0155】

精製された dPNA G (10 mg) を、5 M HCl の 0.25 ml 中で溶解し、等量の 5 M NaOH を用いて中和し、そして最終容積が PBS を用いて 2 ml に調整した。dPNA G 溶液は、中性の pH において不溶性であるが、わずかな酸性 pH または塩基性 pH において、完全な可溶性で残存する。従って、溶解性を保証するために、dPNA G 溶液の pH は、9.0 を調整した。dPNA G (10 mg) を、PBS 中で、活性化型 DTm の 10 mg/ml 溶液の 1 ml と混合し、そしてこの反応の pH を 7.5 に調整した。200 mg の精製されたシアノホウ化水素ナトリウムを、この混合物に加え、そしてこの反応は、混合されながら 37 14 時間暗闇中で進行することを可能にした。この時間の後、この反応混合物を、0.1 M 炭酸塩緩衝液 (0.15 M NaCl、pH 10 (10 kDa MWCO 透析カセット)) を用いた透析によって交換し、そしてこの高い分子量結合体化物を、Superose 6 prep-grade カラムを用いて、ゲル濾過クロマトグラフィーによって、精製分離した。dPNA G - DTm 結合体化物は、20 mM HEPES 緩衝液 (50 mM NaCl、pH 8) に対して透析され、-2 で凍結保存した。

【0156】

(実施例 3 : 天然 PNA G - DTm 結合体化ワクチンの調製)

天然 PNA G (この場合、95 % ~ 100 % アセテート置換を有する) は、有機のシアノ化薬剤 (1 - シアノ - 4 - ジメチルアミノピリジニウムテトラフルオロボレート (CDAP)) を用いて、精製された DTm と共有結合し、下に示す工程 1 に記載のこの多糖類の水酸基を活性化した。続いて、CDAP - 活性化型 PNA G を、付加的なスペーサー分子の必要なしで、下に示す工程 2 に記載の DTm と結合した。

【0157】

(工程 1) CDAP を用いた PNA G の活性化

10 mg の精製された PNA G を、150 マイクロリットルの 5 M HCl 中に溶解され、等量の 5 M NaOH を用いて中和し、そしてホウ酸塩緩衝液 (pH 9.2) を用いて 1 ml まで希釈した。CDAP を、アセトニトリル中で 100 mg/ml 濃度に作製し、そして 1 ヶ月に至るまで -20 で保存した。200 µl の CDAP (20 mg を含む) を、ホウ酸塩緩衝液中の以前にボルテックスされた PNA G - II (Maira, et al. Infect. Immun. 2002, 70: 4433-4440) 溶液中へゆっくりとピペットで移し (この有機性共通溶液の速い添加は、この多糖類を沈澱させる) 、そしてこの反応を、2 分間進行させた。

【0158】

(工程 2) DTm を用いた CDAP - 活性化型 PNA G の結合

5 mg の DTm (保存溶液は、20 mM HEPES 緩衝液 (50 mM NaCl、p

H 8)) を、10 k D a M W C O 透析カセットを用いて、3 時間ホウ酸塩緩衝液 (p H 9 . 2) に対して透析させた。C D A P を用いた P N A G の活性化の後、5 m g の D T m を、すぐに加え、そしてこの混合物は、攪拌させながら 3 時間室温で反応させた。この時間の後、この高い分子量の結合体化物を、S u p e r o s e 6 p r e p - g r a d e カラムを用いてゲル濾過クロマトグラフィーによって、結合しなかった成分から精製させた。P N A G - D T m 結合体化物を含む画分は貯蔵し、濃縮し、そして - 2 0 で凍結保存した。

【 0 1 5 9 】

(実施例 4 : ウサギの中においての抗血清の生産)

精製された P N A G - D T m または d P N A G - D T m に対する抗体を、10 μ g の結合体化された多糖類を用いた 2 回の皮下免疫によって、完全フロイントアジュバントを用いた 1 回目の投与および不完全フロイントアジュバントを用いた 2 回目の投与に対して乳化され、その後に、一週間後に、3 日おきに 3 回、生理食塩水中の抗体が静脈注射することによって、ニュージーランド白色ウサギ中において惹起させた。ウサギから、二週間ごとに採血し、そして血清を結合免疫測定法 (E L I S A) により試験した。P N A G または d P N A G - D T m のいずれかを用いて免疫された 2 匹の代表的なウサギから、E L I S A によって得られた結合曲線は、図 1 および図 2 にそれぞれ示す。力価は、M a i r a e t a l (M a i r a - L i t r a n T , K r o p e c A , A b e y g u n a w a r d a n a C , J o y c e J , M a r k I I I G , G o l d m a n n D A , a n d P i e r G B . I m m u n o c h e m i c a l p r o p e r t i e s o f t h e s t a p h y l o c o c c a l p o l y - N - a c e t y l g l u c o s a m i n e s u r f a c e p o l y s a c c h a r i d e . I n f e c t . I m m u n . 2 0 0 2 ; 7 0 : 4 4 3 3 - 4 4 4 0) で記載のようにして決定した。

【 0 1 6 0 】

(実施例 5 : マウスにおける P N A G - D T m および d P N A G - D T m の免疫化)

10 匹のマウス (S w i s s W e b s t e r ; 雌 , 年齢は生後 5 ~ 7 週間) の集団を、一週間おきに、0 . 1 m l の P B S 中の、1 . 5 μ g , 0 . 7 5 μ g または 0 . 1 5 μ g の、P N A G - D T m および d P N A G - D T m の結合体化多糖類を皮下免疫され、そして 3 回目の免疫後、4 週間毎週採血した。コントロール集団は、同じ割合で、結合体化されていない多糖類とタンパク質の混合物を用いて免疫させた。天然の結合体化物および脱アセチル化結合体化物を用いて免疫されたマウスの力価は、それぞれ、図 3 および図 4 に示す。コントロール集団は、使用された投与量では、どんな力価も発生しなかった。

【 0 1 6 1 】

(実施例 6 : 破傷風トキソイドと結合体化した P N A G および d P N A G を生産させたウサギ抗血清のオプソニンの殺菌活性)

2 匹のウサギを、上述で記載のようにジフテリアトキソイドと結合体化された P N A G を用いて免疫し、そして 2 匹のウサギを、上述で記載のようにジフテリアトキソイドと結合体化させた d P N A G を用いて、免疫した。オプソニンの殺菌活性を、M a i r a e t a l . (M a i r a - L i t r a n T , K r o p e c A , A b e y g u n a w a r d a n a C , J o y c e J , M a r k I I I G , G o l d m a n n D A , a n d P i e r G B . I m m u n o c h e m i c a l p r o p e r t i e s o f t h e S t a p h y l o c o c c a l p o l y - N - a c e t y l g l u c o s a m i n e s u r f a c e p o l y s a c c h a r i d e . I n f e c t . I m m u n . 2 0 0 2 ; 7 0 : 4 4 3 3 - 4 4 4 0) に記載された方法を用いて、決定した。力価を決定し、そして 4 0 % 以上の細菌が殺傷される血清希釈として力価を定義した。様々な S t a p h y l o c o c c u s 菌株に対する 4 匹のウサギ抗血清の結合曲線を、図 5 ~ 図 8 に示す。菌株 M 1 8 7 は、S . e p i d e r m i d i s 菌株であり ; 他の菌株はすべて S . a u r e u s 菌株である。力価の比較は、図 9 に示す。

【 0 1 6 2 】

(等価物)

上に記載された明細書は、当業者が本発明を実行するのを可能にするために十分であると考えられる。本発明は、提供された実施例による有効範囲において、限定されない。なぜなら、実施例は、本発明の一つの局面のただ一つの例示として意図され、他の機能的な等価な実施形態は、本発明の範囲内にあるからである。本明細書に示されている例および本明細書に記載されている例に加えて、本発明の様々な変更は、上の記載から当業者にとって明白になり、そして添付の特許請求の範囲内に含まれる。本発明の有利点および目的は、必ずしも、本発明のそれぞれの実施形態によって包含されない。

【 0 1 6 3 】

この出願において言及されるすべての参考文献、特許および特許発行物は、その全体が参考文献として本明細書において援用される。

【数 1】

- 1 -

SEQUENCE LISTING

<110> THE BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL, INC.

<120> POLYSACCHARIDE VACCINE FOR STAPHYLOCOCCAL INFECTIONS

<130> B0801.70292W000

<140> NOT YET ASSIGNED

<141> 2003-11-12

10

<150> US 60/425,425

<151> 2002-11-12

<160> 1

<170> PatentIn version 3.2

<210> 1

<211> 6520

<212> DNA

<213> Staphylococcus aureus

20

<400> 1

```

ggtagcgagc tgcctaata gtagctttgg ttgttcattg acaattaaac ttgatgtact    60
tcttcgtgta ttgctcatgg taattcctcg taaattaaaa tttttgtatt gaacctaaaa    120
taggtaatcc tagttgcgat tcaacatctt cttctgtctt aatacgctta tctaataatt    180
cttttaagaa aataatcaat attgctaaaa caataccaac aataatgctg ataactaagt    240
tgacagatac tattggagat acttttacgg cattatcatg tgctgaggaa agtatcgtaa    300
cattatcaac actcataatt ttaggcattg catgagcaaa aacttttagat attttattaa    360
caattttgtc agattcagat ttattcccag tggtaactga tacagtaata atttgagagt    420
ttgtttgatt gggtactttt aaaaatgaat tcaactcagc tgttgaatac tgaccatcaa    480
attctctaga tactttatct agaattctag gacttttgat aatttcgta tatgtattaa    540
cagactgcaa actactttga acattttgga aagctaaatc acttgaggac tttttcatgt    600
tcaactaatat ttgagtagaa gcagtatatt tgtcaggcat aacaaaaaag gttaatgccg    660
cacttactac aagacatatt gccggtaaaa taagcaataa tttaatattc ttcttttagaa    720
tatttaatat ttttactaaa tcaaactttt ctttcatggg ttcttcaca taatcaatca    780
ttgtattcat tatgtatggt ttataaatcg gacaattata tctagttaa cgaccacaaa    840
acatacacia ctacattttc tctaattatt tatataaata ttttatcgtt taaaattata    900
tcattgattc ctaccattat gtataactta ttatatattt tgcacaagat ataattttgt    960
ccaactttta atatccaaac ctattaataa taaaactaga taccatcgta ctctgtcatg   1020
gctttcttat aatcgagtag aagcatcatc attacttgat tatttgctct ttacaacacc   1080
gagcgtgccg gtactcggta attcaatacc ttgcgtaacc cgtcactgtg agttgggtta   1140

```

30

40

【数 2】

- 2 -

atgataataa agccacacacc ttttaaaaag atgtgggtaa tttatataat ttttattttac	1200	
atttttaact tataaaaaaa agcgccctatg tcatgattta ccatcacata ggogccttacc	1260	
aataaatttat tacttattac tttccatttc atctaattta tgcggattcc ctgtaattag	1320	
atgacaactt attctttttca ggggaacatt acactttttat aatatgttca aagacaaaact	1380	
taaccattca caaatataaa gaataatatt atcaaatcat tgaacaaatc gtatttttgca	1440	10
acaattgata tttatattaa tgtattgcat ttaatttata aaattcatat acatcttaat	1500	
attctcaata tcgatttgta ttgtcaactt tatatagatt taaaaaata atctcatgtc	1560	
tttttttaca aaagtaagtt aattattaca aactagtaac aaaaattatt totttcaaaaa	1620	
tatatttagt agcgaatata cttcatcttt gaattgactt ttactttctt ccaactgctcc	1680	
aaatttttgc gaaaaggatg ctttcaaata ccaacttttca agaaacagca atattaaatt	1740	
ctgaaagtct tottttgtca tctttatctt tgattcatca tagaattttg ctatctcttt	1800	
acttaatgat tgatttaaat cttgtatttg tccgtaaata tttccagaaa attcctcagg	1860	20
cgtattgat aattgaacgt acattctaatt atacctttct tcgatgtcga aaataaaactc	1920	
aaataagaat tgatataaag catcaattga atagttcgat ttattttgat tcatcataat	1980	
aatattatta aggtaatcaa aacaacattt aacactttgt tcgtaaatac tttttttcga	2040	
gtcaaaatgg taatataaac tcgctttctt tatatttaca ctttttagcta tatcatcaag	2100	
tggtgtaccg tcataccctt tctctgaaaa taagggttatt gcgttatcaa taatcttacc	2160	
cttcaatttt tataaccccc tactgaaaat taatcacact atgttacagg aaaattaagt	2220	
tgcaattaca aatatttccg ttttaattata acaacaatct attgcaaatt aaaatactat	2280	30
caattaccat atggcttaca acctaaacta cgaaaggtag gtaaagaaat tgcaattttt	2340	
taactttttg ctttttttacc ctgtatttat gtctattttac tggattgtcg gttcaattta	2400	
tttctatttc accagagaaa ttagatattc attgaacaag aagcctgaca taaatgtgga	2460	
tgaattagaa ggcattacat ttttacttgc ctgttataac gaaagtgaag cgattgaaga	2520	
tacgttgtct aatgttcttg cactcaaata cgagaagaaa gaaattatta tcattaatga	2580	
tggaagttca gataatacag cagaactcat ctataaaaatc aaagaaaata atgactttat	2640	
tttcgtcgat ttacaagaaa acagaggtaa agccaacgca ctcaatcaag gcattaaaca	2700	40
ggcttcatat gattatgtaa tgtgcttgga tgcagatact atcgttgatc aagatgcacc	2760	
atatttatatg attgagaatt tcaaacatga tccaaaactt ggtgcgggta caggtaatcc	2820	
tagaattcga aataagagtt ctatttttagg taaaattcaa acgatagaat atgcaagttt	2880	
aattggctgt attaagcgaa gtcagacact tgctggcgca gtcaatacta tttcgggtgt	2940	
cttcactcta tttaaaaaaa gtgcagttgt cgacgttggc tactgggata ctgatatgat	3000	

【数 3】

- 3 -

taccgaagat attgcagttt cttggaaatt gcatttacgt ggatatacgt ttaagtatga	3060	
accgcttgcc atgtgttgga tgttggttcc agaaacattg ggaggtcttt ggaagcaacg	3120	
cgtgagatgg gctcaagggg gacacgaagt attactacga gactttttta gcacaatgaa	3180	
aacgaaaagg tttcctttat atatittgat gtttgagcaa atcatctcga ttttatgggt	3240	
atatatagtg cttctatatt taggctattt gttcataaca gcaaacttct tagactatac	3300	10
atztatgaca tatagttttt caatatttct actatcatca tttactatga cttttataaa	3360	
ogttattcaa tttacagtgc cactctttat tgatagtgcg tacgagaaaa agaatatggc	3420	
tggactcata tttgtaagtt ggtatcogac agtatactgg attattaacg cagcagtagt	3480	
tcttgctgca tttccaaaag cattaataacg taagagaggt ggttacgcaa catggtcaag	3540	
cccagacaga gggaataccc aacgctaaaa tcacgcctaa atattgtaag agaaacagca	3600	
cttatcgcta tatcttgtgt cttttggata tattgttttag ttgttctact cgtttatatt	3660	
ggtactatat ttgaaattca tgacgaaagt atcaatacaa tacgtgttgc tttaaacatt	3720	20
gaaaatactg aaattttaga tatatttgaa actatgggca ttttcgogat tatcattttt	3780	
gtatttttta caattagcat attgattcaa aaatggcaga gagggagaga atcgtgaagt	3840	
atagaaaatt tataatttta gtgttgagta tcttgatcat attgcctgta agcacactgg	3900	
atggtcacat tattgcaaat gcagatgacg attcacctaa aaaactgaaa tataaagaaa	3960	
atagtgtctt ggcatataat tatcacctgt taagaaaagc gaattttctg aataatttta	4020	
tttacttctt ttctagtagt aaagaaatta aaaattatag tgttagtcaa tcacaatttg	4080	
aatctcaaat aaaatggcta aaatcacatg atgctaaatt tttaaccttg aaagaatttt	4140	30
tatattacaa gaaaaaagg aagtttccaa aacgaagtga gtgggttaac tttgatgata	4200	
tggatgaaac tatttatgaa aatgcttatc caatcttaaa aaaatataaa ataccggcga	4260	
ctgggtttat tatcacaggt catgttgggg gggaaaactt tcacaacctc gatatgatta	4320	
gtaaaaaaga actaaaagaa atgtataaaa ctgggttatg ggaatttgaa acacataccc	4380	
acgatttgca taacttatct aaaaataata agtcaaaatt aatgaaagct tctgaagcta	4440	
caatcataaa agattttaa acaaagtga aatatctaac taaaaacttt aaaaagtcgc	4500	40
agaaaactat agcctatcct tatggcttga tgaatgacga taaattaccg gtaatcaaaa	4560	
aagctgggtt aaaatacgg ttttcattag aggaaaaagc agtcactccg aactccaatg	4620	
attattacat ccctagaata ttaattagt atgatgcttt tgagcattta attagagat	4680	
gggacggatt ccatgaaaaa gattagactt gaactcgtat atttacgtgc tattatatgt	4740	
gcaattatta ttatcacaca tttacttaca caaattactt taaaacatga aaatatggag	4800	
ggtgggtcct tagtggtaca attttacatt cgtaatatgt tgatttttgg tacaccttgc	4860	


【数 4】

- 4 -

tttattatct	tgtcacagtt	actgacaacc	ttgaattacc	aaaaagtcac	ctatagatac	4920	
ttaactacac	gcgtaaaata	tatacttatt	ccttacatat	taatgggatt	gttttacagt	4980	
tatagtgaat	cattattaac	agattcaagt	ttcaataaac	aattcattga	aaatgtccta	5040	
ttaggtcaat	ggtatggcta	ttttatcggt	gttatcatgc	aattctttat	tttgagttat	5100	
atcattttta	aaattaacta	taacctattc	aacagtaaaa	tattattatt	gttatctttt	5160	10
attttacagc	aatcattttt	atattacttt	acgaacaaca	cagcggtttca	cgataccgtg	5220	
ctacactatt	atcccttaag	tgaaaatact	ataatattcg	gatggatttt	ttatttcttc	5280	
ttaggtgcat	atatgggtta	taactacgaa	cgtgtattaa	atctcttaga	acgttattta	5340	
gttattatga	ttgtatttag	tgtagctact	tattttgtgt	ttattgcgtt	agcaaatgga	5400	
gactattgga	acgttaaccag	cttttcatat	tcattaacac	catataatag	tattatgttt	5460	
attgttatct	tgggtatttg	cacgcatttt	aaaacaatgt	tatttaatac	gattcaaatg	5520	
attagtgctt	tctcattctt	tatttattta	ttacatccaa	tcattctaga	ctcattgttt	5580	20
gcatatacaa	atataattga	ggataataca	atgggtctttc	tagcgatata	actactattc	5640	
attttaggat	tatgtatagg	tgtcggcatg	atattgcgtg	aattctatat	ctttagggtt	5700	
attattggaa	aacaaccata	taaattgaac	attaatgctt	attaattatt	aagctatgtt	5760	
aaaaacacgc	ggtggggcga	atcagtttga	attgactgac	ttcgtttttac	cgcggtgtta	5820	
atattgttat	acatatattc	taattgcaca	tttaaacttc	gtaaatgcca	atgggagtgg	5880	
gacagaaatg	atattttcgc	aaaatttatt	tgtcgtccc	acccaactt	gcacattatt	5940	
gtaacctgac	tttcgccag	cttctatgtt	ggggcccgcc	caacttgcac	attattgtaa	6000	30
gctgactttc	cgccagcttc	tttgttgggg	ccccgccaac	ttgcattgtt	tgtagaattt	6060	
cttttcgaaa	ttctttatgt	tggggcctcg	cccaatgttt	tacttgaata	attcttttag	6120	
aattctaaat	aatgatccga	ttaattgaaa	gaagtctgca	gtcattatta	attcctccct	6180	
ttactttata	aattatgctt	gcttagtata	agtcagcttt	tcagttttca	ctaaatcgtc	6240	
tgctaaatga	tgccaaaaat	cttghtaattc	ttctcttggt	cgcactgtat	cagaactgtc	6300	
ttgtcctaca	aagtcaacat	gatcccaatc	atgttttgta	ggcgtcactt	gccaaatgcc	6360	40
tttttgaatt	ttatctgtcg	cttttgtata	agcttgatta	aatggatgtt	gagaagaaat	6420	
aacggatact	aaaccatcgt	tttctcgcca	ttctttttca	gtagctttac	cgattaagtt	6480	
accagtaatc	acaaatggga	aaaacatatt	taagtctgct			6520	


【 図 1 】

Figure 1




【 図 2 】

Figure 2




【 図 3 】

Figure 3




【 図 4 】

Figure 4




【 図 5 】

Figure 5




【 図 7 】

Figure 7




【 図 6 】

Figure 6




【 図 8 】

Figure 8



【 図 9 】

Figure 9



【 配 列 表 】

2019089845000001.app

フロントページの続き

(51)Int.Cl.		F I		テーマコード(参考)
A 6 1 K 35/28 (2015.01)		A 6 1 K 35/28		4 C 0 8 7
A 6 1 K 35/26 (2015.01)		A 6 1 K 35/26		4 H 0 4 5
A 6 1 P 37/04 (2006.01)		A 6 1 P 37/04		
A 6 1 K 39/085 (2006.01)		A 6 1 K 39/085		
A 6 1 K 9/08 (2006.01)		A 6 1 K 9/08		
C 1 2 N 15/06 (2006.01)		C 1 2 N 15/06	1 0 0	
C 1 2 P 21/08 (2006.01)		C 1 2 P 21/08	Z N A	
C 1 2 N 15/13 (2006.01)		C 1 2 N 15/13		
C 0 7 K 16/12 (2006.01)		C 0 7 K 16/12		
C 1 2 N 1/20 (2006.01)		C 1 2 N 1/20	E	
C 1 2 P 19/04 (2006.01)		C 1 2 P 19/04	C	
G 0 1 N 33/569 (2006.01)		G 0 1 N 33/569	F	
G 0 1 N 33/53 (2006.01)		G 0 1 N 33/53	S	
G 0 1 N 33/534 (2006.01)		G 0 1 N 33/534		
G 0 1 N 33/533 (2006.01)		G 0 1 N 33/533		
G 0 1 N 33/535 (2006.01)		G 0 1 N 33/535		

(72)発明者 ジェラルド ピー . ピアー

アメリカ合衆国 マサチューセッツ 0 2 1 4 6 , ブルックリン , ソーンダイク ストリート
2 1

(72)発明者 トマス メイラ - リトラン

アメリカ合衆国 マサチューセッツ 0 2 4 4 6 , ブルックリン , リッテル ロード 1 1

F ターム(参考) 4B064 AF11 AF22 AG26 AG27 BJ10 BJ12 CA19 CC24 DA01
 4B065 AA53X AB04 AC15 BA08 CA22 CA25 CA44 CA45
 4C076 AA12 BB11 BB13 BB15 BB16 EE41 EE59 GG43
 4C085 AA03 AA13 AA14 BA13 BB24 CC07 DD21 DD86 EE01 EE06
 GG01 GG02 GG03 GG04 GG06
 4C086 AA01 AA02 EA02 EA22 MA01 MA04 MA17 MA55 MA66 NA14
 ZB09 ZB35
 4C087 AA01 AA02 AA03 BB44 BB64 BC71 CA14 MA17 MA55 MA66
 NA14 ZB09 ZB35
 4H045 AA11 AA20 AA30 BA53 BA70 BA71 BA72 CA40 DA75 DA76
 EA20 FA74

【外国語明細書】
2019089845000001.pdf

专利名称(译)	用于金黄色葡萄球菌感染的多糖疫苗		
公开(公告)号	JP2019089845A	公开(公告)日	2019-06-13
申请号	JP2019035315	申请日	2019-02-28
[标]申请(专利权)人(译)	激光ブリガムアンドウィメンズホスピタルインコーポレイテッド 布赖汉姆妇女医院		
申请(专利权)人(译)	在布莱根妇女医院公司		
[标]发明人	ジェラルドビーピアー トマスメイラリトラン		
发明人	ジェラルド ビー. ピアー トマス メイラ-リトラン		
IPC分类号	A61K39/00 A61P31/04 A61K31/726 A61K47/64 A61K35/74 A61K35/28 A61K35/26 A61P37/04 A61K39/085 A61K9/08 C12N15/06 C12P21/08 C12N15/13 C07K16/12 C12N1/20 C12P19/04 G01N33/569 G01N33/53 G01N33/534 G01N33/533 G01N33/535 A61K31/715		
CPC分类号	A61K31/715 A61K39/00 A61K39/085 A61K2039/6037 A61K2039/627 A61P31/04 A61P37/04 C07K16/1271 C08B37/0063 G01N2400/10		
FI分类号	A61K39/00.H A61P31/04 A61K31/726 A61K47/64 A61K35/74.G A61K35/28 A61K35/26 A61P37/04 A61K39/085 A61K9/08 C12N15/06.100 C12P21/08.ZNA C12N15/13 C07K16/12 C12N1/20.E C12P19/04.C G01N33/569.F G01N33/53.S G01N33/534 G01N33/533 G01N33/535		
F-TERM分类号	4B064/AF11 4B064/AF22 4B064/AG26 4B064/AG27 4B064/BJ10 4B064/BJ12 4B064/CA19 4B064/CC24 4B064/DA01 4B065/AA53X 4B065/AB04 4B065/AC15 4B065/BA08 4B065/CA22 4B065/CA25 4B065/CA44 4B065/CA45 4C076/AA12 4C076/BB11 4C076/BB13 4C076/BB15 4C076/BB16 4C076/EE41 4C076/EE59 4C076/GG43 4C085/AA03 4C085/AA13 4C085/AA14 4C085/BA13 4C085/BB24 4C085/CC07 4C085/DD21 4C085/DD86 4C085/EE01 4C085/EE06 4C085/GG01 4C085/GG02 4C085/GG03 4C085/GG04 4C085/GG06 4C086/AA01 4C086/AA02 4C086/EA02 4C086/EA22 4C086/MA01 4C086/MA04 4C086/MA17 4C086/MA55 4C086/MA66 4C086/NA14 4C086/ZB09 4C086/ZB35 4C087/AA01 4C087/AA02 4C087/AA03 4C087/BB44 4C087/BB64 4C087/BC71 4C087/CA14 4C087/MA17 4C087/MA55 4C087/MA66 4C087/NA14 4C087/ZB09 4C087/ZB35 4H045/AA11 4H045/AA20 4H045/AA30 4H045/BA53 4H045/BA70 4H045/BA71 4H045/BA72 4H045/CA40 4H045/DA75 4H045/DA76 4H045/EA20 4H045/FA74		
代理人(译)	夏木森下		
优先权	60/425425 2002-11-12 US		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供针对葡萄球菌感染的多糖疫苗。 本发明涉及葡萄球菌脱乙酰化的聚N-乙酰化葡糖胺 (dPNAG) 的组合物。 dPNAG可以从天然来源分离，也可以从头合成。本发明还是一种疫苗，其诱导针对由金黄色葡萄球菌，表皮葡萄球菌，相关的其他凝固酶阴性葡萄球菌或凝固酶阳性葡萄球菌和其他具有ica (细胞内粘附) 基因座的生物引起的感染的主动免疫。使用dPNAG。 本发明进一步提供了用于针对dPNAG的抗体的方法，特别是用于诱导针对相同水平感染的被动免疫。 【选择图表】 无

Figure 1

